

金匱心典
卷下

朱尚勉

金匱心典方法歌括卷下目錄

黃痺病證并治第十五

茵陳蒿湯

消石礬散

梔子大黃湯

桂枝加黃芪湯

見水氣

猪羔髮煎

茵陳五苓散

大黃硝石湯

小半夏湯

見痰飲

柴胡湯

見嘔吐

小建中湯

見虛勞

附瓜蒂湯

見喝病

附千金麻黃酒

醇湯

驚悸吐衄下血胸滿瘀血第十六

桂枝去芍加蜀漆龍骨牡蠣救逆湯

半夏麻黃丸

栝葉湯

黃土湯

瀉心湯

赤小豆湯

嘔吐噦下利病脉證治第十七

吳茱萸湯

半夏瀉心湯

黃芩加半夏生姜湯

小半夏湯

見疫飲

猪苓散

四逆湯

小柴胡湯

大半夏湯

大黃甘草湯

茯苓澤瀉湯

文蛤湯

半夏乾姜散

生姜半夏湯

桔皮湯

桔皮竹茹湯

四逆湯

桂枝湯

大承氣湯

小承氣湯

桃花湯

白頭翁湯

梔子豉湯

通脉四逆湯

紫參湯

訶梨勒散

附子金翼小承氣湯

附外黃芩湯

○瘡癰腸癰浸淫病脉證并治第十八

○薏苡附子敗醬散

○大黃牡丹湯

○王不留行散

○排膿散

○排膿湯

○黃連粉

○跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲病脉證治第十九

○藜蘆甘草湯

方未見

○鷄屎白散

○蜘蛛散

○甘草粉蜜湯

○烏梅丸

○婦女妊娠病脉證治第二十

○桂枝湯

見下利

○桂枝茯苓丸

○附子湯

○芎歸膠艾湯

○當歸芍藥散

○乾薑人參半夏丸

當歸貝母苦參湯

葵子茯苓湯

當歸散

白朮散

婦人產後病脉證治第二十一

小柴胡見嘔吐

大承氣湯見瘕

當歸生薑羊肉湯見寒病

枳實芍藥散

下瘀血湯

大承氣湯見瘕

陽旦湯

竹葉湯

竹皮大丸

白頭翁加甘草湯

附千金三物黃芩湯

附千金內補當歸建中湯

婦人雜病脉證并治第二十二

小柴胡湯見嘔吐

小青龍湯見咳

甘麥大棗湯

溫經湯

瀉心湯

見驚悸

旋覆花湯

見五藏積聚

土瓜根散

大黃甘遂湯

膠薑湯

礬石丸

抵當湯

當歸芍藥散

見妊娠

紅藍花酒

小建中湯

腎氣丸

蛇床子散

狼牙湯

猪羔髮煎

見黃痺

小兒疳蟲蝕齒方

金匱心典卷下

漢張仲景著

吳下尤怡在涇集註

黃痺病證并治第十五

寸口脉浮而緩浮則為風緩則為痺痺非中風四肢苦煩脾色必黃瘰熱以行

脉浮為風脉緩為濕云為痺者風與濕合而痺也然非風痺疼痛之謂故又曰痺非中風所以然者風得濕而變熱濕應脾而內行是以四肢不疼而苦煩脾脘瘰熱而色黃脾氣四運之由也痺以其所瘰之熱轉輸流布而之體面目盡黃矣

故曰痲熱以行

跌陽脉緊而數數則為熱熱則消穀緊則為寒食即為滿尺脉浮為傷腎跌陽脉緊為傷脾風寒相搏食穀即眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃

曰穀瘵

跌陽脉數為熱者其熱在胃故消穀脉緊為寒者其寒在脾故滿滿者必生濕胃熱而脾濕亦黃病之原也尺脉浮為傷腎者風傷腎也跌陽脉緊為傷脾者寒傷脾也腎得風而生熱脾得寒而生濕又黃病之原也濕熱相合其氣必歸脾胃

脾胃者倉廩之官也穀入而助其熱則眩穀不消而氣以瘀則胃苦濁濁氣當出下竅若小便通則濁隨溺去今不通則濁雖下流而不外出於是陰受其濕陽受其熱轉相流被而身體盡黃矣曰穀瘵者病雖始於風寒而實成於穀氣也額上黑微汗出手足中熱薄暮即發膀胱急小便自利名曰女勞瘵腹如水狀不治

腎勞而熱黑色上出猶脾病而黃外見也額於部為廷靈樞云廷者顏也又云腎病者額與顏黑微汗出者腎熱上行而氣通於心以手足心熱薄暮發者病在陰也膀胱急

者腎熱所逼也。心便自利病不在府也。此得之房勞過度熱從腎出故名曰女勞瘵。若腹如水狀則不特陰傷陽亦傷故曰不治。

心下懊憹而熱不能食時欲吐名曰酒瘵。

懊憹鬱悶不寧之意。熱內畜則不能食。熱上衝則時欲吐。酒氣重心而味歸脾胃也。此得之飲酒過多所致故名酒瘵。

陽明病脈遲食難用飽飽則發煩頭眩小便必難此欲作穀瘵。雖下之腹滿如故所以然者脈遲故也。

脈遲胃弱則穀不速化穀化不速則穀氣鬱而生熱而非胃有

實熱故雖下之而腹滿不去傷寒裏實脈遲者尚未可攻况
非裏實者耶

夫病酒黃癰必小便不利其候心中熱足下熱是其證也酒
黃癰者或無熱靜言了了腹滿欬吐鼻燥其脈浮者先吐之沉
弦者先下之酒癰心中熱欬吐者吐之愈

酒之濕熱積於中而不下出則為酒癰積於中則心中熱
於下則足下熱也酒黃癰者心中必熱或亦有不熱靜言
了了者則其熱不聚於心中而或從下積為腹滿或從上衝
為欬吐鼻燥也腹滿者可下也欬吐者可因其勢而越之既

腹滿且欲吐則可下亦可吐然必審其脉浮者則邪近上宜先

吐脉沉弦者則邪近下宜先下也

酒瘰下之久久為黑瘰目青面黑心中如噉蒜狀大便正黑皮

膚之不仁其脉浮弱雖黑微黃故知之

酒瘰雖有可下之例然必審其腹滿脉沉弦而後下之不然

濕熱乘虛陷入血中則變為黑瘰目青面黑皮膚不仁皆血

變而瘀之徵也然雖曰黑瘰而其原則仍是酒家故心中熱

氣熏灼如噉蒜狀一如懊懷之無奈也且其脉當浮弱其色

雖黑當微黃必不如女勞瘰之色純黑而脉必沉也

師曰病黃癰發熱煩渴胸滿口燥者以病發時火劫其汗兩熱
所得然黃家所得從濕得之一身盡發熱而黃肚熱熱在裏當
下之

煩滿燥渴病發於熱而復以火劫之以熱遇熱相得不解則
發黃癰然非內兼濕邪則熱與熱相攻而反相散矣何癰病
之有哉故曰黃家所得從濕得之明其病之不獨因於熱之
而治此病者必先審其在表在裏而施或汗或下之法若一
身盡熱而腹熱尤甚則其熱為在裏裏不可從表散故曰當

下

脉沉渴飲水不利者皆發黃。腹滿舌痿黃燥不得睡。
屬黃家。

脉沉者熱難外出。小便不利者熱不下出。而渴飲之水與熱相得。適足以蒸鬱成黃而已。脾之脉連舌本。散舌下。腹滿舌痿。脾不行矣。脾不行者有濕。燥不得睡者有熱。熱濕相搏。則黃瘰之候也。

黃瘰之病。當以十八日為期。治之十日以上。瘥反劇。為難治。土無定位。寄王於四季之末。各十八日。黃者土氣也。內傷於脾。故即以上土王之數。為黃病之期。蓋謂十八日。脾氣至而虛。

者當復即實者亦當通也治之十日以上差者邪淺而正勝之則易治否則邪反勝正而增劇所謂病勝藏者也故難治瘧而渴者其瘧難治瘧而不渴者其瘧可治發於陰部其人必嘔陽部其人振寒而發熱也

瘧而渴則熱方熾而濕且日增故難治不渴則熱已減而濕亦自消故可治陰部者裏之腑腑關於氣故嘔陽部者表之軀軀屬於形故振寒而發熱此陰陽內外淺深微甚之辨也

穀瘧之病寒熱不食食即頭眩心胸不安久久發黃為穀瘧茵

陳蒿湯主之

穀瘴為陽明濕熱鬱之證陽明既鬱榮衛之源壅而不利則作寒熱健運之機窒而不用則為不食食入則適以助濕熱而增逆滿為頭眩心胸不安而已茵陳梔子大黃苦寒通泄使濕熱從小便出也

茵陳蒿湯

二兩大黃十四梔子茵蒿六兩早煎宜身黃尿短腹微滿利自前陰法最奇

茵陳 六兩

大黃 二兩

梔子 十四枚

右三味以水一斗先煎茵陳減六升內二味煮取三升去滓分

溫三服小便當利。尿如皂角汁狀，色正赤，一宿腹減。黃小便去也。

黃家日晡所發熱而反惡寒，此為女勞得之。膀胱急，少腹滿，身盡黃，額上黑，足下熱，因作黑瘰，其腹脹如水狀，大便必黑，時澇。此女勞之病，非水病也。腹滿者難治，硝石礬石散主之。

黃家日晡所本當發熱，乃不發熱而反惡寒者，此為女勞腎熱所致。與酒瘰、穀瘰不同。酒瘰、穀瘰熱在胃，女勞瘰熱在腎。胃淺而腎深，熱深則外反惡寒也。膀胱急，額上黑，足下熱，大便黑，皆腎熱之徵。雖少腹滿，脹有如水狀，而實為腎熱而氣。