

蒼生司命

苗子也



七

蒼生司命 目錄

經論總抄

四言舉要

內景圖 并解

風寒感冒

藥性

諸證

卷一 元集

中風 一

中氣 二

胃風 三

瘟疫 蝦蟆大頭四

斑疹 五

內傷 飲食七情六慾

卷二 元集

中暑 七

燥症 八

濕症 九

火症 十

鬱症 十一

痰症 十二

卷三 亨集

咳嗽 十三

哮喘 短氣十四

瘧症 十五

霍亂 十六

泄瀉 十七

痢症 十八

卷四 亨集

嘔吐 十九

膈噎 二十

乾逆 二十一

吞酸 二十二

嘈雜 二十三

痞滿 二十四

腫脹 二十五

鼓症 二十六

卷五 利集

積聚 二十七

虛損 二十八

眩暈 二十九

頭痛 三十

胃脘心痛 三十一
腹痛 三十二

腰痛 三十三
脇痛 三十四

背痛 三十五

卷六 利集

諸氣 三十六
疝氣 三十七

脚氣 三十八
痛風 三十九

痿症 四十
麻木 四十一

目病 四十二

耳病 四十三

鼻病 四十四
附喉閉

口病 四十五

齒病 四十六

卷七 貞集

血症 四十七

溺血 四十八

便血 四十九

汗症 五十

瘧症 五十一

厥症 五十二

癰癩 五十三

健忘怔忡驚悸 五十四

三消 五十五

二濁 五十六

夢遺精滑 五十七
淋閉 五十八

秘結 五十九

卷八 貞集

黃疸 六十

痔漏 六十一

調經 六十二

崩漏 六十三

帶下 六十四

胎前 六十五

產後 六十六

五臟 六十七

六腑六十八

蒼生司命目錄終

蒼生司命 卷五

花溪老人虞

搏天民輯

錢塘徐開先振公校

靜觀居士程

林雲來閱

海昌陳彛則子奇訂

積聚痞塊癥瘕瘰癧腸脾石瘕

二十七

血之所積名曰積取鬱積久而發之義也積有五皆
五臟所生陰氣也陰脉沉而伏其症始發有常處其
痛不離其部上下有終始左右有定處皆痰飲食積
死血所爲也

氣之所聚名曰聚取聚散不常之義也聚有六皆六
腑所成陽氣也陽脉浮而動其始終無根本痛發無
定位上下無留止積與聚屬脾俱係氣病
痞者否也猶易所謂天地不交之否濁氣在上凝結
而成也然痞塊有癥瘕痞之不同癥者徵也因物
而成質有塊可徵卽積聚成塊不能移動者也瘕者
假也假物而成形或上下或左右移易能動者瘕
瘕屬肝部俱係血病

痙癰者懸掛偏僻之意也。但痞與痙癰乃胸膈間之
候。積與聚爲肚腹之候。俱在上中二焦主病。故多見
於男子。癥與瘕獨見臍下。是爲下焦之疾。故常得於
婦人。外有腸臍石瘕二証。亦自婦人得之。
腸者大腸也。臍者延也。大腸以傳道爲事。乃肺之府。
肺主衛氣。氣溫則泄。氣寒則凝。今寒氣客於大腸。故
衛氣不榮而結瘕在內。其始發也大如鷄卵。至其成
如懷子狀。久久按之則堅。推之則移。氣病而血未病。

也。故月事未斷，猶以時下是其候也。

石瘕生於胞中。寒氣客於子門。夫膀胱爲津液之府。氣化則能出矣。今寒氣客於子門。則氣塞不通。惡血當瀉不瀉。日以益大。狀如懷子。結硬如石。故名石瘕。此氣先病而血亦後病。故月事不來也。

丹溪曰：痞塊者，在中爲痰飲，在右爲食積，在左爲死血。又曰：凡積塊不可端用下藥，徒損真氣，病亦不去。當消導使之鎔化，塊去須大補，大抵脾胃乃聚痞塊。

之根宜以大補脾胃爲主。脾胃之氣一旺則邪氣自消。故紫古有養正積自除之說。辟之滿座皆君子。其中有小入自無容地而去。斯言信也。治法痰宜二陳加瓦礫子食積保和丸。死血用破血行血順氣藥。通用大七氣湯。貼藥用三聖膏。琥珀膏。難經所載五積見証及東垣五積丸宜參究。

五積見症

肝之積名曰肥氣。在左脇下。如覆盂。有頭足。久不愈。

令人發欬逆痰癰連歲不已

心之積名曰伏梁起臍上大如臂上至心下久不愈

令人煩心

脾之積名曰痞氣在胃脘右側覆大如盤久不愈令

人四肢不收發黃疸飲食不爲肌膚

肺之積名曰息奔在右脇下大如覆杯久不愈令人

洒淅寒熱喘咳發肺癰

腎之積名曰奔豚在小腹上至心下若豚狀或上或

下無時久不愈令人喘逆骨痿少氣

凡痞塊在皮裏膜外須用補氣藥及香附開之兼一

陳湯先須斷厚味爲要

凡婦人腹中有塊多屬死血

凡木香檳榔去氣積神麴麥芽去酒積蚘虫水蛭去

血積礞石巴豆去食積牽牛甘遂去水積雄黃膩粉

去涎積礪砂水銀去肉積各從其類也

脉經曰脉來細而附骨者積也在寸口積在胸中微

出寸口積在喉中在關上積在臍傍出關上積在心
下微在關積在小腸尺微積在氣衝脉出在右積在
右脉出在左積在左脉兩出積在中央各以其部處
之也脉來小沉而實若脾胃中有積聚不下食食
則吐肺積脉浮而平按之辟易心積脉沉而芤
上下無常處肝積脉弦而細腎積脉沉而急
脉沉重而中散者因寒食成積脉左轉而沉重者
氣癥積在胸中脉右轉出不至寸口者內有肉癥也

積聚方

肥氣丸 治肝積

黃連 七錢

厚朴 五錢

柴胡 一兩

川椒 四錢

廣朮 三錢

人參 三錢

昆布 五分

炙甘草 三錢

皂角

茯苓 錢半

巴霜 五分

乾姜 五分

右除茯苓皂角巴霜另研末外諸藥共研成細末入前藥和勻蜜丸梧子大初服二九日加一丸二日加二九漸加至大便微溏再又從二九