

驗方新編卷十目錄

小兒科雜治

初生去毒開口法

保嬰各法

岐真人兒科秘法

夏禹鑄審小兒顏色苗竅法

兒科外治法

指紋切要

稀痘並免驚風

初生面紅啼哭不止

晝啼不止

夜啼不止

曲腰啼哭

遍身奇癢叫啼不止

初生遍身發黃

初生遍身紅赤

初生無皮

週身脫皮

馬刀新編 卷一
兩腿生瘡脫皮

身如蛇皮鱗甲

初生身如魚泡如水晶

瘡似楊梅破爛有孔

紅絲瘤

顙門腫大

頭縫不合

初生眼目紅赤腫爛

小兒鬪眼

小兒變蒸

兩腮腫硬

口角生瘡

口流涎水

口腫並生馬牙

口生白點

初生小兒或兩腮腫硬或口內生瘡或生馬牙或重

舌木舌蛇吐舌及口不開不食乳等症

重舌

木舌

舌忽脹大腫硬卽時絕氣

蛇舌

吐舌

頸軟

痰喘有聲

喉嘶聲啞

小兒病後口不能言

兒不食乳

吐乳

缺乳

斷乳

龜胸

龜背

並治龜胸

腹痛

肚腹脹大亮如水晶

肚皮忽然青黑

腹中鳴如蛙聲

肚臍腫出

臍內膿血不乾

預防臍風

臍風

小兒中惡以及痰閉火閉氣閉乍然卒死

小兒初發瘧疾

氣喘

吐瀉

暑月水瀉

小兒痢疾

初生陰囊過大

忽然陰腫

陰囊赤腫

陰囊腫墜光亮啼哭

陰縮入腹

陽物腫痛

初生小便不通

小便數日不通遍身腫滿

大小便不通

初生大小便出血

夜睡遺尿在床

初生糞門閉塞

足趾向後

疳疾

胎毒

小兒科驚風

驚風論

慢驚

慢驚治驗

急驚

小兒科痘症

痘症治法

痘有四宜

痘有四忌

發熱

形色

起脹

養漿

收結

痘毒

痘症諸方

治驗

辨痘法

看耳法

辟穢氣法

暑月出痘

冬月出痘

出痘兒睡不可驚動

二十四頂方

推拿法

痘疔

舌上痘疔

赤斑核

症出一半忽然不語昏迷不省人事手足冰冷目閉

面青唇白氣息俱涼

熱症方形虛症又現元氣本來虛弱而毒氣猛烈以致痘出不快

上身痘以起脹下身痘尚未出或出而陷下不起

痘不起漿

痘症黑陷不起

兩頭痘

蛇皮痘

空瘡痘

茱萸痘

血泡痘

白漿痘

漏痘

蛙痘

瑠璃痘

草尾珠痘

黑痘

頭面頸項諸痘

眼中生痘

免痘入眼

出痘眼目紅腫

出痘症眼有膿血

出痘眼痛

舌與鼻孔有痘

出痘縮舌

舌上有痘

舌上爛痘

出痘口噤不語

出痘腎腫

腎嘴有痘

陰戶有痘

痘症夾斑夾丹夾疹而出

痘出不透腹痛黑陷

出痘中風

雜痘一齊湧出

驗痘出齊法

痘症作癢

痘中生疽癢不可忍

痘症發熱胡言亂語

痘齊熱退愛睡地上

日夜不安

狂熱痘毒麻木致死

皮肉紅腫而痘不腫

痘症潰爛膿水淋漓

痘症泄瀉

痘症小便不通

痘症大便不通

痘症耳目口鼻出膿

痘風餘毒入目致生翳筋膜或成珠目蟬眼

痘後風眼或起翳赤紅

痘風眼邊紅爛作癢

痘後兩目難開

痘後耳內腫痛時流膿血

痘後鼻常流涕作臭

痘後唇不蓋齒

痘後唇口生瘡

痘後齒癢或出血

痘後牙齦口舌破爛出血或成走馬牙疳

痘後口角流涎

痘後咽喉腫痛

痘後昏迷亂語

痘後聲啞

痘後心痛不可忍

痘後肚腹腫脹

痘後浮腫

痘後癰毒初起紅腫

痘毒色白

痘後遍身無皮膿水不絕

痘後虫蝕疳瘡

痘風瘡逢春卽發

孕婦痘症

發熱

見點

灌漿

墮胎

產後出痘

引牛痘說

堅信洋痘說

小兒科痲症

痲症論

痲症與傷寒辨

論痲症輕重

痲症四忌

痲症治法

痲發不起

痲症作癢

蘇軾詩

蘇軾詩

蘇軾詩

蘇軾詩

蘇軾詩

蘇軾詩

蘇軾詩

蘇軾詩

蘇軾詩

蘇軾詩

蘇軾詩

蘇軾詩

蘇軾詩

驗方新編卷之十

小兒科雜治

初生去毒開口法

小兒初雜母體口有液毒形如血塊啼聲一出隨即嚥下而毒伏於命門他日發爲驚熱瘡疾惡痘等症須於未啼時急用絲綿裹指挖去口內濁穢以清臟腑

又方 新產小兒飲食未開胃氣未動是混一清虛之府

以甘草細切少許將潔淨細絹包裹用開滾水泡浸盞內不宜太甜乃用軟帛裹指蘸汁偏拭口中去其穢濁隨用

胡桃肉又名核桃去皮研極爛以稀絹或薄紗包如小棗納兒

馬方新編 卷一
口中任其吮汁吮盡方可食乳非獨和中且能養臟最佳法也

又方

熟軍

只壳

歸尾

生甘草

各五分

紅花

叁分

桃仁

叁分

此藥須早預備兒初生時卽以水一茶盅煎至

半盅以新棉花一塊放藥水內泡透取出裹指上納兒口中吮之再泡再吮不吮則已過片時小兒解下黑糞再與吮之以糞色不黑爲止此藥必於下地六個時辰內服之服後方可食乳此方最能去毒免疾有益無損

又方

凡小兒落地時燒橄欖核一枚存性研末硃砂

五分

和勻嚼生芝蔴一口津吐和藥絹包如棗核大安兒口中

待嘔一時頃方可與乳此藥取下腸胃穢毒令兒少疾出痘亦稀少也

又方 淡豆豉

甘草

各叁錢

濃煎汁屢屢與食以一酒盃

爲度其毒自下又能助養脾氣且免驚風

又方

若母體氣素寒小兒清弱者及產時收生遲慢致

受風寒者兒必面色光白唇色淡紅只以淡薑湯服之最能去胃寒通神明並可免吐瀉之患此法最妙人所未知服後仍照各前方治之

保嬰各法

凡天寒孩兒生下不哭或已哭不響宜急用衣物包裹再

用香油紙撚將臍帶艾火炙斷使煖氣入腹漸漸作聲而活倘或先剪斷臍帶氣絕死矣

有悶臍生者兒糞門有一膜閉住其氣故不能出聲當以手微拍之則膜破而能哭如拍之不破須用女人之輕巧者以銀簪輕輕挑破或不能挑者急用煖衣緊抱勿令散放用藥水浸其胞衣天寒則加火熱之久則熱氣內鼓其膜自破出聲而甦

兒生三日有於髮際中間灸者乃灸其風路也然此法因西北地土多寒故宜若東南地土多溫斷不宜灸

兒生次日卽看口中上腭有白泡點子卽以銀針輕輕刮