

蔬
菜
篇

蔬菜篇

四川省

(萬縣)高苣

高苣係葉菜類，選種方法，鑷別母體留種擇重者，播種時期七月或八月間，移植時期十一月至翌年二月，收穫時期九月至十月上。適宜肥沃壤或質土，肥料施用人糞尿或廐肥，病蟲害甚少，忌連作，每畝收穫量約一千斤左右。

甘藷

甘藷係根菜類，選種方法，鑷別小形規矩而肉質佳者，播種時期在二月間，移植時期四月至五月，收穫時期九月間，土宜砂質壤土，肥料施用豬糞，蟲害有綠色豬兒虫

捕殺之，忌連作，每畝收穫自一千餘斤至二千斤。

馬鈴薯

選種方法隨意擇取形正者，播種時期一月至二月，移植時期點播並不移植，收穫時期在四五月，土宜砂質壤土，肥料施用人糞尿，蟲害有

雞冠虫，無法防除，忌連作，每畝可收二千斤。

菠菜

選種方法風選重粒者，播種時期九月至十月，移植時期點播不移植，收穫時期十二月至翌年二月，土宜適宜砂粘土，肥料施用人糞尿二三，無病

蟲害，忌連作，每畝收穫約三四百斤。

附註

以上各項係四川省第九區農林實驗學校所調查，高苣在萬縣一區所調查，甘藷在萬縣四區所調查，馬鈴薯在萬縣三區所調查，菠菜在萬縣六區所調查。

(眉山)白菜

選種方法選生長中庸，捲心早而堅實者，播種時期八月中旬，收穫時期十二月初旬，土宜適宜砂質壤土，肥料施用人糞尿每畝一千斤，菜餅三十斤，病蟲害未有防除，忌連作，每畝收穫量二千斤左右。

蘿蔔

選種方法選生長優良根部長而兩端相等者為種子，播種時期八月初旬至九月中旬，收穫時期十一月中旬至十二月上旬，土宜適宜砂質壤土，肥料每畝施用人糞尿一千斤菜餅三十斤，病蟲害未防除，忌連作

，每畝可收三千五百斤。

冬瓜

選種方法選生長中麻結實低矮者為佳，播種時期在春分，移植時期在三月下旬，收穫時期六月下旬至七月上旬，土宜砂質壤土，肥料每畝施用人糞尿一千斤菜餅一百斤，

病蟲害未防除，不忌連作，每畝收三千斤。

高苣

選種方法擇生長良好開花期遲者，播種時期八月中旬，收穫時期十一月中旬，土宜適宜砂壤土，肥料每畝施行人糞尿一千五百斤，病蟲害未防除，不忌連作，每畝可收二千五百斤。

以上各項係四川省第四區農林實驗學校於二十七年十二月在眉山縣王家場所調查。

附註

以上各項係四川省第四區農林實驗學校於二十七年十二月在眉山縣王家場所調查。

(成都)花椰菜

選種方法擇大者作種，播種時期在八月，移植時期九月，收穫時期十一月，土宜砂質壤土，肥料施用人糞尿，每畝收二千五百斤。

花秧子蘿蔔

選種方法擇大者作種，播種時期在八月，移植時期九月，收穫時期十一月，土宜砂質壤土，肥料施用人糞尿，每畝收二千五百斤。

大者作種，播種時期，八九月間，收穫時期十一月至十二月，土宜適宜砂質壤土，肥料施用人糞尿，每畝可收二千五百斤以上。

紅油菜

選種方法擇生長良好者為種，播種時期八九月間，移植時期九十月間，收穫時期十一月至十二月，土宜適宜砂質壤土，肥料施用人糞尿，每畝可收二千五百斤以上。

收穫時期自十一月，十二月至明年一、三月，土宜壤，肥料施用人糞尿，每畝收二千五百斤左右。

羊角青菜

選種方法擇種子大小色澤純正者，播種時期九月，移植時期十月，收穫時期一二月間，土宜壤土，肥料施用人糞尿，每畝收三千斤左右。

附註

以上各項係四川省立高級農業學校於二十七年十二月在成都所調查。

(江、彰、昭)廣、劍、

高苣

選種方法擇大而茂者，播種時期九十月間，移植時期在種植一月後收穫時期二月至三月，土宜砂質壤土，肥料施用人糞尿四次至六次，蟲害有土蠶為害，挖土捉除之，不忌連作，每畝可收五千斤。

六千

莖菜

選種方法擇根播種均可，播種時期九十月間，並不移植收穫時期分三期，春天收芽，夏天收莖，秋土收穫，土宜砂土，施用肥料及病蟲防除與高苣同，不忌連作，每畝收三四担。

新根。

蘿蔔

選種方法擇大而茂者切去半截再鋤以度，播種時期九、十、十一月，並不移植，收穫時期在春二月間，土填適宜砂土，施用肥料，病蟲防除及忌連作與否均和韭菜同，每畝收四五千斤。

瓜類

選種方法擇老而重者，播種時期四月，移植時期在種植半月後，收穫時期三四月，土填適宜腐植質土，肥料施用磷氮一次至二三次，虫害有螢火蟲，用人工捕捉，不忌連作，每株可結瓜三四個。

附註

以上各項係四川省第十四區農林實驗學校於二十八年一月在彭明、江洲、昭化、廣元、劍閣各縣所調查。

（永川）甘藍

選種方法係篩選法，播種時期十月，移植時期十月下旬，收穫時期翌年四月，土宜填土，肥料施用人糞尿，每畝施二百担，病蟲害，用人工防除，忌連作，每畝可收五百市斤。

附註

選法，播種時期七月，移植時期七月下旬，收穫時期十二月，土宜填土，施用肥料病蟲防除及忌連作與甘藍相同。

（宜賓）甘藍

選種方法係篩選法，播種時期十月，移植時期十月下旬，收穫時期翌年四月，土宜填土，肥料施用人糞尿，每畝施二百担，病蟲害，用人工防除，忌連作，每畝可收五百市斤。

（宜賓）甘藍

選種方法係篩選法，播種時期十月，移植時期十月下旬，收穫時期翌年四月，土宜填土，肥料施用人糞尿，每畝施二百担，病蟲害，用人工防除，忌連作，每畝可收五百市斤。

附註

以上各項係四川省第三區農林實驗學校於二十七年十二月在水川西附城檢實地所調查。

（錦陽）萵苣

選種方法留種選株，播種時期在九月間，移植時期十月，收穫時期十二月，土宜填土，肥料施用人畜肥或堆肥每七日一次，忌連作，每畝約收一千三百市斤。

附註

播種時期在十月，收穫時期十二月，適宜土填及施用肥料血黃豆，虫害有青虫，形如蠅之幼虫，其防除法以人力掃之，不忌連作，每畝收穫量約一千五百市斤。

附註

大粒，播種時期在九月，收穫時期十一月，土宜砂土，肥料多施人畜肥，每七八日施一次，不忌連作，每畝約收八百五十市斤。

大蒜

選種方法與菠菜同，播種時期在九月，收穫時期在十二月至明年一月。

菠菜

選種方法留種選株，先選株，再選種。

，土宜砂土，施用肥料及忌連作否與
莖葉同，每畝收穫量約六百市斤。

以上各項係四川省第十三區農林實驗學校於二十七年十二月在綿陽縣所調查。

附註

（慶符）蔴

附註

選種方法係株選法，播種時期八九月間，移植時期，本葉五六片時，收穫時期，在植後四五十日，土宜
粘質土壤，肥料施用人糞尿堆肥，病害有根瘤病，防治法去病株，不忌連作，每畝可收五六百斤。

以上一項係四川省高縣縣立初級普通農作科職業學校於二十七年十二月在慶符老壩子所調查。

（宜賓）蘿蔔

大約有二千
五六百斤。

大蒜

選種方法選蘿蔔之肥大者，留植土中，俟其子成熟後採下，播種時期舊曆七八月，移植時期十月間，
收穫時期十二月底，土宜砂質壤土，肥料施用人畜糞尿，病虫害用人工捕捉，不忌連作，每畝收穫量
選種方法，選擇大而勻整者連整袋束懸陰處，播種時期八月內，並不移植，收穫時期翌
年二月，土壤適宜腐植質土，肥料施用人畜糞尿，無病虫害，不忌連作，每畝收穫量無
不加選種，播種時期七月中旬，移植時期九月間，收穫時期本年臘月至次年一月，土

法估

白菜

宣腐植質土，肥料施以液肥，虫害，人工捕捉，不忌連作，每畝收穫約二千餘斤。

南瓜

選種方法選其大而堅實者，播種時期正月下旬，移植時期二月中旬，收穫時期七八月間，土宜粘質壤
土，肥料施行堆肥，病虫害防除法，以草木灰敷佈葉面，不忌連作，每畝收穫量一千餘斤。

以上各項係四川省宜賓縣立初級普通農作科職業學校於二十七年十二月在宜賓泥溪一帶所調查。

附註

（江津）白菜

選種方法用風選，播種時期在九月，移植時期在十月，收穫時期十二月，土
宜沙土，肥料施用人糞尿，病虫害用烟汁防除，忌連作，每畝可收三百斤。

甘藍

選種方法係水選法，播種時期在
期八月，並不移植，收穫時期十一月，土壤適宜粘質壤土，肥料施
用人糞尿，病虫害用草木灰防除之，忌連作，每畝可收五百餘斤。

蘿蔔

選種方法係水
選法，播種時

次年二月，土宜沙土，肥料施用人糞尿，病蟲害用人工捕殺，不忌連作，每畝收穫約二百斤。

青菜

選種方法，保風選法，播種時期九月，移植時期九月，收穫時期翌年一月，土宜沙質壤土，肥料施用人糞尿，病蟲害用人工捕殺，

忌連作，每畝收四百斤。

附註

以上各項係四川省新民學校於二十八年一月在江津十全鎮所調查。

(江津) 蘿蔔

選種方法擇大者去根栽培，播種時期八月下旬至九月中旬，收穫時期十二月下旬至翌年一月，土宜砂質或粘質土壤，肥料施用人糞尿，病蟲害施用苦彈子以防除之，不忌連作，每畝可收穫七八担。

冬瓜

選種方法擇大者取子陰乾做種，播種時期二月初旬，收穫時期八月下旬至九月中旬，土宜砂質土壤，肥料施用人糞尿或菜餅，病蟲害無正確方法防除，最好每隔二年輪作一次，每畝收穫量約一千斤。

甘藍

選優良者為種，播種時期分兩期，第一期七月上旬，第二期十二月中旬，移植時期播種後三四十日即可移植他地，收穫時期第一期十二月間，第二期六月間，土宜砂土壤，肥料施用人糞尿或菜餅，病蟲害無正確方法防除，不忌連作，每畝可收九担左右。

，無病蟲害，不忌連作，每畝每次可收穫四五担。

韭菜

選種方法選葉大者分株栽培，播種時期在十二月下旬分株栽培，收穫時期自二月起至十一月止，每月可收穫一次，土宜砂質土壤，肥料施用人糞尿

附註

以上各項係四川省江津縣立職業學校於二十七年十二月所調查，蘿蔔在江津東門外所調查，冬瓜，甘藍在江津寶壩沱所調查，韭菜在江津大砂壩所調查。

(瀘縣) 甘藍

選種方法購買成都種子為種，播種時期八月中旬，移植時期九月中旬，收穫時期十二月下旬至一月間，土宜砂質壤土，肥料施用人糞尿，病蟲害用人工捕捉，不忌連作，每個畝約四五斤。

菠菜

選種方法選優良株留種，播種時期九月初旬，收穫時期十一月，土宜適宜砂土，肥料施用人糞尿，病蟲害無法防除，不忌連作。

燕青

選種方法，擇小株留種，播種時期九十月間，移植

時期種後一月後，收穫時期十二月內，土宜粘壤土，肥料施用人糞尿，不生病蟲，不忌連作，每畝約收半斤。

青菜

選種方法擇大株留種，播種時期八月初，移植時期九月，收穫時期翌年二三月間，不擇

土壤，肥料施用人糞尿，無病蟲害，不忌連作，大者每畝四五斤。

附註

以上各項係四川省第七區農林實驗學校在瀘縣鹽田壩所調查。

(銅梁) 甘薯

選種方法選芽眼肥大者為種，播種時期三月中旬育苗，移植時期四月初旬摘籐，收穫時期八九月間，土宜適宜砂質土，肥料用人糞尿，在摘籐後施下，病蟲害尚少，不忌連作，每畝收穫六百斤。

馬鈴薯

選種方法選芽眼肥大者，播種時期四月上旬，並不移植，收穫時期八九月，土宜砂質壤土，肥料在種後施用一次，無病蟲害，不忌連作，每畝平均收穫有七百餘斤。

大蒜

選種方法

擇鱗莖肥大者，播種時期四月上旬，並不移植，收穫時期八九月土宜砂質土，施用肥料，種下後施人尿一次，無病蟲害，不忌連作，每畝可收十百餘斤。

萵苣

選種方法擇種子肥大者，播種時期八月土

旬，移植時期八月下旬，收穫時期在十月間，土壤適宜砂質壤土，肥料於下種後施尿一次，無病蟲害，不忌連作，每畝收量二百餘斤。

(武寧) 附註

以上各項係四川省銅梁縣縣立銅梁縣學校於二十七年十二月在銅梁縣所調查。

福建省

(政和) 蘿蔔

選種方法擇生長長大之蘿蔔留作種，播種時期在霜降，收穫時期大寒，土宜砂盾壤土，肥料每株施用人糞尿五斤，蟲害有金龜蟲，用人工捉滅，每畝收穫約四百斤。

大蒜

選種方法

(安義)附註

以上各項係福建省政和縣政府於二十八年二月在政和縣第一區調查。

(崇安)蘿蔔

選擇方法用人糞淘汰視種籽有無混合，播種時期國曆七八月，移植用直播法，收穫時期十月十一月。

一次約三百斤，病害有根腐病，防除法排水
優良之地，不忌連作，每畝收二千五百斤。

結球白菜

選擇方法與蘿蔔同，播種時期七八月，移植時期出芽後十五日，收穫時期十一月十二月間。

西瓜

選擇方法與蘿蔔同，播種時期三月下旬，用直接播法，收穫時期八月，土

宜粘質肥沃土壤，肥料施用堆肥每畝一千斤，補肥用人糞尿
九百斤，分數次施之，虫害有蚜虫，每畝收穫量約一千株。

菠菜

選擇方法與蘿蔔同，播種時期九月中旬，用
疏枝法，收穫時期十二月，不擇土質，病害

有炭疽病無法防除，不忌
連作，每畝可收一千斤。

附註

以上各項係福建省崇安縣縣務所於二十八年一月所調查，蘿蔔，結球白菜在崇安下梅所調查，西瓜，

蘿蔔

播種時期白露，並不移植，收穫時期種後兩月，肥料施用
人糞，虫害有烏克虫用虫藥或當地藥草防除，不忌連作。

包菜

完全與蘿蔔
同。

甘藷

播種時期春分，移植時期谷雨，收穫時期白露，肥料
施用人糞灰肥，有野豬為害，不忌連作，每畝收穫

收額，肥料施用人糞，無病虫害，不忌連作。
百零一
千斤。

瓜類

播種時期清明，並不移植，收穫時期六七月間，肥料施用人糞，虫害有守瓜虫，用虫藥防
除之，忌連作。

附註

以上各項係福建省崇安縣茶業改良場於二十八年一月在崇安縣赤石鎮附近所調查。

蘿蔔

選種方法擇成熟早，生長良好，形狀正齊者爲種，播種時期九月，不行移植，收穫時期十月，土宜砂質壤土，肥料施用人糞尿草木灰廐肥等，施量視農家之勤勞與否而異，實用量不定，施肥期在生育期陸續備下，虫害有硬壳虫線虫用雷公藤砒霜防除，或用人工捕殺，不忌連作，每畝收穫二千餘斤。

甘藷

選種方法，土宜施用肥料及收穫量與蘿蔔同，播種時期三月，移植時期五月，收穫時期九月，病害有黑瘧病，防除法與蘿

蔔同，不忌連作。

山藥

選種方法，施用肥料，與蘿蔔同，播種時期九月，土宜新壤土，不忌連作，每畝可收四五百斤。

白菜

選種方法

，施用肥料與蘿蔔同，播種時期九月下旬，移植時期十月下旬，收穫時期十二月，土宜壤土不忌連作，虫害有車心虫及黑壳虫，防除法與蘿蔔同，每畝收三四千斤。

芥菜

菠菜

完全與白

菜同

南瓜

選種方法及施用肥料與蘿蔔同，播種時期於清明前後，移植時期四月中旬收穫時期五月下旬，土宜壤土或磚質粘土，虫害有螢火虫，用虫害或人工殺滅之，不忌連作，每畝可收五六百斤。

西瓜

不行移植，收穫時期七月上旬，每畝可收一千餘斤，其餘各項與南瓜同。

冬瓜

移植時期四月中旬，收穫時期六月中旬，土宜砂質土，不忌連作，每畝收五六百斤，其餘各項與南瓜同。

絲瓜

完全與冬瓜同。

附註

以上各項係福建省崇安縣立苗圃崇安縣所調查。

(安溪)甘藷

選種方法選地根所生之苗以種植，播種時期十一月中旬，移植時期翌年四月上旬，收穫時期九月上旬，土宜壤土，砂質壤土及沙質土，施用肥料於移植後二十日施廐肥一次，每株四斤至六斤，一月後再施一次，病虫甚少發現，不忌連作，每畝收穫量平均三千斤。

白菜

種子由同安縣購買，播種時期九月上旬，移植時期十月上旬，收穫時期十一月月中旬，土宜砂壤土，肥料施以堆肥廐肥，半月施一次，

虫害有夜盜虫，無法防除，忌連作，每畝收七千五百斤。

害有粉蝶虫，宜相當防除法，忌連作，每畝收二千六百斤。

忌連作，每畝收七千斤。

蘿葡

選種方法擇強健母株俟其開花結實收藏下年播種，播種時期十一月上旬，收穫時期翌年一月上旬，土宜壤土，肥料施用廐肥草灰尿水，虫

冬瓜

選種方法選肥大之果實取其種子留用，播種時期三月上旬，收穫時期三月下旬，收穫時期七月上旬，土宜壤土，肥料施用豆餅廐肥人尿，

附註

以上各項係福建省安溪縣立苗圃於廿八年二月在安溪縣第一二區所調查。

(晉江)白菜

選種方法選優良種子用風選淘汰，播種時期七月，移植時期七月下旬，收穫時期十二月，土宜沙質壤土，肥料施用廐肥人尿，病蟲害用人工防除，忌連作，每畝可收一千斤。

南瓜

選種方法

方法，施用肥料病蟲防除三項與白菜同，播種時期二月，移植時期四月，初旬，收穫時期九十月間，土宜腐植質土壤，忌連作，每個有十餘斤。

絲瓜

選種方法，施用肥料及病蟲防除與白菜同，播種方法二

月，移植時期三月下旬，收穫時期五六月間，土宜黑質土壤，忌連作，每株可收十餘斤。

芥菜

播種時期八月，移植時期九月初旬，收穫在期十一月，忌連作，每市畝可收三千五百斤，選種，土壤，

均與絲瓜同。

附註

以上各項係福建省晉江縣立苗圃於廿八年二月在晉江縣北門外所調查。

(南安)蘿葡

選種方法，向沙溪購買種子，播種方法九月，並不移植，收穫時期十月，土宜沙土，肥料施用廐肥，虫害有黃綠蝨虫，用石灰除之，忌連作，每畝收穫二千斤。

芥菜

由外縣而來種

子播種，播種時期八九月間，移植時期九月，收穫時期十一月，十二月間，土宜壤土，肥料施用廐肥草木灰，虫害有蝨虫，用石灰除殺，忌連作，每畝收穫量一千五百斤。

白菜

種子由外縣買來，

播種時期。九月移植時期九月十月，收穫時期十一月，十二月間，土宜壤土，肥料施用人糞尿草木灰，病害有黑腐病，不忌連作，每畝收一千二百斤。

以上各項係福建省南安縣溪美苗圃於二十二年二月在南安縣彭洋鄉所調查。

附註

(永春)芥菜

選種方法風選法，播種時期多季，移植時期發育後一星期，收穫時期翌年二月間，土宜腐植土，肥料以堆肥為基肥，發芽後施以稀薄人畜尿，虫害有蚜虫用石油乳劑以驅除之，每畝約收六百斤。

菠菜

選種方法風選法，播種時期九月下旬，移植時期發芽二星期內，收穫時期十月下旬，土宜腐植土，施行肥料與芥菜同，每畝收穫四百斤。

附註

以上各項係福建省永春縣立苗圃於廿八年二月在永春縣仙溪村所調查。

(閩清)甘藷

選種方法，普通用比較方法選擇其球根繁殖之，播種時期播苗在三月至六月，並不移植，收穫時期七月八月至十月，土宜沙質壤土，病虫害無法防除，不忌連作，每畝收穫平均十多担。

方法，用比較方法選擇其球根繁殖之，播種時期四月，收穫時期十月至十一月，土宜鬆疏土壤，病虫害無法防除，不忌連作，每畝可收十担左右。

冬蘿蔔

選種方法用比較擇法，播種時期九月至十一月，收穫時期二月下旬或三月上旬，移植時期

初旬，移植時期於發芽後二週內，收穫時期十二月或明年春，土宜鬆疏肥沃土壤，病虫害無法防除，不忌連作，每畝收六担左右。

莖

選種方法及病虫害防除與蘿蔔同，播種時期二月下旬或三月上旬，移植時期

在發芽後七日內，有的不行移植，收穫時期苗高五六寸時便可收穫，土宜半鹽性肥沃土壤，不忌連作，每畝收一担至二担左右。

甘藍

選種方法及病虫害防除與蘿蔔同，播種時期十月，移植時期發芽後七日

內，收穫時期冬季或春季，土宜輕砂土。

白菜

選種方法及病虫害防除與蘿蔔同，播種時期發芽後十日內，收成時期栽種後三個月或四個月，土宜壤土，不忌連作。

月，土宜壤土，不忌連作，每畝收二三担。

芥菜

選種方法及病虫害防除與蘿蔔同，播種時期九月或十月播種於苗床，移植時期十二月或明年二月，收穫時期一二月後，土宜壤土，不忌連作，每畝收三四

租冬筍

筍爲竹所生，未有選種播種及移植方法，收穫時期冬季，土宜粉質土壤，病虫害無法防除，該植物係獨立性無連作可能每畝收穫由數十斤至二担。

附註

以上各項係福建省閩清縣政府第一科於二十八年四月在閩清江南一帶所調查。

甘藷

收穫時期十一月左右，土宜砂壤土，肥料施用人糞尿及草木灰，虫害有砂蜱能鑽入甘藷塊根中，防除法把全數甘藷藥燻，以免來年再患，有病虫害時忌連作，每畝約收十五担左右。

附註

以上一項係福建省福州私立協和職業學校於二十八年十月在閩清三都所調查。

白菜芥菜

選種方法擇優良肥大者，播種時期七八月，移植時期播種後兩星期，收穫時期十月至十一月間，土宜輕鬆肥沃土壤，病虫害普通多用機械防除法及捕殺法，此地農民概不喜連作肥料施用人糞尿，每畝收穫量不多。

葱

向他處購種爲種子，播種時期七八月，移植時期播種後一星期，收穫時期二月，土宜砂質，肥料施用堆肥，忌連作，病虫害防除，收穫量與白菜同。

甘藷

選種

方法擇其小而無虫害者，播種時期四五月，並不移植，收穫時期十月，土宜輕鬆肥沃並含砂

芋

選種方法擇其大而無虫

屑之土壤，肥料施用洋肥，病虫害機械或人工捕殺，此地農民不喜連作，每畝收穫量不多。

冬瓜

播種時期二三月，移植時期播種後一星期，收穫時期六月，其餘各項均與

壤土，肥料施用膏肥，忌連作，病虫害防除及收穫量與白菜同。

刀豆

選種方法以豆子做種子，播種時期七八月，並不移植，收穫時期九月，其餘各項與白菜等同。

蒜

種子向別處購買，播種時期七八月，移植時期播種後二星期，收穫時期明

年三月，其餘與白菜同。

附註

以上各項係福建省福州私立協和農業職業學校在閩清縣五都所調查。

芥菜

餘指

該處農家並不選種，播種時期九月下旬，移植時期十月中旬，收穫時期明年一月中旬。土宜粘質壤土，肥料施用人糞尿及火燒土，虫害有蚜虫及青虫，用人工捉捕，多行輪作未見連作，每畝收穫量約三十餘担。

芥藍

並不選種，播種時期九月中旬，不移植，收穫時期十月下旬便開始拔去出售，土宜粘質壤土，在未播種前施用人糞尿及火燒土為肥料，病虫有青虫，用手捉捕，每畝可收二十餘担。

附註

以上種項係福建省福州私立協和職業學校於二十八年十月在閩清縣六都所調查。

(武平)青菜

選種方法留壯健子成熟做種，播種時期白露，移植時期霜降前，收穫時期霜降後，土宜砂質壤土，肥料施行人糞尿，草木灰，廐肥，堆肥，虫害將柚及柑的皮浸尿澆塗可以防除，虫多時用人工捕之，忌連作，每畝約收八千餘斤。

蕪菁

收穫時期冬至後，忌連作，每畝可收一千六百斤，其餘各項與青菜同。

蘿蔔

播種時期立秋，直播並不移植，忌連作，每畝約收可收二千斤，其餘各項

與青菜同。

冬瓜

播種時期春分，直播不移植，收穫時期立秋，忌連作，每株約收三百斤，其餘與蘿蔔同。

帶豆

收穫時期清明，忌連作，每株有十斤，其餘各項與冬瓜同。

萆薢

播種時期立秋用球莖栽植，收穫時期大寒，忌連作，每畝可收四石八斗，其餘各項與蘿蔔同。

薑

播種時期穀雨用根莖栽培，收穫時期霜降，忌連作，每畝可收五百斤，其餘各項與蘿蔔同。

附註

以上各項係福建省武平苗圃於廿八年二月在武平縣所調查。

(長樂)蘿蔔

選種方法係選，播種時期八九月，並不移植，收穫時期十二月，土宜深度肥土，肥料施用人糞，無病虫害，忌連作，每畝收約四五担。

芥菜

選種方法係選，播種時期五六月，

移植時期六七月，收穫時期有兩期，早生種八月收，晚生種十二月收，土宜溫肥壤，無病虫害，忌連作，每畝可收四五担至七担。

菠菜

選種方法係選，播種時期春播三月，秋播七月，並不移植，收

穫時期播種後七十日，土宜肥沃粘土，肥料施用人糞，無病虫害，忌連作，每畝收穫量百餘担。

芥菜

選種方法係選，播種時期九月下旬十月上旬，移植時期苗達三寸時，收穫時期播種後七十日即可

，土宜肥沃土壤，肥料施用人糞，無病蟲害，不忌連作，每畝收二十餘担。

附註

以上各項係福建省長樂縣縣立苗圃於廿八年二月在長樂十洋街所調查。

(仁壽)蘿葡

選種方法選生長完全形狀端正者，播種時期七月中旬，並不移植，收穫時期九月初旬至十月下旬，土宜沙質壤土，肥料施用人糞草木灰，虫害有蚜蟲金龜子等，用人工捕殺之，忌連作，每畝可收七百斤至一千二百斤。

白菜芥菜

選種方法選大而形狀未變者，播種時期七月下旬至八月初旬，收穫時期十月至翌年二月，土宜沙質壤土，肥料施用人糞尿及桐子粕，病蟲害有金龜蚜蟲，用人工捕殺，可連作，每畝收一千斤至一千五百斤。

南瓜冬瓜

選種方法選大而形狀端正者，播種時期二月下旬，移植時期三月中旬，收穫時期七月初旬至十月下旬，土宜壤土，肥料施用人糞尿及桐子粕，虫害有蜂害果實，可連作，每畝收一千斤至一千八百斤。

薑

選種方法選生長完全者，播種時期三月下旬，並不移植，收穫時期九月下旬至十二月間，土宜沙質粘土，肥料施用人糞尿桐子粕，尚少害蟲，可連作，每畝收穫量一千斤至一千二百斤。

附註

以上各項係福建省仁壽特種區於廿八年六月在仁壽縣所調查。

(連城)蘿葡

選種方法係風選，播種時期八月至九月，收穫時期十月至十二月，土宜黃粘土，肥料施用人糞尿，忌連作。

芥菜

選種方法係風選，播種時期九月至十月，收穫時期十二月，至明年一月，不擇土壤，肥料施用人糞尿，不忌連作。

山藥

並不連種，播種時期三月至四月，收穫時期九月，不擇土壤，肥料施用人糞尿，忌連作。

薑

播種時期三月，收穫時期十月，土宜沙質壤土，不忌連作。

附註

以上各項係福建省農業改進處在連城縣文亨一帶所調查。

空心菜

因感要菜，並不選種，播種方法用去年根來分植，移植時期四月中旬，收穫時期六月以後隔三日或五日便行採摘，至十月以後不飽食，土宜沙質壤土，肥料施用人糞尿，虫害有蚜虫，不忌連作，每畝收穫量約在三百斤左右。

附註

以上一項係福建省高農學校於二十八年一月在連城縣林坊所調查。

蘿蔔

選種方法擇深紅色者為宜，播種時期白露前，移植時期秋分後，收穫時期大寒前後，土宜沙質土，肥料施用堆肥與基肥，無病虫害，不忌連作，每畝收五百餘市斤。薑 選種方法並無規定，播種時期清明後，移植時期立夏前，土宜沙質土，肥料施用堆肥與基肥，無病虫害，不忌連作，每畝收五百餘斤。

白菜

選種方法留重法種，播種方法早熟七月下旬，晚熟八月中旬，移植時期發芽後十月

冬瓜

選種方法將最先結實者留作次年播種，播種時期春分後清明前，移植

時期發芽後七月內移植，收穫時期立冬前後，土宜殖質土壤，肥料施用堆肥與基肥，虫害除用赤絨散布，每株距六四公分，每畝可收千個以上。

附註

以上各項係福建省連城縣政府於廿八年二月在連城縣城廂附近所調查。

（清流）蘿蔔

選種方法係粒選，播種時期七八月，移植時期九十月，收穫時期翌年二月，土宜沙質土，肥料施用堆肥，不忌連作，每畝收四五百斤。

芥菜

選種方法，人力篩選，播種時期七八月

，移植時期九十月，收穫時期翌年二三月，土宜沙質土，肥料施用人糞及草木灰，虫害有青幼虫，用菸粉散去，不忌連作，每畝可收穫十担。

絲瓜

選種方法用人力粒選，播種時期三四月，移植時期四五

月，收穫時期六七月，土宜腐植土，肥料施用堆肥及人糞，虫害有金龜子無法防除，每畝可收五六十斤。

附註

以上各項係福建省清流縣立苗圃於廿八年二月在清流縣所調查。

(明溪) 甘薯

選種方法用淘汰選種法，播種時期三四月，移植時期六月間，收穫時期十月左右，土宜粘質壤土，肥料用人糞尿三次，每畝十餘担，虫害有象鼻虫，用赤手捕殺，忌連作，每畝收穫量十市担左右。

(大田) 山藥

選種方法適宜土壤及施用肥料均與甘薯同，播種時期四五月，移植時期六月，收穫時期十一，十二月，虫害有金龜子用赤手捕殺，忌連作，每畝收穫量平均七八担。

芥菜

選種方法與甘

薯同，播種時期七八月，移植時期九月，收穫時期十一二月，土宜腐植土，肥料施用人糞尿四次，每留七八担，虫害有地剪虫，用赤手捕殺，忌連作，每畝收六七担。

胡瓜

選種方法適宜土壤及施用肥

料與芥菜同，播種時期二月，移植時期三月，收穫時期五月至六月，虫害有介殼虫，用赤手捕殺，不用連作利用間作，每畝約收六七担。

附註

以上各項係福建省明溪縣立農場於廿八年五月在明溪縣各區所調查。

(泰寧) 蘿蔔

選種方法用人選重大完整者，播種時期八九月，收穫時期十一月，土宜砂壤土，肥料用人糞尿，虫害用人工捕除，忌連作，每畝收五百斤。

白菜

土宜粘土，每畝收四百餘斤，其

餘各項均與蘿蔔同。

南瓜

播種時期三月，收穫時期六月，七月，其餘各項與白菜同。

冬瓜

完全與南瓜同。

附註

以上各項係福建省第一區署在泰寧縣所調查。

(建寧) 蘿蔔

選種方法三月間將種子收藏乾時使用，播種時期七月，移植時期八月，收穫時期，明年二三月，土宜粘土，不適黃土，肥料先施用糞尿，後用稻草鋪其上，無病虫害，忌連作，每畝收穫量五六担。

附註

以上一項係福建省警務所於廿八年二月在建寧縣水南所調查。

芥菜

選種方法三月間選黑色肥強形狀端整者，播種時期舊曆八月間，收穫時期九月十，土宜黑色土壤，肥料每十天施用尿水一次，無病虫害，每畝可收十担。

附註

以上一項係福建省建寧縣所於廿八年二月在建寧縣河東所調查。

蘿蔔、白菜

選種方法擇形狀較大者，播種時期七八月，移植時期播種後月半，收穫時期播種後一月，土宜粘芥菜、冬瓜土，肥料施用人糞或畜糞，無病虫害，不忌連作，每畝收六十株左右。

附註

以上各項係福建省第二區署於廿八年二月在建寧第二區所調查。

（寧化）白菜

選種方法須選大粒而光亮者，播種時期春分移植時期立秋

菜

冬瓜

選種方法，選老者為種，播種時期清明，移植時期立夏，收穫時期立秋，肥料施用堆肥，無病虫害。

種時期暑，肥料施用堆肥，無病虫害。

附註

以上各項係福建省上進鄉農會於廿八年二月在寧化縣所調查。

（大田）芥菜

選種方法用篩選法，播種時期九月初旬，移植時期九月下旬至十月初旬，收穫時期次年三月，土宜腐植土，肥料用廐肥人糞尿，病虫害用菜籐草粉抹撒在葉面以防除之，忌連作，每畝收二千五百斤左右

菠菜

選種方法與芥菜同，播種時期九月下旬，移植時九月中旬，收穫時期次年二月，土宜排水良好之腐植土，肥料施用廐肥人糞尿，虫害用菜餅燒熟碾末撒根部之周圍，忌連作，每畝約收千斤。

蘿蔔

選種方法用輕重選擇法將風鼓吹之，播種時期七月初旬，並不移植，收穫時期十月下旬，土宜砂質壤土，肥料施用廐肥人糞尿，無病虫害，不忌連作，每次可收五千斤。

蕪菁

選種方法

芥菜

播種時期清明後，移植時期立冬，收穫時期太雪，其餘各項與白菜同，選種方法須將種烟干燥淨，播種時期芒種，移植時期夏至可收回薑母，收

薑

芒種，移植時期夏至可收回薑母，收