

下利  
小便不利  
大便秘結  
合病  
併病  
壞症  
昏冒  
熱入血室

不語  
發斑  
溫病  
瘧病  
夾食  
瘕病  
陰厥陽厥  
足冷

秦皇士傷寒大白卷四

精校本  
斷句

傷寒大白

王大錯署簽

傷寒大白卷一目錄

傷寒熱病總論

驗舌色

驗唇口論

驗二便論

辨脉論

南北方宜發表不同論

南北方宜清裏相同論

三陰熱病論

三陰寒病論

陰症似陽論

陽症似陰論

宜發表忌發表論

宜清裏忌清裏論

宜和解忌和解論

宜吐法忌吐法論

宜溫經忌溫經論

宜攻下忌攻下論

宜消導忌消導論

宜補虛忌補虛論

誤下不宜再下論

惡寒 發熱

寒熱症 身痛

頭痛 項強

咽痛

傷寒大白卷二目錄

似瘧

潮熱

煩燥

譫語

發狂

嘔吐

喘逆

身重

身癢

頭眩

口渴

口燥

唇焦

衄血

畜血

下血

傷寒大白卷三目錄

無汗

自汗

頭汗

盜汗

懊懷

不得卧

發黃

面赤色

胸滿

脅滿

心下滿

結胸

痞滿

咳逆

呃逆

腹痛

傷寒大白卷四目錄

下痢

小便

大便

合病

併病

壞症 附昏冒

熱入血室

不語

發斑

溫病

疫病

夾食

瘧病

陰陽厥

足冷

傷寒大白卷四

雲間秦之楨皇士纂著

下利

下利當分陰陽表裏在表有寒溼風溼溼熱在裏有積熱傷食藏寒冷飲外感寒溼下利惡寒身痛無汗脈浮瀉下清水色如屋漏口不作渴此寒溼傷於太陽也北方麻黃桂枝湯江南用羌胡敗毒散先散毒邪利未止五苓散分利小便便若頭額眼眶痛六脈長大此寒溼傷於陽明也蒼防乾葛湯解表後用猪苓湯利小便若時寒時熱六脈弦大此寒溼傷於少陽也以柴苓湯主之外感風溼下利則骨節煩疼惡風身痛自汗脈浮此風溼傷於太陽也北方用桂枝防風湯江南羌活防風湯小便不利蒼防四苓散若額痛目痛手足拘痛身熱多汗六脈長大此風溼傷陽明也蒼防乾葛湯利未止合猪苓湯若寒熱往來嘔而口苦此風溼傷於少陽也蒼防柴胡湯主之外感溼熱下利發熱惡寒六脈浮大此溼熱傷於太陽也先用羌獨敗毒散發表後用清溼熱若發熱自汗六

脈長數。此溼熱傷於陽明也。先用乾薑石羔湯。後用川連枳殼湯。若寒熱口苦。此溼熱傷於少陽也。先用柴胡湯。後用黃芩芍藥湯。河間芍藥黃連湯。臍腹作痛。裏急後重。大柴胡湯。香連丸。又有發熱汗出。煩躁口乾。頭痛身痛。時寒時熱。下利。脈大。三陽挾熱下利。俗名漏底傷寒。此溼熱先傷腸胃。又因早晚風露外束。溼熱不得外泄。下流大腸而下利。宜以羌防柴苓湯。先散表邪。後以猪苓湯分利溼熱。若寒熱往來。口苦而嘔。症兼少陽。宜柴胡湯。此症若不先散表邪。即用清裏。則表邪內縮。不死不休。又有表邪已解。裏熱不散而下利。當用清裏治法。如黃芩黃連湯。香黃翹等。若痛而即利。利後稍減少。頃復痛復利。宜川連枳殼湯。欲便不得便。腹痛有下症。承氣湯下之。忌有飲食不節。損傷腸胃。腹中常痛。常利者。此傷食成利症也。宜保和平胃散。家秘消積散。又有本是積熱。日發熱口乾。過食生冷。以致腸鳴下利。此因熱傷冷症。宜大順飲等。另有初起不發熱。口不渴。小便清白。大便滑泄下利。六脈沉遲。此三陰藏寒下利也。輕者理中湯。重者四逆湯。夫三陰寒利。脈宜沉小。三陽外感下利。脈忌沉小。內傷下利。左

關弦大者主死。外感下利。左關弦大。反不作死論。以人迎脈大。正合外感身熱症耳。

太陽病。外證未除。而數下之。遂協熱而利。利下不止。心下痞鞭。表裏不利者。桂枝人參湯主之。

表症誤下。若不見表邪。變下利。痞滿結胸者。用瀉心湯。陷胸湯。今下後表裏不解。故仍用桂枝解表。加人參和中氣。

傷寒服湯藥。下利不止。心下痞鞭。服瀉心湯已復。以他藥下之。利不止。醫以理中與之。利益甚。理中者。理中焦。此利在下焦。赤石脂禹餘糧湯主之。復利不止者。當利其小便。

此因誤下多下。以致下焦不固。又以理中誤治中焦。故用固下焦藥。設利不止。又當分利小便。以此條是水穀利耳。

傷寒發熱。汗出不解。心下痞鞭。嘔吐而下利者。大柴胡湯主之。

發熱。陽邪也。汗出不解。心下痞鞭而下利。裏症也。故以此方雙解表裏。

大陽與少陽合病。自下利者。與黃芩湯。若嘔者。黃芩加半夏生薑。

大陽與少陽合病。自下利。宜治少陽。故用黃芩湯。若見嘔。加半夏生薑。

陽明少陽合病。必下利。其脈不負者。順也。負者失也。互相尅賊者。為負也。脈滑而數者。有宿食也。當下之。宜承氣湯。

木邪乘尅。腸胃下利。若少陽脈大。則陽明受病重。設陽明脈滑數。方可下之。此闕防下利。忌陽明脈弱。更不可誤下。

太陰之為病。腹滿而吐食不下。自利益甚。時腹自痛。若下之。必胸下結鞭。

太陰腹滿吐食不下。自利而腹自痛。非陽明下症腹痛。若誤下之。則胸下結硬。自利不渴者。屬太陰。以其藏有寒故也。當溫之。宜服四逆輩。

上章以腹滿吐食自利定真太陰。此章以自利不渴承明太陰寒症。尚論書皆註熱邪誤也。

傷寒脈浮而緩。手足自溫者。繫在太陰。太陰當發身黃。若小便自利。不能發黃。至七八日。雖暴煩下利日十餘行。必自止。以脾家實。穢腐當去故也。

脈浮。陽脈也。脈緩。太陰也。上章以自利不渴。定其太陰寒症下利。此章以脈浮手足自溫。定其太陰溼熱下利。太陰溼熱。當發身黃。若小便自利。不發黃。至七八日。大便結硬。此外傳陽明溼熱。變燥而為脾約等症。若不外傳。而發暴煩下利。雖每日十餘行。溼熱去盡。必自止而愈。以脾熱穢腐當去者也。同一太陰熱邪。以溼熱。繫住太陰下利。則入太陰篇。以外傳陽明溼熱。變燥大便乾結。則入陽明篇。此千古未白。

少陰病。二日至四五日。腹痛。小便不利。下利不止。便膿血者。桃花湯主之。

此言少陰火虛滑脫。便膿血。宜用桃花湯。舊註陽邪傳入誤也。

少陰病。便膿血者。可刺。

此言少陰熱病。便膿血。不可用桃花湯。但可刺泄血中之熱。

少陰病。下利六七日。咳而嘔渴。心煩不得眠者。猪苓湯主之。

少陰病。自利清水。色純清。心下必痛。口乾燥者。急下之。宜大承氣湯。

上二條。皆少陰熱症。詳註渴門。

傷寒先厥後發熱下利必自止。咳反汗出咽中痛者其喉為痺。

先厥後發熱則真陽回而利止。若反汗出咽中痛則回陽太過上冲其喉必痺。

發熱無汗而利必自止。若不止必使膿血。便膿血者其喉不痺。

陽經發熱無汗利必不止。陰經發熱無汗利必自止。若不止而無汗則回陽太過下移大腸而必便膿血熱邪下泄故喉不痺。

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表。溫裏宜四逆湯。攻表宜桂枝湯。此言裏寒之人外冒表邪之症。下利腹脹滿是裏寒身體疼痛者是表邪。下利腹脹之身痛必以四逆湯先救裏後以桂枝湯再發表。

下利清穀不可攻表。汗出必脹滿。

此重申下利清穀必先救裏。若先發其汗出必脹滿不治。

下利有微熱而渴脈弱者令自愈。下利脈數而渴者令自愈。設不瘥必清膿血。以有熱故也。下利脈數有微熱汗出令自愈。設復緊為未解。

前條言下利清穀外冒表寒之利。此條言微熱而渴。又見脈弱。則邪衰正復。故令自愈。第二段言脈數而渴。較之上段。則裏有熱。故設不瘥。必下膿血。第三段言脈數微熱。是表熱內陷。故自汗出。令自愈。設復緊。則表邪伏而未散。下利寸脈反浮數。尺中自澀者。必圖膿血。

寸脈主氣。尺脈主血。今寸脈浮數。氣中有熱。尺中自澀。血分受傷。熱勝於血。故必圖膿血。

下利脈沈弦者。下重也。脈大者為未止。脈微弱數者。為欲自止。雖發熱不死。下利脈沉弦。則邪滿於裏。故下重。若脈太過而大。為未愈。必得微弱而數。乃為自止。即或脈數發熱。乃沉弦轉陽。亦不主死。

熱利下重者。白頭翁湯主之。

此言熱利。以明上條皆寒利。下條皆熱利也。熱利下重。火熱下迫。故用清火。下利欲飲水者。以有熱故也。白頭翁湯主之。

此申明宜用白頭翁湯方法。言陰症下利。口不渴。今欲飲水者。以上焦有熱。

故也。亦以前方清熱。

下利譫語。以有燥屎也。宜小承氣湯。

上條以渴欲飲水。定熱在上焦。此以下利譫語。定腸胃有燥屎。

下利後更煩。按之心下濡者。為虛煩也。宜梔子豉湯。

上條以譫語。故定腸胃實熱。此條以利後心下濡而不堅。故定虛煩也。

羌活敗毒散。見發熱。五苓散。見小便不利。乾薑湯。見似瘧。

猪苓木通湯。

猪苓 白茯苓 澤瀉 木通

太陽熱結下焦。用五苓散。若陽明熱結。家祕用此方。

柴苓湯。

柴胡 黃芩 廣皮 半夏 甘草 茯苓 猪苓

少陽溼熱。每多協熱下利。故用此方。家祕加乾薑。兼治陽明大腸。加木通佐其

分利湯。

桂枝防風湯

桂枝 防風 桔梗 厚樸 蒼朮 甘草

此治風寒溼熱三氣下利。故用桂枝防風去太陽風寒。用蒼朮去陽明風溼。若風熱溼熱。當以羌活易桂枝。蒼朮四苓散。即四苓散加蒼朮防風。

此方表有風溼。裏有溼熱。故以蒼朮散在表之風溼。以四苓利在裏之溼熱。家祕加木通湯調服。功力更大。

蒼朮乾葛湯

蒼朮 防風 乾葛 白芷 厚朴 甘草

風溼內傳。每多下利。河間云風邪內縮。以此方治之。

猪苓湯

猪苓 澤瀉 茯苓 滑石 阿膠

溼熱下利。先散表邪。隨利小便。熱結太陽。用五苓散。熱結陽明。用此方。

蒼朮柴胡湯

蒼朮 柴胡 黃芩 半夏 廣皮 甘草 防風

此方治風溼傷於少陽下利者。若見太陽表症加羌活。見陽明表症加乾葛。羌防柴苓湯。

羌活 防風 柴胡 茯苓 黃芩 半夏 廣皮 甘草

外感下利皆從毛竅而入。必當仍從毛竅而出。故用此方。

黃芩芍藥湯

黃芩 白芍藥 川黃連 甘草

燥火利。以大黃歸芍同用。則清血分之火。與枳殼同用。則清氣分之火。今溼火傷血。故以黃連芍藥同用。加棗肉。又名芍藥黃連湯。兼治內傷血利。

香連丸

木香 川連 等分棗肉為丸

溼火傷血。用當歸黃連清血中之火。今溼火傷氣。故以木香黃連同用。家秘加棗肉為丸。則不損中州。

三乙承氣湯 見大便秘 保和丸 見發狂 平胃散 見譫語 理中湯

見嘔吐 四逆湯 見身痛 大順飲 見腹痛

溫中湯

草豆蔻 乾姜 厚朴 甘草

此方與大順飲同治傷冷飲者。若液乾有熱反為害。

大柴胡湯 見潮熱

白通湯

葱白頭 乾姜 熟附子

此即四逆湯。去甘草加葱白。以通陽氣。少陰下利。脈微厥冷。方可用。

白通加豬膽汁湯 即白通湯。加人尿豬膽汁。溫服。

真武湯

白茯苓 生姜 熟附子 白朮 白芍藥

土虛不能制水。以此方補土中之火。