

易科正宗

卷
長
伍
陸

張道坤

置用



發背論第二十三

靈胎評 楊平本訂
將元明寶功校

發背有五。一曰陽毒。先因風熱。或患熱毒消渴。或先患傷寒。除毒蓄積於背脊骨之間。不拘椎數。但從兩夾脊起。背脊微熱。赤色如鐵。膿毒難成。成後痛不除。數日之間。忽然平塌。時者悔謂腫消。殊不知此是內攻肉陷。不可復舉。二曰陰毒。乃氣冷而作。初如黍米隱隱而痛。真應前心。頭目昏重。寒熱如瘧。五七日後。始覺攻腫。膿毒深沈。遲緩不速。急宜以補氣湯藥。起。起則驚人。尤甚於陰陽二毒。但根柢分明。須以解毒金石毒湯散治其內。方保無虞。四曰酒食毒。乃平時或飢或困。飽食即睡。或多食酒。食。冷熱黏滑肥鮮油膩之類。積於臟腑。熱之不煩。懣懣然。意當風脾。臟氣虛。不能承受。乃毒發於背。此所謂背梁之不問椎數。初起頭。如小彈子。後如大拳。其堅如石。痛連四肢。加之拘急。口苦舌乾。腹急便澀。十數日後。頭面手足浮腫。膿腐消泄。急痛如刺。是其候也。初痛時。急用收腫散。清膿湯藥。內實臟腑。外泄膿水。治之遲緩。潰腐愈其。傷骨爛肌。復感外邪。而致內攻。死矣。五曰山嵐瘴氣。毒。其入素瘴。瘴。鄉。觸冒嵐瘴。蓄諸臟腑。久而不發。至氣血衰弱。筋脈斷。傷損之時。而後發。初起腫色青黑。形如蛇皮。附筋微骨。頑如木石。引手加深。方覺。痛處至五七日。毒氣浮淺。腫高。色變青白。有如拳打之狀。寒戰似瘧。頭痛口歪。又若有風手足破逆。眼黑睛少白多。此因內有邪氣相搏。急。宜破消血三五升。方有黃白膿出。然其皮猶腫痛不止。直至有白之色退盡。方愈。此宜急急趕膿毒出外。方為無害。否則木有不瀕於危。者也。楊按發背乃大症。而原本無總論。但有治驗各條。則於卷二腫瘍治法之後。而統名之腫疽治驗。殊為闕義。夫今取徐氏楊科選。粹中發背論。補於治驗之前。并載徐氏而後在腦疽之後。庶幾以類相從。其方藥原本。不別出。散見於腫潰腐諸方。及腦疽門。並非專治背。疽之方。故仍其舊。

發背治驗

一男子年五十餘。背心生疽。十三日矣。湯水不入。煩悶不語。背堅硬如負石。皮色亦紫。瘡勢雖重。喜其根脚交會分明。毒高結局於此。未經入。內。須行拔法。使毒氣外發。不致內攻。隨煮藥筒提拔二次。去惡血。梳許。雖血脈實便秘。用內疎黃連湯及豬膽湯。法。雖曰大便通利。二。次。使內外毒氣皆得通泄。夜卧即安。背重失其大半。次用托裏排膿之藥。外以桑木灸法。腫便漸腐。膿毒漸出。換服十全大補湯。加麥冬。五。味。數服。腐肉自脫。飲食漸進。瘡口漸合。調理兩月餘而愈。

一老婦年近七旬。背瘡已過半月。形勢可畏。其家已置不治。整備後事。適余往有重雅瘡症。見而問之。咸言待斃且久。余強請觀。手背背脊。瘡。勢不高。亦不內陷。以手按之。外實而肉腐。老年內虛。瘡毒中隔。不得外發。故也。雖飲食不進。且喜根脚兩無混雜。臟腑各無敗色。治之可生。其家堅執不信。且言斃命。命下。俱斷必死。余嘆曰。再三四日不治。內膿穿潰。此命死於無辜矣。次日余自往謂曰。余非相強。實見其可生。不。

上海大成書局印行

魚目淋瘡不常比肺經堂盛也用針刺入四五分此日變強其硬如骨有膿隨用剪剪條摘至三日猶不腐化

一監生中年縱欲自服補腎助陽之藥以致腎水受傷以上四字格不能上制心火左癰生一泡光紫後黑麻木不知痛癢黑腐時時潰益不

依期脫落乃用生肌散口補助調理脾胃之藥二十日而愈後因不慎保養幾及三年復成瘡而舛在自然數九一婦年近四旬與夫不相得懷抱鬱鬱季夏腹發一疔六日後方延余治毒已走散頭目唇項俱腫形色紫赤余曰肉腫瘡不腫毒已走黃不

令其吸出惡血數碗血以空營氣又曰果有可生之理何必如此溫湯洗淨用蟾酥錠磨濃塗之四圍敷金黃散早晚二次內以護心散

生其後二子一女俱婚嫁夫先故婦今六十五歲矣。
一婦二十二歲右耳垂向前一寸生疔二日請余視之約有豆大頂陷色灰此肺經白及疔也又根腳綿軟毒不結膿為釣火毒近未及針刺。

一少婦顧下生疔。疔瘡作瘰。欲針之。此四字徐勣其家不信。自用灸法。次日四邊漸腫。瘡漸陷。此二句徐勣又云。灸之瘡如此。又三日。頭面大腫。復請余視。灸處。結黑囊。乾魚無膿。比瘰氣乃陷。外肉不脫。死。又面目浮腫。亮亮發風。形狀更甚。比王氣衰。而邪氣實。此言公不救。其家悔之無及。後半

月而元

蠶酥丸 蠶酥丸用有奇效
蠶絲 蠶絲寒水石
乳沒 乳沒砂
牛膝 牛膝共
蠶酥 蠶酥同
治疔瘡發背腦疽乳癰附骨臂腿等疽一切惡在多瘡不痛或麻木或嘔吐病重者必多昏

天衣粉 宛山甲 白麝 麝香 赤苓 半夏 甘草 草河車 錢水 酒各一茶鍾 煎一半量 病上下食前後服之 徐曰此亦通

水金龜散... 治疔瘡針刺之後餘毒未盡作腫宜此藥... 白散 白芷

大黃略四... 治疔瘡... 元參 桔梗 知母 大青葉 升

解春大有湯... 治疔瘡... 人真徐俱此不入藥... 功致甚著王君士雄謂不入藥者不入藥也

酒斤簡便方... 治疔瘡... 白礬末 葱白 右二味同搗極爛分作

七塊每塊用熱酒一盃送下... 治疔瘡... 白礬末 葱白 右二味同搗極爛分作

太乙紫金丹... 治疔瘡... 白礬末 葱白 右二味同搗極爛分作

家出入... 治疔瘡... 白礬末 葱白 右二味同搗極爛分作

以上之藥... 治疔瘡... 白礬末 葱白 右二味同搗極爛分作

衣帽臨日方入室中... 治疔瘡... 白礬末 葱白 右二味同搗極爛分作

白中漸加糯米... 治疔瘡... 白礬末 葱白 右二味同搗極爛分作

之修合時除合藥潔淨之人... 治疔瘡... 白礬末 葱白 右二味同搗極爛分作

之肉人誤食之必昏亂... 治疔瘡... 白礬末 葱白 右二味同搗極爛分作

服牙痛酒... 治疔瘡... 白礬末 葱白 右二味同搗極爛分作

併服年深月近頭脹頭寒太陽痛極偏頭風及時瘡愈後毒氣攻注腦門作脹者俱用葱酒研服一錢仍磨冷太陽穴上婦女經水不調紅
花湯下凡遇天行疫症延街及巷相傳傳染者用桃根湯磨濃搭入鼻孔次服少許任入病家再不得遲又治傳尸勞瘵諸藥不能禁者一
方士指教服此每早磨服一錢至三次後逐下惡物尸虫異形怪類後得脫然以此相傳活人不計其數一女子久患勞瘵為尸虫所噬磨
服一錢片時吐下小虫十餘條後服蘇合膏丸其病頓失調理月餘而愈真濟世衛生之寶藥也 徐曰此諸毒邪氣內外要方無病不治

又曰此秘藥中之第一方也用藥之奇不可思議

人參清神湯 人參 黃耆 當歸 白朮 冬冬 陳皮 茯苓 地骨皮 遠志 甘草 柴胡 黃連 芍藥 水二茶鍾糯米一撮

扶元氣 人參 黃耆 當歸 白朮 冬冬 陳皮 茯苓 地骨皮 遠志 甘草 柴胡 黃連 芍藥 水二茶鍾糯米一撮

前八分食逐服 徐曰此愈後調養方毒未盡者不可服 治行瘡潰膿後餘毒未盡五心煩躁精神恍惚不安言語睡臥不清服之降火清心保

內托安神散 人參 茯苓 神曲 黃耆 當歸 白朮 冬冬 陳皮 茯苓 地骨皮 遠志 甘草 柴胡 黃連 芍藥 水二茶鍾糯米一撮

亦宜服 人參 茯苓 神曲 黃耆 當歸 白朮 冬冬 陳皮 茯苓 地骨皮 遠志 甘草 柴胡 黃連 芍藥 水二茶鍾糯米一撮

分臨服入硃砂末三分和勻食逐服 徐曰與前方相同可刪 酸棗仁 遠志 甘草 石菖蒲 五味子 水二茶鍾煎八

斤倉應用方 蟾酥條 徐曰與前方相同可刪 酸棗仁 遠志 甘草 石菖蒲 五味子 水二茶鍾煎八

加減八味丸 人參 茯苓 神曲 黃耆 當歸 白朮 冬冬 陳皮 茯苓 地骨皮 遠志 甘草 柴胡 黃連 芍藥 水二茶鍾糯米一撮

脫疽論第二十五 夫脫疽者外腐而內壞也此因平昔厚味膏粱重積臟腑丹石補藥消燁腎水房勞過度氣竭精傷兼用房術之藥或啖舌下化水直至丹田

或納臍中使熱徑投內腎為九掌按作香鼻噴或抹陰股或擦陽器圖使堅硬希求常濟多致陽精竭感火猖狂狂狂下愚其蠱毒於臟

腑者終成躁熱大症其毒積於骨髓者終為疽毒陰處巧人行拙誰防禍起蕭牆智者多愚自謂喜從天降直至骨枯髓涸臟腑敗亡方悔

解脫無方惟強有故凡患此者多生於手足手足乃五臟枝幹倉之初生形如粟米頭使一點黃泡其皮如煮熱紅棗果氣侵淫傳佈五指

上至腳前其厚如湯潑火執其形則骨枯筋縮其穢異者難解其命仙方難治故謂血元心敗筋元肝敗肉元脾敗皮元肺敗骨元腎敗此

五敗者雖有靈丹喪命而已生此症者死生附於肚外孫真人曰在肉則割在指則切即此病也治之於早乘其未及延緩時用頭髮千餘

根纏患指本節處盡遠扎十餘軌漸漸緊之毋使毒氣攻延良肉隨用蟾酥餅放原起粟米頭上加艾多至肉枯倉元為度徐曰此後利

法眼次日本指盡棄方用利刀尋至本節縫中將患指徐順取下血流不住用如聖金刀散止之餘腫以妙貼散敷之次日倘有果氣未盡

單用蟾酥餅研末搽之膏藥氣自退患上生膿照常法用玉紅膏等藥生肉掛骨完口此為吉兆內服滋腎水養氣血健脾胃安神之劑若

內外無變症十中可保其三四矣若割取之後黑色仍痛腫尤甚敗惡無膿口乾舌硬精神不爽食不知味者終死治此不可一已專

任必與高明醫議聽患者愚則與否因此症首尾吉凶難定故不可輕易醫治又有似是而非者詳註在後宜參觀之 徐曰此症在十死

八九即治之得法亦難輕許其法此論却是一篇勸戒文不獨生肌脫疽者然也

脫疽看法

起瘡不渴口潤舌和性志尋常無憂暴急循禮而吉初出形如麻子發熱作痛一指自腫根脚收束者吉已成頭便作腐肉不紫黑皮痛有時膿出膿消者吉已潰先膿後腐肉色紅活毒不走散氣不腫橫者吉未瘡先潰善冷無度昏睡舌乾小便頻數陽痿者逆初起形如粟米肉便紫色不腫刺及黑氣逆散者逆已成瘡形枯腐肉黑皮焦痛如刀刺毒傳好指者逆已潰肉枯腐爛血水臭汗痰苦應心零了微骨者逆

脫疽治法

脫疽多生足指少生手指初起水窠黃泡者即灸之初生如果裏可容穀皮色紫赤不作掀腫雙孔仍多已灸之後瘡受大氣發泡作膿外藥極之內兼用托毒藥已成瘡形稍陷但紫色不沒脚面者詳讀割取既割之後血水淋漓疼痛不減和氣血補脾胃已成飲食減少身體倦怠便數口乾涎津液壯腎水破後血氣受傷脾胃虛弱自汗盜汗惡心乾嘔睡卧不安日哺發熱疼痛苦楚煩悶諸症俱宜大補氣血當貴及膏藥養色慈愛於房術總忌日久禁行割法徐曰看法與諸症局治法前已說明重出不必

脫疽治法

一男子年近五旬右足小指初生如粟米形漸成白泡三日始痛請治頭已腐爛一指紫腫此脫疽也用艾火明灸十三壯始大痛乃止用針刺灸頂貼蟾酥餅骨其餘紫腫用拔針擊刺七八處發泄毒血用蟾酥釵磨濃塗之腫外以真君妙貼散敷之良肉使不外侵時病者脈數身發寒熱惡心體倦先用人參散毒散軟餅解其表症次用黃連內疎湯通其大便而惡心煩熱亦止又用托裏消毒散加金銀花牛膝數服早用八味丸晚用蠟丸九相兼服之隨又針刺徐曰針刺不必泄其毒氣解毒為膿腫方少消後用十全大補湯加山更五味此症徐曰冬等藥調理月餘而愈此疽若不針灸發泄毒氣專假藥力敷圍再加峻藥攻利必傷元氣豈能保生徐曰此症並非脫疽乃濕毒也移解毒清大藥即愈因候治遂成大症

一客商石足次指生一紫泡痛痒異常次日指甲俱紫欲其全曰此乃肝腎二經之毒甲乃肝之餘氣甲紫則肝受毒也骨乃腎之餘腎傷則

骨黑被問何以致此余曰人凡勞傷精力傷於肝誤服熱藥傷於腎此則皆謂旁人曰情實有此彼久客押妓常服興陽等丸恣情作樂已

二年矣余欲解不治彼哀告求主冀得速癒余令先取效者頂髮十餘根根線攪扎患指盡處隨將艾炷在紫色處排勻三炷每炷七壯各

貼蟾酥餅骨蓋過夜一指自黑量其筋骨皮肉俱用利刀順即脫患指徐曰此乃水冷惡物損煎甘皂湯浸洗良久俟皮血稍盡以上

血散移之次日炙處紫色不褪起其上也又以神燈法照之候血散皮肉纔合蟾酥丸料多加海羊所爛服之早晚二次腫不復作紫色變紅

紅色潰膿外用生肌止痛止血收斂之藥又熱參末地黃膏敷服接補真元年服健脾藥以固胃氣晚用金液丹以解藥毒如此調理三月

而愈或問用髮何也余曰以披心愛之髮貼肉雖痛而不忍謝以神其效又如在前此妙用也

一婦中年肥胖患渴三載右手食指麻痺月餘即開生一泡隨後手指漸腫脹不堪原泡處生黑斑半指已變紫黑此元陽之極乃成脫疽

一男僕冬月履寒。主使亦足履地。不敢移。血凍麻木。次日十指俱紫。又數日全變黑色。麻木不痛。請余觀之。強用辛熱散寒活血重流等藥。不應。又延黑脚面骨節一段甚疼。余曰。後必十指皆脫。甚至致為脫疽。余曰。似是非而非。尚可無妨。今當用草木火灸之。取其溫煖活血。又能解散熱毒。處漸腐漸脫。自不致散。內服健皮養血之藥。外用紅黑二膏生肌。百日外愈。徐曰。此凍極血凝之症。一待女十二歲。貌頗美。主僕御大用布任意纏暖。以線密縫。脹痛不堪。訴主不聽。半月後流出臭水。方解視之。俱足前半段。盡白黑腐。骨肉已

凡余曰：已壞者不可復救，已救未壞者可也。先煮粳粥食之。次煎葱湯，令主家僮婦將兩足浸入湯內，淋洗再換湯。但腐肉不痛者，逐一剪割，連綿如痛者，以花蕊石散搽之，俟將壞者復生，已壞者得脫，內服補中益氣湯，外搽生肌玉紅膏。此與男僕前案類，復得愈。終成廢疾，一生矣。

一男子右足小指縫中結生一點黃粟治皮肉隨變紫色陰瘡不堪有如刀刺視其形色真腹近也診其脈又細數無力此腎經敗症詢知生平大飲內有妻妾三人精力已竭縱治無功遂起辭之後延至腳面足底皆穿皮膚不徹飲食日少氣血日衰形體日削一月後百苦而終徐曰此陰毒之症多不治

疔疽主治方

解毒清生湯解毒清生汁半片
知柏二花無速忌
犀角升麻牛膝同
治脫疽初起惡寒體倦發熱作渴或腫或紫或麻或痛四肢萎急山嵐瘴氣不安者

川芎 當歸 黃柏 知母 天花粉 金銀花 麥冬 遠志 柴胡 黃苓 犀角 茯神 錢 甘草 紅花 升麻 煅石膏 牛膝

陰陽二氣丹 治脫疽久服丹石補藥致虧腎水多成口燥咽乾至飲水雪不如其冷此除陽燄堅直

服此解之
天冬龍麥冬五味子研黃柏人中黃剉脫解者元參湯洗去粗皮青黛煅者甘草枯礞石辰砂為澤瀉
瀉錢三冰片錢各為細末同元參冬膏子加煉蜜少許再搗千餘下軟硬得中丸如桐子大每服六十九童便乳汁各一鍾空心送下其效如神徐曰此方與法不可學

清神散 清神散取四升水煎 治脫肛 治脫肛者...

菜豆粉 菜豆粉... 治脫肛 治脫肛者...

唯雄鷹 唯雄鷹... 治脫肛 治脫肛者...

右四味 右四味... 治脫肛 治脫肛者...

角為妙 角為妙... 治脫肛 治脫肛者...

金液戊土 金液戊土... 治脫肛 治脫肛者...

膽久則胃 膽久則胃... 治脫肛 治脫肛者...

宜預服此 宜預服此... 治脫肛 治脫肛者...

砂雄黃 砂雄黃... 治脫肛 治脫肛者...

分吉辰在 分吉辰在... 治脫肛 治脫肛者...

童便共一 童便共一... 治脫肛 治脫肛者...

諸失心者 諸失心者... 治脫肛 治脫肛者...

等前已有 等前已有... 治脫肛 治脫肛者...

歌有麝香 歌有麝香... 治脫肛 治脫肛者...

脫肛應用方 脫肛應用方... 治脫肛 治脫肛者...

王紅膏 王紅膏... 治脫肛 治脫肛者...

如聖金刀 如聖金刀... 治脫肛 治脫肛者...

外科正宗卷五 外科正宗卷五... 治脫肛 治脫肛者...

大瘰癧者 大瘰癧者... 治脫肛 治脫肛者...

其氣者正氣散之類是也。瘰癧者，散其陰，和其血，散腫潰瘍之類是也。肋癰者，清其肝，解其鬱，柴胡清肝湯之類是也。瘰癧者，行其氣，令連二陳湯之類是也。又有瘰癧，婦人傳，天度焉，志不得發，思不得遂，積想在心，過傷筋力，此勞中所得者，往往有之。最為難治，宜先養血氣，氣開鬱結，益腎安神，疏肝快膈，如歸脾湯，益氣養榮湯，俱加香附，青皮，山梔，貝母，木香之類是也。又男人不宜太陽膏，熱熱咳嗽，目汗盜汗，女人又忌眼內紅絲，經閉骨蒸，五心煩熱，男婦有此，後必變為癰癤，難治之症。體實者，初起可服散腫潰瘍攻利之藥，得效者，十中三四，有不察虛實，盡劑追伐，損傷元氣，致成壞病者，十有八九。此非患者之命，自由誤於醫人之手。予常治初起成核，服前藥未效者，用針刺核內，深入三四分，用水蛭散，攪成條，插入核內，糊紙封上，待至二七後，核子自然落出，隨用紅黑二膏，搽貼內服補劑，不久便愈。常見有用斑蝥，牽牛，巴霜，大黃等藥，追蝕致危，亡切宜戒之。徐曰：此篇論甚詳備。又曰：實在結度，乃可用冰蛭散。此方本此治症之藥也。瘰癧瘰癧在結度，用冰蛭散，不若用余所製消核膏為要。仍須內服子龍丸，即經延丹方見後。

瘰癧着法

初起核高腫痛，色紅軟法，微作寒熱，有項不強者，順已成根，不堅硬，內無小核，叢生脾健，氣血不長者，順已潰膿，稠肉色紅活，核腫漸消，肩項目便漸軟者，順消後易消，易飲氣體平和，胸膈寬利，飲食知味者，順未成形，體消瘦，寒熱往來，結核頑梗，度嗽相兼者，險已成核，堅連，如珠大小不等，項強筋急，脈虛者，險已潰膿，水清，稀肌肉消，鑠自汗盜汗，寒熱不睡者，逆潰後陰虛煩躁，作渴，大便泄，小便秘，男子骨蒸，女人經閉，具述。徐曰：有法與別症同。

瘰癧着法

初起腫痛，憎寒壯熱，四肢拘急，項強頭眩者，表散之，腫硬發熱，便利口乾，胸膈不利，惡心脈實者，宜利之，高梁厚味，醇酒積氣，凝痰凝結而成者，宜化痰降火，清中，憂思過度，鬱於肝，筋縮結核者，宜開鬱養血，疎肝，房慾勞傷，陰虛虛熱，自汗咳嗽，形體消瘦者，滋腎健脾，失利亡名，懷抱鬱結，積想在心，所如不得，乘陰陽虛，感月而得者，精血俱傷，先養正氣，次治標病，堅而不潰，腐而潰之，潰而不腐，補而飲之，皆治法也。

瘰癧着法

一男人項核腫痛，拘急惡寒，用荆防敗毒散二劑，表在惡退，餘核不消，用散腫潰瘍湯，加川芎，香附，貝母，十餘服，其核漸消，外以虎骨膏貼之，月餘而安。

一男子仲冬渡江，暴冒霧氣，又值驚恐，次日寒熱交作，頭面耳項俱腫，先用藿香正氣散二服，寒熱即止，面腫漸消，惟項間堅腫不退，紅軟作痛，此毒聚必欲作膿，仍用正氣散，加芍藥，歸尾，刺數服，使膿熟針之，腫痛頓退，又用十全大補湯，健脾生完口。徐曰：此風寒之毒，只因內消，亦不必用十全大補湯。

一婦孺居六載子幼，未立，憂鬱成核，已半年，無經水不調，寒熱交作，形體消瘦，脈亦弦數，此勞傷氣血，肝火妄動，而成所謂損者益之，不可用追蝕之藥，損而復損，先用通達散，加香附，牡丹皮，貝母，和其血脈，疎其肝氣，寒熱盡退，次用益氣養榮湯，服至月餘，氣血漸復，經水不調元。

氣漸醒外用大針徐曰不必核上無破四孔用黃線藥插入五六次以針候氣孔大換用水洗針數次上針至二十日外其根自落外
擇玉紅膏生肌收斂內服人參養榮湯加香附木香三十餘劑其口自完此婦慎起居忌上情戒口味盡調理後可得愈右則必不能矣
一室女年十七因父擇婿未遂既至二旬懷抱鬱久項生數核堅硬如石此肝經凝結筋絡之病也其經水斷絕寒熱如瘧咳嗽數推不順
紅此陰虛火動已成勞瘵症也非藥能愈視其形狀喜無血色全曰欲治此病當先治其心父問曰何藥治心全曰非藥也易曰天地絪縕
萬物化醇男女媾精萬物化生此天地男女生成化育之道也斯病起於於陰虛陽不生不化所謂逆理之病由於女丈夫配是謂當至而
不至漸成失度之候細詢其病不至而自生故藥不能挽回必得陰陽和而雨澤降此謂夫婦和而家道成斯時方可用藥其父始悟遂即
擇婦三月後復請余視前症稍定先用逍遙散加香附青皮山梔丹皮貝母十餘劑開鬱疏肝寒氣漸止次以人參養榮湯加丹皮紅花通
其血脈使心血易生容顏稍澤又有益氣養榮湯倍參熟地助脾胃增進飲食開用歸脾湯加麥冬五味遠志沙參及飲神氣寬慰性
情又製參朮地黃膏服至半年精神頓復經事亦通惟核不能全退用大針點破一核以針點破琥珀膏貼之漸腐而膿又兩月而得收斂
尚有二核亦漸針消漸斂首尾純用補脾開鬱藥調理一年始得全愈

一男子年近三十項生數核面白神疲皮粗脈數此元氣受傷之症先當補養血氣待根本壯寔再治其瘡隨用養榮健脾藥十餘劑未幾彼
以為緩徐曰此等又為方士所惑豈圖內消目服斑蝥巴麝之藥耶連瀉十數行後至小便淋瀝不已更增虛熱飲食減少又復請視
形色已敗辭而不治又請內科強投扶助降火之藥終不應而死

一婦壯年性急夫過湯不回家左項生核半載漸至雞卵大堅硬如石皮外紅絲纏繞左右脈俱弦數弦屬肝太妄動數乃脾熱之甚條曰此本
以緩手愈而根不除所以復發先用施子清肝湯平伐肝木五服而脈始平又用育肝解鬱湯數服散其鬱結次用益氣養榮湯調其氣血
即除得法而高難治此誤治耳
聞服散腫消脹軟其腫外以琥珀膏貼之調理百日元氣乃復堅硬已消八九只存小核彼以為愈止不服藥後一載因夫賭訟未勝
暴急驚恐前腫復作兩手脈細而多數此陰血虧損陽火來之非前有餘症也又兼胸膈不利飲食無味經水先期過多形容憔悴不澤此
神傷於思慮則肉脫意傷於憂怒則皮癢癢傷於悲哀則筋傷筋傷於喜樂則皮癢癢傷於喜樂則筋傷筋傷於悲哀則筋傷筋傷於喜樂則皮癢癢傷於悲哀則筋傷
法當滋養氣血調和脾胃益腎清心開鬱散滯庶保無虞彼不自信仍欲服散腫潰堅之藥方又腫處以圖內消余詳不治彼請客醫仍服
前藥其腫處并又腫矣真氣虛而益虛邪氣實而益實反加發熱目干咳嗽項強四肢不收失食不眠血水不絕腫亦增盛致成臃腫已損
之候又傳為氣急聲啞痰血至而出而殁余嘗見病家庸醫不辨虛實妄行用藥多致不救所當猛省棺槨中聞引成語為文其寔此症無
喜樂

瘰癧主治方

防風解毒湯 治風毒瘰癧 寒者不調 勞傷痿癯 致手足少陽分年項結腫 或外寒內熱 痰氣滯
者 防風 荆芥 桔梗 牛蒡子 連翹 甘草 石膏 薄荷 枳殼 川芎 蒼朮 知母 蛇 水二茶鍾燈心二十根煎八分

發於下頰或至頰車堅而不

潰或已破流膿又屬

是陽明症也。此方治有餘之症效多，不足之症效少。
黃芩 白芍 當歸 龍胆草

10

升麻散堅湯
升麻散堅湯
葛根龍胆
夏枯草粉

我遂三校陳枯連
歸翹岑共煎

治瘰癧遠近或至賴車或屬陽明核深陷隱曲肉底又屬足小陰疽作腫塊堅硬大小

不一升麻

甘草 我遂

三棱 陳皮 桔

黃連 龍胆 蔓根 川芎 白芍 夏枯草 連翹 黃芩 當歸 天

夏枯草湯夏枯草湯
香附柴胡白芷芍

紅生地員母令

治瘰癧馬刀。不問已潰未潰。或已潰日久成漏。形體消瘦。飲食不耳。寒熱如症。漸成勞瘵。

並效。夏枯草二錢。當歸三錢。

白朮 茯苓 桂

梗 陳皮 生地 柴胡 甘草 貝母 香附 白芍 鱗 白芷 紅花 路 三 先

用夏枯草水二碗煎
徐曰此亦症之主劑

至一砂濾清后罐角至八分

食後服將藥酒於前房枳殼湯中再煮之入酒出服入酒中一錢和服以酒和服

活血化堅湯
活血化堅湯
補血

乳香靈脂銀花使

治一切瘰癧及瘰癧痰核初起未潰膿者。防風 赤芍 歸尾 天花粉 金銀花

食後服。余曰。

桂梗錢一
義重前方不必存

僵廝厚朴

五靈脂 陳皮 甘草 乳香 白芷 桂枝 水二升 鍾前八分 服卽酒一小杯

消遙散
消遙散
丹皮
薄荷
甘草
芍藥
茯苓
香附
共
柴胡
婦女
之病
效可
奇

治婦人血虛。五心煩熱。肢體疼痛。頭目昏重。心中煩赤。口燥咽乾。發熱盜汗。食少嗜臥。及血

熱相搏。月水不調。臍腹作痛。寒熱如瘧。及治。

室女血弱。榮衛不調。痰嗽潮熱。肌體羸瘦。漸成骨蒸。當歸 白芍 茯苓 白朮 柴胡各

通治瘰癧方

早分蒲荷黃荇

水二茶鍾煎八分食遠服有寒乃薑三片棗二枚徐曰此通治疎肝之方

當歸 白芍 連翹 茯苓

香附醋炒夏枯草

黃谷一 霍香 半夏 白芷 甘草 五
薑三片 水二茶鍾 煎八分 入酒二小

枳實時服 徐曰諸方不出此隨症加減可也
烏歸養榮湯 烏歸養榮湯者水 參芍砂仁熟地黃

[illegible]

瘦飲食少思睡卧不寧盜汗自汗驚悸恍惚歸

人參 黃耆 白朮 川芎 白芍 熟地 歸一 五味子 麥冬 遠志 甘

單 茯苓各五 牡丹皮

仁各三
水分三
水二茶

鍾、薑三片、東一枚、煎八分、食後服。徐曰：重出。

用。青龍腦。中五枚。去細末。日

水治

厚唇日久變核入消及腫前連不致者用此點落應核如馬力根大面小及夫榮等症忌用西乾藥乃刀司畏慎此展為個末加個片再磨小體靈效已用

時先用艾炷灸核上七壯次搽

復美倉起泡以小針

挑破將膏藥一二釐筆唾調成餅貼尖頂上用棉紙以厚糊封貼核上勿動七日後四邊

製爲大日且其核自落按王紅膏內服補藥兼助完口此藥又治癰瘤患大帶下諸般高突異形難狀徐曰點去惡肉亦不可少但

不可不辨。惡毒之肉乃為金。

紫雲膏 治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

白爛將盡。其膏已成。候片時。傾入瓷瓶。用時。湯內填化。攤旋貼。徐曰。方極和平。即不提膏之相方也。又方。曰。此方重銅綠一味。方簡而意深。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。

琥珀膏 琥珀膏內。桂防。松脂。白芷。共相。治一切瘡毒。不論新久。搽之即愈。此膏乃金。