



校正驗方新編

生新



諸血○七竅出血 凡耳目鼻口一齊出血名曰上虛下竭死在須臾不及用藥先將冷水當面噴幾口或婦女急分
開頭髮以水噴之男子無髮可分用粗紙數層冷醋浸透搭在顙門其血即止或用鼻部鼻血第一方立止神效隨
用補血湯 芡黃耆一兩當歸五錢煎濃湯加沉香五分磨汁童便一盞兌服血自歸經再加調理多有全活○
口鼻出血不止吐血見勞傷吐血門用多年尿壺火上烘熱向鼻薰之立止神效屢試屢驗或照鼻部鼻血第二方
治之更為神妙 又方韭菜搗自然汁半碗飲之立見功效 又方口鼻出血如湧泉者 荊芥燒枯研末陳皮煎
溫調服二錢即愈○耳鼻流血不止 照上口鼻出血各方治之○臍上出血並治齒上出血 俱用六味湯
加骨碎補一錢飲之即愈蓋臍齒亦俱是腎經之位而出血俱是腎火之外越也○毛孔出血不止 豬瘦肉一厚
片貼之即止如神猪皮亦可 又方煮酒罈上紙扯極細碎如楊花樣攤在出血處按之即止 又方草紙燒灰候
冷敷之亦止 又方穿山甲炒研細末敷之用布紮住即止隨用補血湯見前數劑全安有人手背毛孔出血數日
不止有一人腎囊上毛孔流血數日均用此方而愈效若仙丹凡油蘘破漏小孔油出不止者用此亦極效驗
毛孔節次出血不止則皮脹如鼓頃刻口鼻眼目俱脹 此名脈溢症飲生薑汁一二盞即愈

諸汗○止諸汗法 健猪肚一個洗淨以糯米裝滿用線縫口放砂鍋內水煮極爛將肚與湯食盡糯米晒乾為末
每用小盞空心米湯調服極效○自汗 常出者為自汗鬱金研末臥時蜜調塗兩乳即止 又方何首烏末口
水調封臍中用布捆定即止 又方五倍子枯礬等分為末口水調勻填臍中用布縛定立效 又用舊蒲扇燒灰
和粉撲之或用酒調服一錢極效○盜汗 睡中出者為盜汗五倍子研末用人乳調蒸熟丸如龍眼大每用一
丸貼臍上外以核桃殼蓋之用布縛一週時取下再貼至十日後即止 又方帶露桑葉瓦上焙乾為末空心米湯
調服二錢數次全愈 身出黃汗 此濕熱也將變黃疸照黃疸門各方治之

遍身搔痒○身痒難忍 或痒如虫行抓破見血或風熱疹子成顆成片後列各方皆治○清風散 荊芥防風
當歸生地苦參蒼朮炒蟬蛻胡麻仁牛子炒研石膏煨知母各一錢甘草木通各五分水煎服痒極者宜服此藥以
消風熱即愈極重者外用摩風膏見癰毒諸方搽之極為神效體虛者前藥斷不可服只用摩風膏外敷可也 又

方白花益母草熬濃湯服並洗浴數次神效血虛者忌服只須洗浴可也 又方胡麻仁威靈仙何首烏苦參黃蒲

各三錢甘草二錢共為末每服三錢淡酒送下此武當山碑刻神方也 又方荊芥防風各一錢赤芍銀花小生地

各八分木通五分甘草三分水煎服極效此葉天士先生方也 又方蒼耳子煎水洗極效或生車前子研末水調

搽或蜜調搽俱妙 一人夜靜面上皮內痒不可忍諸藥不效用滾水盪洗略住後用好醋煮滾加硫磺和入時時

搽之而愈 又方一人田間收稻忽無遍身痒入骨髓用食鹽九錢以滾開水分作三碗泡之每飲一碗以手抵住

舌根使自嘔吐三飲三吐而愈 又一小兒身痒用生薑搗爛布包搽之而愈 風濕疹子疹乃熱也不可用人

參白朮當理血而不宜散血疹初起必發熱口渴狀如紅雲一片與斑相同但斑無頭粒而疹有頭粒如虫咬之狀

用元參三錢當歸二錢升麻五分甘草五分葛根一錢水煎服心火加黃連三分肝火加枝子六分肺火加黃芩

麥冬各一錢 又方生地牛蒡丹參各三錢荊芥防風木通各錢半石斛連翹各二錢紫草絨鬱金犀角蠟蛻一錢

西河柳葉五錢又名觀音柳水煎服此葉天士先生方也屢試神效西河柳能達皮膚非此不效體虛者少服 〇

風熱疹子作痒心下迷悶 巴豆五十粒去皮煮濃汁以布蘸抹即愈 〇風熱疹子作痒成瘡 蠶沙一升水五

斗煮取一斗二升去渣洗浴避風 〇遍身痒痒抓破見血 名血風瘡老南瓜北人呼為倭瓜去皮煮爛布包擠

去水厚厚敷之三日收功 又方內服消風散見前外用黃連膏見鼻部鼻內生癰閉或摩風膏見癰毒諸方敷之

極為神效 又方楓子肉蛇床子各五錢枯礬點銅錫各一錢共為末加水銀二錢和生豬油槌融搽之並治坐板

瘡及癬瘡虫瘡其效甚速 〇癩子痒痛 滑石五錢萊菔四兩研成粉微炒和以棉撲之 〇癩子作痒抓之又

痛難於坐卧 苦參四兩大菖蒲二兩河水五畝同煎數沸淬水二畝蓋片時臨洗和入雄豬膽汁四五枚洗之避

風甚效或照各前方治之

邪怪 〇男婦病邪與邪物交獨言獨笑悲哭恍惚 明雄黃研細蒼朮研細各一兩松香二兩先將松香鎔化以虎

爪和各藥末為丸如彈子大夜燒火籠中令病人坐其上以被蒙住露頭在外扶住薰之連薰三夜邪物自去愈後

必然世瀉多服平胃散見內外備用諸方自愈內有蒼朮最能辟邪此仙方也終身忌食螃蟹 〇灸鬼法 治一

切邪祟癲狂胡言亂語踰牆上屋尋死等症以病人兩手大拇指用線齊頭相攏用艾絨於兩指縫中離指甲角一

分半之處名鬼哭穴半在甲上半在肉上四處盡燒一處不燒其疾不愈神效不可量也 又方綠綿一尺燒灰兌酒服或開水送下均效 ○制邪鬼法 端午日午時用猪血和明雄晒乾收之或燒烟薰或帶身旁即能制鬼 又方端午日以雄黃搽狗口鼻用樟木燒烟薰之此狗即能制鬼 ○鬼箭傷 鬼打傷死見卷十二急救門 身痛有青色用亂髮捻少髮揉成團而硬者即是用金銀花一兩煎水飲之即愈 又方山柘炒灰麴炒桃枝尖七個共搗融作餅貼之次日將餅取下分作七九放炭火中燒之燒時聲響即愈不愈再燒以愈為止 又方有人為鬼氣所中腿生瘡百藥不愈後用乾狗糞枯而白者燒烟向瘡口薰之拔出清水數碗亂髮十餘團而愈又有人折足腫痛不能履地屢治不效亦用狗糞薰之初次不效二三次拔出肉針三個而愈

奇病

○頭頂生瘡五色形如櫻桃破則自頂分裂連皮剝脫至足 此症名肉人常服牛乳自愈或照頭部葡萄瘡

治之亦效眉毛搖動晝夜不眠呼喚不應飲食如常 大蒜二兩搗汁兌酒飲自愈 ○頭面發熱身有光色 大

蒜汁五錢酒調服吐物如蛇即愈 ○面腫如斗眼中見人只三寸長 此瘕症也用灰帶炒紅飯豈各一錢水煎

服一二劑使痰吐盡腫消而愈再用黨參焦木茯苓半夏各三錢甘草一錢陳皮五分水煎服 ○見一物如有兩

物此好食鮮魚所致食醋薑加紫蘇水數日自愈 ○見一物如兩物或三四物又見桌椅等物平正者視之反歪

斜歪斜者視之反平正 或用補樂瀉藥寒藥熱藥皆不效又服滾痰丸更不效者此胸膈有伏痰也用常山五錢

酒煮黨參蘆三錢甘草一錢生薑五片水二碗煎八分食遠服吐痰而愈 ○醉後嘔吐視物顛倒 治法見卷十二烟

酒醉傷門 ○眼見諸般飛禽走獸以手撲捉則無 此肝膽邪火也用棗仁羌活青箱子花即石決明花元明粉

各一兩共為末每服二兩水一碗煎七分和渣飲之一日三服即愈 ○愛食猪肉或生油生菜 均見瘕癰門

○口鼻流出臭水以碗盛之內有魚蝦走動捉之即化為水 此肉壞也多食雜自愈 ○口鼻中氣常出不散凝

如黑蓋過十日後漸漸至肩胸與肉相連堅如鐵石 澤瀉煎湯日飲三盞連服五日即安 ○身發寒熱四肢堅

硬如石敲之作鐘磬聲 吳茱萸二錢先用熱水泡過煎水木香一錢研末兌服自愈 ○週身皮肉內滾滾如波浪

聲痒不能忍抓之出血此名氣奔症用虎杖又名苦杖大虫杖酸杖其根似紅蓼其葉圓如杏其枝黃似柳其花似

菊其色似桃花其樹高數丈或丈餘不等黨臺青莖各二錢細辛七分水煎緩緩服 ○面如虫行不時燒熱 此症

恐是痲瘋查卷十一痲瘋症辨明治之○身如虫行痒不可忍 此風熱也照前遍身搔痒方治之○身如蛇

虫行走作咬或腹中蛇虫鳴動 此症恐是蠱毒查卷十五蠱毒方治之○皮膚中如有蟹行走有聲如小兒啼

哭 此筋肉之化也用雷丸雄黃各五錢共為末摻猪肉片上火中燒熟食之即愈○皮膚手足之間如蚯蚓鳴

此水濕生虫也用蚯蚓糞敷於患處一寸厚鳴止再用 蒼朮艾實各一兩白朮五錢生甘草三錢黃芩二錢附

子三分防風五分水煎服即愈此治濕則虫無以養又有生甘草以解毒殺虫防風去風而逐瘀附子斬關而搗邪

所以奏功如神也○週身發斑眼赤鼻脹氣喘主髮硬如銅鐵 此胃中熱毒結於下焦用滑石白礬各一兩水

三碗煎至一碗冷服即愈外用吳茱萸末熱醋調敷兩脚心一週時一換以愈為止此法最妙○身上忽現蛇形痛

不能忍 外用雄黃末猪油調搽內用托裏解毒湯見內外備用諸方即愈氣旺者用荆防敗毒散見同上更妙

遍身忽然肉出如錐瘡而且痛不能飲食 此名血難症不速治則潰爛膿出急用赤皮葱燒灰淋洗內服淡豈

豉湯數盞自安○遍身生瘡泡如甘棠梨破則水流其泡復生內有小石一片若指甲大 此症抽盡肌肉難治

三稜枝朮各一錢為末酒調服效○自頭麻至心窩而死或自足麻至膝蓋而死 小孩糞乾結者佳稀者不用

陰乾瓦上燒枯燒至煙盡為止每服三錢豈腐散調服或用豈腐調服亦妙甚效○臨卧遍身氣出血肉俱壞漸

生漸多舌尖出血身齒俱黑唇動鼻開 曰飲豈醋湯數碗十日自愈○忽有人影與己隨行坐卧久則成形與

己無異 此名離魂症用黨參五錢有力者用人參一錢或用高麗參三錢亦妙長砂茯苓各三錢煎服數劑候形

影不見再服十全大補湯以免後患○人前不食背地偷食見人則避面色黃瘦 此名鼠鳴病乃食過夜鼠饒

之涎所致 用十大功勞葉一名鼠怕草葉似蒲扇有五角角有刺焙乾為末每早空心服一錢酒下服至半月

即愈○卧床四肢不能舉動口說大話並喜說食物 此名失說物望病也病人若說食肉便云與爾食猪肉一

頓病人聞之即喜以肉放病人前臨要吃卻不與吃此乃失他物望也不必服藥其人睡中口流出涎自愈○瘡

痛內有雀鳥出者有亂髮出者有爪菜以及雜物出者 此邪祟也用狗糞要乾而色白者燒烟薰之越出越多出

盡自愈○人生尾巴 用藥線見離毒諸方捆住尾根漸漸捆緊半月自落落後再請名醫診脈多用補陰之劑

以免復發

地黃以懷慶產者為上聞彼處頂上者每觔需銀一兩有奇近來兩湖兩廣每斤不過三五百文至多亦

不過七八百文焉能無假總以透心黑者為佳中心微黃者次之有以紅白蘿蔔用地黃浸透汗假充尤宜細辨

白朮以於潛產者為上然貴而難得此外總以朮內色白者方可用不白即係蒼朮用之有損 茯苓取整個切片

照之微有筋膜為真近來多以米粉和苓末咀片假充又有以米粉包裏松根種成整個者亦宜細辨 茯苓真者

木心或在旁或在中亦不止一心切開有筋膜者是也假者木心在中且止一心而無筋膜 人參參最易辨見風

尤易辨惟納新器中封緊經年不壞若炒米色藏須攤過一夜方用否則參亦易壞然炒米亦能生虫或用新綿包

之又參最忌曰晒惟火烘不妨前參須用流水用止水功緩參本多假難於辨認無力尤不易得以故集中少用

高麗參多以東洋參及別約假充其法用大紅綢細包裏蒸之使綢紋顏色透入再用桂圓肉汁和入烘乾色味與

真高麗參無異欲試真假以氣虛及昏暈時服之有無功效為準 黨參色黃味甜枝軟菊花心為佳有以一種甜

黨染色假充者功緩無力 鵝不食草又名石胡荽野園荑雞腸草地胡椒地蒔蒿葦小黃花子若胡椒墻砌及平

地隨處皆有 旱蓮草又名鰾腸草黑草黑頭草黑草草其莖微紅折斷處色即變黑 紅芽大戟肉色微紅者

真白色者名綿大戟瘡毒用之无效 殺樹又名楮樹柘樹葉有兩枚若雲板樣亦有無枚者以刀砍樹身有漿流

出者是 甘遂味苦寒每觔用甘草四兩煎湯浸入三日後去湯用河水淘洗後用淨水浸之每日數次三日後去

心再淘再浸四五日取一撮入白磁盆內隔一宿看盆中水色不變乃妥再淘三四次漚乾以麪裹如團入糠火內

煨煨至麪團四面皆黃內藥熟透取出晒乾入砂鍋透磨粉其苦寒之毒經製則淨不苦而甜不寒而溫專消堅結

痰核毒 木鼈水浸半月入鍋煮數滾再浸熱湯中數日刮去皮心每日辰時入香油鍋中煮至油沫盡再煮百滾

透心黑脆以鐵絲篩撈出即拌入紅砂土磚細粉內拌至土粉有油氣入粗篩篩去油土再換炒紅土粉拌一時再

篩去土連製十日時刻切勿錯亂以木鼈同細土鍋內再炒入盆拌卷一夜取鼈去土磨粉用此物能搜筋骨入髓

之風濕祛皮裏膜外凝結之毒痰所煎之油可入敷膏用此物最毒倘炮製不透服之必發戰而死是不可不慎也

乳香如乳頭明透者良近來多以楓香假充性粘難研每兩用燈心二錢五分同炒炒至圓脆可粉為度扇去燈

心取香磨細用 沒藥色赤如琥珀者良亦用燈心同炒與製乳香同 水片多以樟腦假充以牙色如梅花片者

心取香磨細用 沒藥色赤如琥珀者良亦用燈心同炒與製乳香同 水片多以樟腦假充以牙色如梅花片者

良用杉木炭養之則不損耗 血竭味甜鹹色赤以染透指甲者為真味大鹹有腥氣者是海母血假充 阿魏味極臭取少許沾銅器上過夜沾處色白如銀者真 硼砂色黃如膠者真 沙苑蒺藜以潼關產者良皮貨店所帶形扁如腰子色綠者真 赤小豆又名飯豆扁而紅者是若半紅半黑名鬼眼豈無益有損斷不可用 烏梅生青絲蒸熟用稻草灰和入晒乾即是店中多有以小李假充必須自製用之方效 柿餅以大者為佳有以小野柿假充用之有損 蓖麻子油蓖麻子五升搗爛用水一斗煮有白沫即取起待沫盡乃止去水將沫熬至點燈不炸為度 燈心炭取活竹一段兩頭留節中開一眼以燈心塞滿外將原刻竹仍填原眼加泥裏好入糠火內煨至竹成一炭取內燈心炭用 阿膠味不臭者佳色綠老為上有氣味者必假不如好牛膠代之 鹿茸有數種佳者頗不易得茸片尤假一人與茸客至交因體虛向客索得血片一斤服之體虛如故毫不見功怪而問之茸客醉後吐實係用牛尾緒血和藥做成其片放手心亦能捲動與真茸無異 鹿膠凡膠以自熬為真鹿膠必用真關東鹿角熬服方效若川角魚角色白而長者俱無力 龜膠此膠亦宜自熬板以厚而黑者為佳黃而薄者無力 龜板生用有力藥店多以熬過龜板混充不可不辨 癩蝦蟆又名癩團又名老蟾目紅腹無八字紋不可用 蜣螂又名推車虫推糞虫以人糞一團如推車者是 搔蟻子又名偷油婆江蘇人呼為蠛娘有翅能飛其色紫如油灶邊及有食物之處最多 蜣螂又名蛄蟬又名鼻涕虫其形似也 蝸牛頭有髮尾有螺殼者是 螺蛄又名螻蛄即土狗也 蠱虫大如蜜蜂腹四扁微黃綠色喜食牛馬血

雜治

○治熱病法外用吳茱萸末熟醋調敷兩脚心一週一換時以愈為止此法最妙 凡熱症有心胸煩悶者有日

久沉睡不言者此火伏於內也用萊菔和建橘餅煎湯溫服一面服以清涼之藥一面以此湯飲之自易奏效再以前好梨食之更妙 ○困倦喜睡齒暗無色舌白昏昏不知痛痒處或下痢或不下痢 此虫食肛門症也 用桃仁十五粒去皮尖好醋一碗盪三錢煎熟連桃仁服 ○沉悶無聊若有病狀遇一名醫云此熱症已極氣血消鑠不急治一二年後必發大癰而死惟每日食好梨一個服至一年不可間斷依法服之而愈梨久易壞用蘿蔔隔開收藏可以久留 ○夜不能睡 生地三錢麥冬三錢北五味七粒用水煎連服三日必放燈心一兩煎水當茶飲向晚不可飲茶 ○止火法 凡遇火起之處用鷄蛋三個每個大頭寫溫字小頭寫瓊字向火燭絕高處儘力擲

去口念數施發澀天尊連擲連念其生處火燭自低矣
盤誠心向天搖簸口念數施發潤天尊其火自熄

驗方新編卷之十七

咽喉○總論 夫左為咽屬胃右為嚥屬肺乃一身百節之關呼吸出入之門內經云一陰一陽結而為痺一陰者

手少陰君火心之脈氣也一陽者手少陽相火三焦之脈氣也二脈共絡於喉氣熱則內結結甚則腫脹甚則氣痺痺者不仁之謂此喉痺之所由名而乳蛾喉閉纏喉等皆痺類也有風寒火濕毒虛之別或風火相搏或寒暑相聚其症變幻不一如漫腫而多痰風與濕也淡白而牙緊風寒也紫色不腫而爛者風伏寒也紅腫而脈浮者風火也脈沉實爛口不腫者毒也脈細數而浮者虛火也脈細而緩者虛寒也六者之象可類推也大凡初起之症診右寸洪緊肺風也兩關浮數胃火肝風也左寸脈洪心火也右寸沉滯肺伏寒也右寸沉細肺伏熱也右尺洪大三焦火旺也左尺浮洪而有力腎虛而火炎也六脈大略論治俱可用六味湯加減症若凶險脈宜細診再察形窮原對症用藥自然可愈經云聖神功巧不過望聞問切細心推詳庶無差悞耳○喉症分經 喉有二孔左為咽屬胃納食之關右為嚥屬肺納氣之關口內上腭屬胃陽下腭屬脾陰舌之中屬心四圍屬脾舌根亦屬心小舌又名蒂丁屬胃喉之左右舌根屬肝外兩耳垂下亦屬肝牙根上屬胃下屬脾舌胎白主寒黃主熱焦軟甚黑軟極凡舌胎不單論色但有津者非真熱不可概投涼藥宜引火歸原大舌邊乃脾火可用清涼之劑喉癰地位屬肝再連內寸許或爛或腫俱屬脾胃火毒之症結毒亦有之但結毒者兩關脈必沉兩關脈浮非結毒也此分經大略用心再認便悉○咽喉治法要論 醫者當審其病由參之時令必煩大湧其痰去痰之法先備溫水使病人數口如熱刺

或吹藥令其垂頭流去痰涎俟痰涎少止仍以溫水頻頻漱之 如虛弱人及病勢重者須要着人扶好或用銀針

刺其患處風熱則散之火症則清之甚者下之陰寒者溫之若初起驟用寒涼之藥則上熱未除中寒復生其毒乘

虛而入即喘不休死不救矣大抵風熱症十之七火症十之三寒症十無一二也 病昏沉痰多氣急飲食不進發

熱不退牙關緊閉脈息微弱者症必重 人事不省痰氣上攻聲如雷噎食眼張天柱倒陷面黑色焦鼻如烟煤張

煽不定目睛突出汗發如雨咽喉乾痛聲啞無痰手足麻至膝蓋發喘及呃脈息如絲乃死症也 臨症用藥生死

反掌醫者不可懷希冀之心故意延挨病者不可起懈怠之念以致決裂古云走馬看咽喉不待少頃者即此謂也
遇症用藥後痰少腫退即愈如已潰用藥後越兩日即可進飲食者三日後無不收功 喉癰用藥後患處變
紅色知痛癢有津液潤澤者可治用力針須向自己公來不可向病人口內剔去 咽癰忌下刀之地有四處 龍
化 啞門穴 喉關兩劫上 舌下筋 若用刀其刀頭上須蘸已藥或亥申藥度不作痛 臨症先診其脈象輕
重後看其患處深淺若脈絕脈怪脈死則毋須用藥矣因毒已入腹非藥力所能挽回也 纏喉風及陰虛喉癰二
症最險而難治至危而不易識纏喉風內外無形其患在關內上面有紅絲如未入心尚可治藥已入心則不治凡
遇此症宜早治在一日半日之內可保無虞陰虛喉癰如癆瘵皮形有青白點子高低大小狀如暑天瘡子其症雖
危延日最久或一年半載而死或一月半月而死如起病數日之前治之十症可得九愈看喉腫處其色變紅者即
成膿之後可不刺而自潰也 喉症用糯米泔水或甘桔湯或薄荷湯俱要溫和為主山查焙燥磨細末煎藥內可
加一撮乃消腫去毒治咽喉之要藥也 病人壯者藥可猛烈弱者攻宜緩 動針不可傷小舌要緊 夜晚看症宜
倍加細心藥用六味湯天明復看再為加減凡針舌下兩邊青筋血紅生血黑死服宜清膈消痰解毒之劑○四絕
症 走馬喉風 鎖喉風 走馬牙疳 纏喉風 此皆凶險之症若不吐不瀉針之無血藥不能入皆為不治慎
之慎之○十六絕形 舌捲囊縮 角弓反張 油汗如珠 十指無血 啞喉噎食 喉乾無痰 吐血喉癰
六脈沉細 聲如鋸拽 大便十日不通 鼻塌唇青 天柱倒塌 脈細身涼 兩目直視 壅痰氣塞 喉
菌不治

吳氏咽喉二十四大症歌訣今存二十二症 ○喉痺 鬱火攻令喉癰成或生左右小棋形鮮紅酒毒光如鏡腫在
喉間風熱勝 其症形小而圓初起或消或刺皆可如其色紫紅平塌光如鏡者不可刺宜內消因其毒發於本源
故也 ○喉閉 積熱風痰欲閉因生血泡在喉間忽然壅塞櫻桃似點刺流涎病即安 其症宜發表清熱先

用針點後吹子丑二藥 ○纏喉風 惡寒惡痛名陰毒內外無形氣短促胸前紅腫足多寒若見紅絲針貴刺

藥宜發表吹藥先用已藥如見紅絲即刺斷再用子藥 ○瘡喉風 此症謂之飛絲毒口中發泡丑藥服燥極點

藥宜發表吹藥先用已藥如見紅絲即刺斷再用子藥 ○瘡喉風 此症謂之飛絲毒口中發泡丑藥服燥極點

咽喉口不言兮牙關塞面紫唇青冷涕流風疏痰降即無厄 其症牙關緊閉先用已藥後用申藥前後抹之風痰

去盡為度煎藥先發表後清熱 ○弄舌喉風 體發熱今口內腫舌出頻將兩手美筆針患處去痰涎解毒疏風

清熱壅 用三棱針刺破少商穴先用已藥後用子藥 ○爛喉風 爛喉風症頻頻熱唇若塗硃口內裂看其患

處淺和深藥宜子丑兼調攝 子丑二藥和勻上之再用已藥收功煎藥宜清熱 ○單乳蛾 喉內腫如桃李形

或右或左單蛾名此症早治可速退痰消毒散自然平 此症不論已成未成皆可刺其形大而長初用已藥後用

子丑二藥收功煎藥先發表後清熱 ○喉癰 七情鬱結病成癰六日之內可刺膿不治須防成冷瘻已申藥到

定收功 其患在喉嚨化合後之正中到四五日後可刺早刺防復腫未刺前及未潰前吹藥先用已字後用申字

潰後用子丑二藥煎藥先發表後清熱 ○牙疔 太陰脾土足陽明二火交攻疔即成患在牙齦如豈大排針點

破即安甯 先用申藥後用子藥 牙宣 此症起時因胃熱壅而宣露常流血藥吹酒末即能除清胃煎來功奏

捷 先用子藥後用酉藥末藥二種止血前清藥去胃火 ○木舌 舌病心經受風熱忽然腫破口難說看時左

右共宜針藥用炬連火氣滅 吹申藥看紫色處用小刀點之出血後吹子藥 ○重舌 蓮花之症看如何三舌

攢在舌底疔戍藥頻搽宜更點清心瀉火莫蹉跎 用申藥吹之不退再用戍藥上三症用清熱解毒煎藥 ○重

膠 體雖不熱獨心勞舌上生來似小桃藥用黃連解毒飲吹宜冰片不須刀 用子藥吹之 ○走馬牙疳 小

兒疳症屬於脾黑腐沿關臭不宜子丑合參兼卵藥穿腮落齒難醫 先用米泔水洗淨或溫水亦可藥用子丑

和勻敷上如不應乃險症也煎藥用解毒 ○痧豎口疳 痘餘痧後口生疳爛在牙齦痘毒傳若是見痧生滿口

須從心胃二經參 吹子丑卵藥煎藥宜瀉心胃二火 ○雙乳蛾 雙蛾兩兩生喉間關上輕今關下難氣吹好

似紅李子輕消重刺去風痰 形與雙單蛾同刺不論已成未成先吹已藥不退再點子藥煎藥先發表後清熱

○螞蝗疔 疼而微白螞蝗疔膀上生來韭菜形內不腫今發寒熱速宜針刺自然平 用申藥點去惡血後用子

藥煎有表發表無表煎藥解毒瀉火 ○連珠風 兩切深處患連珠初起沿開白色餘日久漸成八九點藥和子丑

病當除 和勻已子丑藥吹之兼上寅藥煎藥宜清熱解毒 ○陰虛喉風 癰症原來因損肺斑生若癰若蝦皮

時時發熱頻頻嗽面赤聲嘶病可慮 其症虛弱不宜發表須用滋補兼解毒上半月痛甚者乃氣虛下半月痛甚

者乃血虛吹卵藥並上丑酉二藥若日久不減者不治 ○楊梅喉癰 楊梅結毒癰由生片白喉中穢氣聞白色變黃纔可治酉隨子丑共追尋 和勻子丑二藥吹入後用酉藥收功煎藥宜解毒 ○咬牙風 即是鎖喉風毒

在牙齦胃火攻不治恐成牙漏症開闕辰藥字收功 先用辰藥擦牙齦縫中如瘡不退再用子藥煎藥宜清熱

吳氏丹藥列方 ○子藥 明硃砂六分礞砂五錢梅冰片五分元明粉五錢製研末治喉中潰爛長肉生肌生新去腐

○丑藥 雄精一錢梅冰片五分膽礬二分火煨研末治口腐爛用少許不宜多孕婦忌 ○寅藥 青黛一

兩人中白五錢黑山梔五錢梅冰片一錢厚朴切片用黑棗去核三兩包厚朴火上煨存性五錢研末治口疳神效

若遇傷寒後口疳另用坑磚一角水煨研末五錢 ○卯藥 梅冰片一錢雄精二錢靛花二錢元明粉二錢砂礞

五錢粉甘草一錢川黃連二錢人中白三錢煨存性銅青五錢煨黃柏二錢蜜炙雞內金一錢鈔紙二張上寫年月

日合煨存性枯礬一錢鹿角霜一兩研末能解毒退腫生肌去腐治陰虛喉癰更佳 ○辰藥 上好膽礬冬月取

青魚膽汁和勻成塊陰乾刮下用磁瓶收貯其藥過一二年可用研末治牙關緊閉食不能進口不能開用鷄毛蘸

抹兩牙底令其流出痰涎少頃即開矣 ○巳藥 梅花冰片二分半雄精二錢煨硝一兩五錢要鎗硝煨乃佳己

藥之性與申藥同論其功更速如痛癰者先用巳藥後用申藥吹之治單雙蛾初起一二日用此藥開痰即愈未潰

可用巳潰不可用孕婦忌 ○午藥 川黃連一錢明礬一錢牙皂一錢去皮弦新瓦上煨存性研末入上二味研

末吹患處扶好病人囑其歪頭流去痰涎其藥不可多用若聲似雷音以溫水調藥徐徐嗽之治喉中痰塞其功與

辰藥同但其性太猛不宜輕用不如用辰藥平穩臨時看症酌之孕婦忌 ○未藥 雄精二錢朴硝五錢礞砂二

錢研末如喉嚨緊閉不能吹藥用此藥吹入鼻內其口即開開後或點或刺或消腫用巳申之藥如腐爛用子藥一

切喉症皆可用 ○申藥 元明粉一兩雄精一錢去痰消腫不剛不柔神妙莫測孕婦及弱人病勢沉重者皆勿

用 ○酉藥 鷄內金一錢要不落水者瓦上焙乾為末梅冰片一分研末吹患處能止痛若腐爛疼痛加子藥若要

收口加兒茶二錢 ○戌藥 礞砂三錢元明粉二錢青鹽一錢用火煨紅放在地上越一日去火毒研末擦重舌

蓮花舌名紫雪丹餘症切勿用 ○亥藥 巴豆二十一粒生礬一兩入銀罐內滾之看礬枯去巴豆每一兩礬加

小姜黃末一錢剉糊為丸用雄黃末二錢為衣丸如桐子大每服七粒薑湯下用辰藥後可服此丸重者用之輕者

不用此丹開國最難瘰癧乃起死回生之靈丹也名回生丹

○青金散

元胡索三錢或一錢或二錢或三錢或四錢

去皮弦研末加青黛六分麝香五釐用水丸重五分遇症用新汲井水磨化以綿紙條蘸藥入鼻孔內如病沉重者研末吹之中風及小兒驚風皆合用

鎖匙散即已藥去雄黃專治雙乳蛾極其神效 ○玉鎖匙 明礬一兩

銀罐內溶化即下巴豆二十一粒俟礬枯取起放在地上越宿次早去巴豆用礬研末治症同上孕婦忌 ○綠袍散 厚黃柏二兩青魚膽一兩黃柏火上炙乾取起以魚膽塗上再炙再塗以膽盡為度切片研末加入人中白三

錢青黛三錢梅水片三錢膽凡三錢研末治口疳疔瘡 ○喉蛾穿方 人指甲清水洗淨瓦上焙黃色為度每串末一分加梅片一釐 又方用壁錢窩將銀簪夾住向燈上燒灰研末吹之 ○牙宣出血方 七葉一枝

花即三七用七分加牛膝三分梅片少許研末吹之神效 ○通開散 青鹽一錢白礬一錢硼砂五分咽喉腫痛滴水不下吹之止痛 ○走馬牙疳方 梅水片三分人中白三錢火煨赤砒錢半黑棗七個去核將砒分作七處

入棗內炭火煨烟將盡取出存性用米泔水洗淨患處將藥抹上如在晚上擦更妥 附前方牛旁子元參防風

皂角刺曼刺子蟬蛻石膏擦過前藥用此方白水煎服三劑忌發物煎炒椒料 ○穿蛾方 土大黃晒乾研細末用着頭蘸藥點之蛾即破 ○喉蛾方 麝香二分半梅片一分半鰾珠五分牛黃二分半黃連五分硃砂五分兒

茶五分血竭一分半硼砂一錢二分共為末吹患處 附漱口方防風甘草銀花薄荷荊芥鹽梅栗蒲殼先煎此藥款口後吹前藥忌發物煎炒椒料 ○治喉痺喉癰喉蛾等症回雪品雪呂雪三方 回雪麝香一分水片二分牙

硝一錢硼砂四錢 品雪水片二分牙硝二錢硼砂四錢 呂雪牙硝二錢以上諸藥不見火研極細末每次吹一二分奇效 ○治喉風喉脾喉蛾等症喉科第一要藥凡遇不治之症吹此藥即可開關 真牛黃一錢露蜂房五

錢黃名者佳焙存性大水片一錢青黛二錢硼砂二錢熊膽二錢要五月五日午時合 又方真牛黃一分水片一分硼砂二分雄黃二分川連一錢黃柏一錢硃砂二錢青黛二錢青魚膽二個 ○治喉風 蛇蛻不拘多水陰陽

瓦焙灰吹之即愈 ○本藥方 川烏焙草烏焙何首烏焙烏頭焙龍骨煨象牙銼青黛硼砂兒茶各一錢血竭乳香沒藥珍珠炙青魚膽水片各五分銀花生五分炙五分麝香五釐 右青魚膽另製每冬至前七日內取膽不

落水洗至白理向陽土中深三尺至立春日取出風乾備用每取五分和入諸藥為細末磁瓶密收凡咽喉諸症悉

用此先吹下刀後用秘藥○秘藥方 治咽喉七十二症俱用此吹之神效 黃連焙黃柏焙黃芩焙梔子焙黃

耆薄荷防風荊芥元參連翹細辛白芷川芎羌活獨活三棱檳榔厚朴苦參甘草木通製半夏川烏草烏蒼朮麻黃

赤芍升麻大黃僵蠶牛旁桔梗射干乾葛皂刺車前桑白五加皮粘子地骨皮麥冬山荳根杏仁生地歸尾天花粉

天南星銀花川槿皮麥三七 各一兩揀上好潔淨咀片有泥垢者洗淨用新缸一隻將藥入內加清水浸之日

晒夜露四十九日取起濾去渣用銅鍋煎之將藥水逐漸加入用文武火熬不住手用槐柳枝攪之前稠如糊再加

入後開各藥雄黃五錢 青礞石童便煨七次乳香炙去油沒藥炙能膽焙龍骨煨元明粉血竭石燕醋煨七次海

螵蛸紙包煨盧甘石童便煨七次青黛各五分枯礬兒茶各一錢輕粉黃丹水飛各三分桑枝灰三錢礞砂七分

右為細末入煎膏內和勻做成小餅如指頭大晒露七晝夜放地上以瓦盆蓋之一日翻一次七日取起置透風處

陰乾收藏瓦罐內三個月方可用之用時為極細末每二分加後七味 片腦珍珠珊瑚各四分麝香牛黃各二分

輕粉一釐礞砂二分共為末和勻密收小罐以烏金紙塞罐口每以銅吹筒取藥少許吹患上咽喉諸症皆獲神效

○元霜散 治一切喉風痺閉並口舌諸症 薄荷僵蚕青黛朴硝白礬火硝黃連礞砂各五錢 共為細末腊

月初一日取雄豬膽七個倒出胆汁用小鍾將胆汁小半和上藥末拌勻復灌入胆殼內以線紮頭外用青紙

包裹於 露天地上掘一窩濶深一尺上用竹杆懸空橫吊藥胆上用板鋪以土密蓋候立春日取出掛在風口陰

乾去膽皮並紙為末每一兩加水片三分吹喉神效○蓬萊雪 治咽喉七十二症俱效有力之家合此藥濟人

陰功甚大 生黃芩生黃連梔子炒黑各研細末雄黃礞砂牛膽硝各三錢鵝內金人中白枯礬各一錢製青梅煨

存性青黛各五分共為細末入後七味 牛黃麝香各三分銅青熊膽珍珠水片各五分兒茶八分共研勻收之每

遇喉症以少許吹於患處一日夜十餘次徐徐流出痰涎漸愈如有腐爛具穢用豬牙皂扁柏枝同搗和水去渣灌

漱令淨吹藥神效 製青梅法大青海一筋去核入白礬食鹽各五錢拌勻再以蜒蛭虫不拘多少層層間之一日

夜取梅晒乾以汁盡為度煨存性用 製胆硝法冬月取出黑牛膽一個入朴硝在內掛風口陰乾一百二十日取

用之○冰片散 治咽喉口舌諸症 礞砂五錢雄黃黃柏蜜炙凝花薑連末元明粉各二錢枯礬雞內金煨存

性土茯苓各一錢鹿角霜一兩人中白三錢煨銅青五分煨存性水片二分另入烏金紙三張煨灰右為細末吹喉

神效○冰硼散 治咽喉口齒新久腫痛及久嗽痰火咽啞作痛

元明粉硼砂各五錢冰片五分硃砂六分石

為細末吹四五次神效○碧雪方 治一切風痺癱瘓時行諸症俱可用吹已經潰爛者珍珠倍之加琥珀四分

真紫金藤八分俱要研細末

白蘿蔔苗四兩無苗時用鮮蘿蔔一觔代之薺薺苗五兩無苗時用鮮薺薺一觔代之

之鮮土牛膝根五兩乾者用七兩又名天名精鮮銀花葉四兩乾者用六兩

以上四味用囊盛之長流水浸一宿

取起帶水磨攪勻澄清取粉每粉一兩為一料配入後藥 遠志去心八分甘草水泡人中黃人中白各一錢桔梗

三錢僵蚕甘草水泡去水上浮油硼砂真川貝馬勃各五分珍珠四分西牛黃五釐冰片三釐

以上遠志丹皮

桔梗僵蚕四味用文火焙餘各生研極細末無聲為度并前粉和勻用吹為丸含舌下亦可為丸用土牛膝鮮者一

兩和人乳汁半酒盃搗汁加當門麝三釐和藥跌丸如薺薺大

○十葉散

治一切風痺喉症猝發腫痛用蘆管

吹之並可內服用甘草六分桔梗一錢煎湯調下每服七分

芙蓉葉菊花葉柳槐葉芭蕉葉冬桑葉土牛膝葉金

銀花葉蘇葉荷葉

各應時採鮮者風乾等為末候十葉俱全等分和勻磁瓶收貯猝遇喉症外用蘆管吹之內用

甘草桔梗湯或開水調下每服七分若遇無名火毒喉腫紅赤兼可敷消取井華水調敷患處

○含化丸 治諸般喉症效驗神方 真西牛黃二錢新柏子仁去淨油四十九粒真法製半夏雪水浸七日八分透明雄黃五錢陳

膽星五錢硼砂二錢真川王全六錢真川連六錢 右藥用好醋和丸小梧子大每服一丸甘草湯送下能含口內

含化更妙虛人孕婦忌用

○五寶丹

治結毒筋骨疼痛腐爛口鼻諸藥不效及咽喉爛損湯水難下並效 滴

乳石四錢琥珀硃砂珍珠各二錢冰片一錢 各研細對準和勻每約一錢加飛麝八錢和勻每用土茯苓一觔

水八碗煎至五碗去渣作五次每次加五寶丹一分和勻服十服自愈看病上下如是爛每日土茯苓內加辛夷三

錢咽喉腐爛加桔梗三錢忌食海腥牛羊火酒煎炒等物並房事

○舌銛丹 治梅核結氣愈後用此散餘毒

元明粉要真一錢二分貝母一錢晚米一撮拌濕同炒為末用舌銛喫

○咽津丹 治梅核氣乃痰氣結於喉中

嚥之不下吐之不出如茅草長刺喉中作癢初起吐酸妨碍久則閉塞 臙蓉硼砂明礬牙皂雄黃各等分為末用

紅棗煮爛為丸如芡實大空心含化一九溫黃酒一盞過口內服蘇子降氣湯

○水梅丸 治風熱火毒凝結喉間以致痰涎壅塞吞吐不利 大南星鮮者二十五個切片大半夏鮮者五十個切片牙皂去皮弦朴硝白礬防風

鹽各四兩桔梗二兩礪砂一兩五錢山豆根三兩梗七分熟梅子一百個先將鹽硝入水浸梅子上漫三指為度過一日將各藥為末入水拌勻同梅子再浸七日取出晒乾再浸再晒藥水盡為度方將梅子入罐收之梅子日久起白霜更妙用時以薄綿裹一枚含口中令含出津液徐徐嚥下痰即化病即愈一丸能治三人切勿輕棄 ○治喉癰方 喉症惟此最遲久則失音不可救 西牛黃水片各一分山羊血二分川連燈草灰各五分血碧橄欖核灰各三分礪砂一錢 共為細末每一茶匙藥用一茶匙蜜調之效舌尖上徐徐咽下一日五次兩月可愈或加蜚螬梅核燒灰二分於此方內更妙 ○三黃湯 治咽喉一切諸症初起黃紅甚至紫黑壅腫疼痛惡寒發熱用此抑火 黃連四分甘草五分川芎七分黃柏黃芩梔子赤芍薄荷各一錢水煎食後溫服加後七味 青皮八分陳皮花粉射干各一錢銀花當歸各一錢五分元參一錢名三黃涼膈散 引加燈心二十寸竹葉十片口乾便閉加大黃三錢虛人虛火不必加大黃 ○清脾降火湯 治脾陰火灼外感風熱咽喉刺痛等症 丹皮黃芩白芍防風白朮猪苓各一錢青皮薄荷澤瀉各七分當歸一錢二分生地三錢黃連五分桔梗赤茯苓麥冬去心元參各一錢五分梔子八分 引加鬚葱白二十寸燈心十寸水煎服 ○清涼散 治一切咽喉腫痛吞吐不利 山梔炒防風枳殼各七分連翹去心八分黃芩當歸薄荷桔梗煨各一錢生地一錢五分甘草六分白芷五分 引加燈心二十寸細茶一撮山豆根五分水磨汁沖服咽喉乾燥加麥冬一錢五分花粉一錢去白芷發熱加柴胡七分腫甚痛不減或生瘡加粘子元參一錢五分去白芷痰火盛加射干八分水薑一錢竹瀝五分去白芷熱極大便結加大黃三錢去桔梗腎虛水泛咽痛生瘡聲音不清倍生地加黃柏知母各一錢去白芷 ○山荳根湯 治咽喉癰毒陰虛火盛五心煩鬱諸症 陳皮去白八分射干桔梗連翹各一錢山荳根元參各一錢五分薄荷甘草各五分麥冬去心一錢二分 引加燈心二十寸煎七分慢慢嚥下 ○益氣疏風湯 治心胃鬱熱風火逆於咽間致生瘡癰等症 升麻青皮各五分甘草六分川芎七分桂枝三分紫蘇防風各八分生地三錢當歸白芍花粉茯苓前胡甘草連翹去心各一錢麥冬去心一錢二分加蘆根汁半小盃沖服 ○雪林普濟消毒丸 治大頭溫憎寒壯熱面腫目不開煩喘咽喉不利舌乾口燥等症 黃連黃芩酒炒元參大黃黨參大藍根如無靛花代之銀花各一兩陳皮

嚼白湯送下如發時不及製丸用末藥一錢二分照引服未愈再進一服以汗為度不可透風透風復腫仍服是丸但腫處必脫去皮一層乃愈忌酸冷魚雞羊肉房事一方治大頭病面腫項腫用福建龍花三錢火酒一鍾雞子清一個和勻服下不愈時腫消而愈○托裏消毒飲 治喉症已成不得內消宜服此藥托之未成即消已成即潰

腐爛易去新肉易生此時不可內服泄氣寒涼等約致傷脾胃為要一切難疽俱可用 黨參焙黃耆各一錢五分

白芷皂刺各五分甘草六分桔梗白芍當歸白朮茯苓銀花各一錢水二鍾煎七分食遠服脾弱者去白芷倍參耆

○濟陰化痰飲 治陰虛火灼憂思鬱慮致成喉症 小生地三錢銀花元參各一錢五分廣皮七分遠志柴胡

各八分桔梗一錢二分川貝一錢赤苓二錢甘草六分○元參六味湯 治老人虛人風熱喉痺腫痛等症 元

參一錢五分小生地二錢丹皮八分甘草即建澤瀉各五分淮山藥一錢二分山萸肉雲苓桔梗各一錢 二症愈

後俱服清咽抑火丸以杜後患○枳桔二陳湯 治七情鬱結痰氣結如梅核或如破絮在咽喉之間咯不出咽

不下或中脫痞滿氣不舒暢或痰涎壅盛上氣喘急或因痰飲惡心嘔吐等症 陳皮梔子炒製半夏茯苓黃芩桔

梗蘇子各一錢枳殼七分甘草白芷薤各五分薑三片水煎服○行氣香蘇飲 治梅核氣咽喉氣脹上攻胸膈

疼痛 香附陳皮厚朴各五分紫蘇枳殼各七分烏藥三分桔梗製半夏各一錢大黃酒蒸一錢半甘草六分引加

燈心二十寸○清氣利咽湯 治七情鬱結致生氣肉咽間脹塞吞吐不利 甘草枳殼陳皮各七分山梔炒蘇

梗貝母製半夏茯苓各一錢桔梗花粉各一錢二分香附五分 引甘薑一片水煎服如火盛咽疼色紫加茯苓一

錢黃連五分去半夏生薑如虛火不盛咽紅勞力即疼加元參二錢生地一錢五分當歸一錢知母一錢黃柏一錢

去半夏生薑○少陰甘桔湯 治少陰咽痛頭眩脈沉細而身尤熱者宜服之 桔梗川芎柴胡各五分甘草三

分陳皮羌活升麻各四分黃芩八分元參一錢水二鍾煎白一根煎服○黃連瀉心湯 治老幼心火妄動結成

重舌木舌紫舌腫脹堅硬 黃連山梔荊芥黃芩連翹去心木通薄荷梔子各一錢甘草五分水二鍾燈心三尺煎


八分食遠服○黑參丸 治口舌生瘡久不愈者 元參麥冬去心炒天冬各一兩為末煉蜜為丸如彈子大每

用一丸含化下○甘露飲 治男婦胃中客熱齒齲腫悶牙宣出血心內多煩飢不欲食喜睡嗜臥及咽喉生瘡腫

爛等症 天冬去心麥冬去心當歸各二錢石斛生地熟地各三錢黃芩枇杷葉去毛淨赤芍白芍元參犀牛角各

一錢五分甘草一錢荊芥五分炒黑水二鍾煎七分食後服若齒齲宣露腫悶並可煎湯溫漱 ○清咽抑火丸
 治常發一切癰腫乳蛾或單或雙愈後服此丸藥百天切勿間斷可永不發 生地六兩丹皮麥冬金葉攪元參各
 四兩連翹黃連山梔各二兩甘草一兩五錢沙參白芍歸尾桔梗各三兩連志澤瀉各一兩荊芥穗二兩五錢川黃
 連五錢 各取淨末和勻煉蜜為丸每服三錢開水下

喉珠簾



廉珠喉滿喉如白網細狀兩邊微腫根有白
 點帶紅色小舌紅腫水大痛此症因鬱積
 熱毒而發其服兩寸浮洪兩尺亦數大如
 此上感下虛之症也宜清火用六味湯加
 炒黃柏五錢山豆根二錢鹽炒元參二錢
 熟石膏三錢酒炒黃芩二錢鹽炒元參二錢
 加連翹一錢木通一錢生地三錢服一劑來日再
 二錢草河車二錢紫花地丁三錢服一劑來日再
 柏枝汁一盃沖服乃妙外吹藥六七日可愈

喉腫外內



內外腫喉此症生于喉關之下陰陽相結內
 外皆腫或有爛症火鬱之症用六味湯加炒
 黃芩三錢熟軍五錢海浮石二錢外吹藥來
 日換加丹皮一錢炒山梔一錢通一錢即針
 錢生石膏三錢炒山梔一錢通一錢即針
 少商兩手四穴如背寒加羌活胃乏加
 葛根柏枝汁亦可漱之

喉虛色紫



紫色虛喉問紫紅久之變爛如生漆色因
 初起早服寒涼之藥故也此症肺胃火寒平
 而不起飲食難進吐出血乃腐肉角宜急治
 如誤認火熱之症反用三黃肉角宜急治
 等約則成死症矣余見此等紫喉之症不
 論名色喉間絕無影五錢服後紫喉身涼
 者用六味湯加細辛五分服後紫喉身涼
 銀白芷川芎蘇黃各一錢服後紫喉身涼
 加鹽炒元參二錢酒炒黃芩二錢花柳二錢

喉啞食噎



噎食啞喉此症因伏邪在肺聲啞食六
 脈通細甚屬陰症余曾治一人年二十
 惠此三年飲食少進病在將危余診視再
 三病雖久脈有力有根在將危余診視再
 湯加麻黃三錢桂枝一錢錢錢錢錢錢
 一錢細辛二錢白芍一錢錢錢錢錢錢
 三錢姜炒半夏二錢車服五六日病雖
 而聲啞未除換加桔梗一兩錢錢錢錢
 草七錢薄荷一錢以上俱重便妙麻黃一
 錢煎數沸荷一錢以上俱重便妙麻黃一
 服補藥健脾

喉熱風



風熱喉此症感風熱而起滿喉發細紅點
 根帶淡白舌下兩邊三四塊六服洪緊用
 六味湯加鹽炒元參二錢酒炒黃芩三錢
 山梔一錢花粉一錢一服可愈外用吹藥
 兼服八仙散

喉癰



喉癰此症因胃虛火旺發於喉不腫而
 微紅上有點點青白不一如米子或針頭
 每點生芒刺入水大痛深間聲啞咳嗽無
 痰六脈數者用大黃湯加黃芩四兩湯
 加麥冬炒元參三錢炒山梔一錢黃芩
 參二錢或煎藥不用入丸藥亦可首烏
 二錢十服後用附桂八錢丸如女貞前
 地黃湯四兩湯服後不腫如女貞前
 地黃湯四兩湯服後不腫如女貞前