

傅青主先生女科書

序

青主先生於明季時以諸生伏闕上書訟袁臨侯寃事弄得白當時義聲動天下馬文南義士傳比之裴瑜魏劭國變後隱居岫山中四方仰望丰采已未鴻詞之薦先主堅卧不赴有司敦促就道先生卒守介節

聖祖仁皇帝鑒其誠降

旨傳山文學素著念其年邁從優加銜以示恩榮遂授內閣中書聽其回籍蓋其高尚之志已久為聖天子所心重矣而世之稱者乃盛傳其字學與醫術不已細哉字為六藝之一先生固嘗究心若醫者先生所以晦迹而逃名者也而名即隨之抑可奇矣且夫醫亦何可易言自後漢張仲景創立方書以來幾二千年專門名家罕有窮其真者先生以餘事及之遽通乎神余讀兼濟堂文集並觚觚諸書記先生軼事其診疾也微而賦其用方也奇而法有非東垣丹溪諸人所能及者昔人稱張仲景有神思而乏高韻故以方術名先生既擅高韻又饒精思賢者不可測如是耶向聞先生有手著女科並產後書二冊未之見也近得鈔本於友人處乙酉適世兄王奎章來省試其道李子緝中賢至丙戌冬果寄貲命付剞劂其盛德事也故樂為序而行之並述先生生平大節及聖朝廣大之典不禁為之掩卷而三歎也

道光丁亥夏五月丹崖張鳳翔題

序

執成方而治病古今之大患也昔人云用古方治今病如折舊屋蓋新房不經大匠之手經營如何得宜誠哉是言昔張仲景先生作傷寒論立一百一十三方言後世必有執其方以誤人者甚矣成方之不可執也然則今之女科一書何為而刻乎此書為傳青主徵君手著其居心與仲景同而立方與仲景異何言之仲景傷寒論雜症也有五運六氣之殊有中表傳裏之異或太陽太陰不一其票或內傷外感不一其原或陽極似陰陰極似陽不一其狀非精心辨症因病製方斷不能易危就安應手即愈此書則不然其方專為女科而設其症則為婦女所同帶下血崩調經種子以及胎前產後人雖有虛實寒熱之分而方則極平易精詳之至故用之當時而效傳之後世而無不效非若傷寒雜病必待臨症詳審化裁通變始無貽誤也嘗慨後世方書汗牛充棟然或偏攻偏補專於一家主熱主寒堅執謬論炫一己之才華失古人之精奧仲景而後求其實徹靈素能收十全之效者不數數覲讀徵君此書談症不落古人窠臼制方不失古人準繩用藥純和無一峻品辨症詳明一目了然病重者十劑奏功病淺者數服立愈較仲景之傷寒論方雖不同而濟世之功則一也此書晉省抄本甚夥然多秘而不傳間有減去藥味錯亂分量者彼此參證多不相符茲不揣冒昧詳校而重刊之竊願家置一編遇證翻檢照方煎服必能立起沉疴並登壽域或亦濟人利世之一端也夫

道光十一年新正上元同里後學祁爾誠謹序

傳青主女科卷上目錄

共三十八條三十
九證四十一方

帶下

白帶 完帶湯

黃帶 易黃湯

赤帶 清肝止淋湯

血崩

昏暗 固本止崩湯

少婦血崩 固氣湯

結鬱血崩 平肝開鬱止血湯

血海太熱血崩 清海丸

鬼胎

婦人鬼胎 蕩鬼湯
紅花露散

調經

經水先期 水火太旺清經散
火旺水虧兩地湯

經水先後無定期 定經湯

年老經水復行 安老湯

經水未來腹先疼 宣鬱通經湯

經前腹痛吐血 順經湯

青帶 加減逍遙散

黑帶 利火湯

年老血崩 加減當歸補血湯

交感血出 引精止血湯

閃跌血崩 逐瘀止血湯

室女鬼胎 蕩邪散
調正湯

經水後期 溫經攝血湯

經水數月一行 助仙丹

經水忽來忽斷時疼時止 加味四物湯

行經後少腹疼痛 調肝湯

經水將來臍下先疼痛 溫臍化濕湯

經水過多

加減四物湯

經前大便血

順經兩安湯

種子

身瘦不孕

養精種玉湯

下部冰冷不孕

溫胞飲

少腹急迫不孕

寬帶湯

肥胖不孕

加味補中益氣湯

腰痠腹脹不孕

升帶湯

傅青主女科卷下目錄

共三十九條四十一證四十二方二法

妊娠

惡阻

順肝益氣湯

少腹疼

安奠二天湯

吐瀉腹疼

援土固胎湯

跌損

救損安胎湯

子鳴

扶氣止帶湯

中惡

消惡安胎湯

小產

行房不慎

固氣填精湯

經前先洩水

健固湯

年未老經水斷

益經湯

胸滿不思食不孕

并提湯

胸滿少食不孕

溫土毓麟湯

嫉妬不孕

開鬱種玉湯

骨蒸夜熱不孕

清骨滋腎湯

便澀腹脹足浮腫不孕

化水種子湯

浮腫

加減補中益氣湯

口乾咽疼

潤燥安胎湯

子懸脇疼

解鬱湯

胎漏

助氣補漏湯

腰腹疼渴汗燥狂即子狂

息焚安胎湯

多怒墮胎

利氣洩火湯

跌閃

理氣散瘀湯

大便乾結加減四物湯

大怒引氣歸血湯

難產

血虛送子丹

脚手先下轉天湯

子死產門救母丹

正產

胞衣不下送胞湯
補中益氣湯

血暈不語刺心穴法
當歸補血湯
獨參湯

腸下補氣升陽飲
草麻仁提法

產後

少腹疼血瘀散結定瘀湯
血虛腸胃湯

惡寒身顫十全大補湯

血崩救敗求生湯

四肢浮腫轉氣湯

肝痿收膜湯

鬱結乳汁不通通肝生乳湯

新附補遺數條

畏寒腹疼黃耆補氣湯

交骨不開降子湯

氣逆舒氣散

子死腹中療兒散

氣虛血暈補氣解暈湯

敗血攻心暈安心湯

氣喘救脫活母湯

惡心嘔吐溫腎止嘔湯

手傷胞胎淋漓不止完胞飲

肉線出兩收湯

氣血兩虛乳汁不下通乳丹

產後以補氣血為主方用

子懸

產婦氣喘腹痛

血崩方用

產後之陽發狂

胎漏胎動

白帶

產婦嘔吐下痢

產後大喘大汗

打死胎

傅青主女科卷上

白帶下一

婦科一
門最爲
難治不
難於用
辨證也
五帶證
辨之在
明立方
極善倘
用之不
效者必
其人經
水不調
須於調
經種子
二門參
酌治之
無不見
效即如
白帶證
倘服藥
不效其
人必經
水過期
少腹急

夫帶下俱是濕證而以帶名者因帶脈不能約束而有此病故以名之蓋帶脈通於任督任督病而帶脈始病帶脈者所以約束胞胎之系也帶脈無力則難以提繫必然胞胎不固故曰帶弱則胎易墜帶傷則胎不牢然而帶脈之傷非獨跌閃挫氣已也或行房而放縱或飲酒而顛狂雖無疼痛之苦而有暗耗之害則氣不能化經水反變為帶病矣故帶病者惟尼僧寡婦出嫁之女多有之而在室之女則少也況加以脾氣之虛肝氣之鬱濕氣之侵熱氣之逼安得不成帶下之病哉故婦人有終年累月下流白物如涕如唾不能禁止甚則臭穢者所謂白帶也夫白帶乃濕盛而火衰肝鬱而氣弱則脾土受傷濕土之氣下陷是以脾精不守不能化榮血以為經水反變成白滑之物由陰門直下欲自禁而不可得也治法宜大補脾胃之氣稍佐以舒肝之品使風木不閉塞於地中則地氣自升騰於天上脾氣健而濕氣消自無白帶之患矣方用完帶湯 白朮一兩 土炒 山藥一兩 炒 人參二錢 白芍五錢 酒炒 車前子三錢 酒炒 蒼朮三錢 製 甘草一錢 陳皮 五分 黑芥穗 五分 柴胡 六分 水煎服二劑輕四劑止六劑則白帶全愈此方脾胃肝三經同治之法寓補於散之中寄消於升之內開提肝木之氣則肝血不燥何至下尅脾土補益脾土之元則脾氣不濕何難分清水氣至於補脾而兼以補胃者由裏以及表也脾非胃氣之強則脾之弱不能旺是補胃正所以補脾耳

青帶下二

婦人有帶下而色青者甚則綠如菜豆汁稠粘不斷其氣腥臭所謂青帶也夫青帶乃肝經之濕熱肝屬木木色屬青帶下流如菜豆汁明明是肝木之病矣但肝木最喜水潤濕亦水之積似濕非肝木之所惡

追宜服
寬帶湯
餘宜類
參方見
三十三
脾土喜
燥而惡
濕土病
濕則木
必乘之
木又為
濕土之
氣所侮
故肝亦
散道運
極常歸
妙去

按丹元
指本體
而言濕
熱即水
火不所
之氣邪
以為邪
合成者
如淨銀
傾入銀
銅使不
成色
矣真水
氣與
邪混
一則

何以竟成青帶之證不知水為肝木之所喜而濕寔肝木之所惡以濕為土之氣故也以所惡者合之所喜必有違者矣肝之性既違則肝之氣必逆氣欲上升而濕欲下降兩相牽掣以停住於中焦之間而走於帶脈遂從陰器而出其色青綠者正以其乘肝木之氣化也逆輕者熱必輕而色青逆重者熱必重而色綠似乎治青易而治綠難然而均無所難也解肝木之火利膀胱之水則青綠之帶病均去矣方用加減逍遙散 茯苓 五錢 白芍 五錢 甘草 五錢 柴胡 一錢 陳皮 一錢 茵陳 三錢 梔子 三錢 水煎服二劑而色淡四劑而青綠之帶絕不必過劑矣夫逍遙散之立法也乃解肝鬱之藥耳何以治青帶若斯其神與蓋濕熱留於肝經因肝氣之鬱止鬱則必逆逍遙散最能解肝之鬱與逆鬱逆之氣既解則濕熱難留而又益之以茵陳之利濕梔子之清熱肝氣得清而青綠之帶又何自來此方之所以奇而效捷也倘僅以利濕清熱治青帶而置肝氣於不問安有止帶之日哉

黃帶下三

婦人有帶下而色黃者宛如黃芩濃汁其氣腥穢所謂黃帶是也夫黃帶乃任脈之濕熱也任脈本不能容水色氣安得而入而化為黃帶乎不知帶脈橫生通於任脈任脈直上走於唇齒唇齒之間原有不斷之泉下貫於任脈以化精使任脈無熱氣之繞則口中之津液盡化為精以入於腎矣惟有熱邪存於下焦之間則津液不能化精而反化濕也夫濕者土之氣寔水之侵熱者火之氣寔木之生水色本黑火色本紅今濕與熱合欲化紅而不能欲返黑而不得煎熬成汁因變為黃色矣此乃不從水化而從濕化也所以世之人有以黃帶為脾之濕熱單去治脾而不能痊者是不知真水真火合成丹邪元邪繞於任脈胞胎之間而化此黃色也單治脾何能痊乎法宜補任脈之虛而清腎火之炎則庶幾矣方用黃湯 山藥 一兩 芡實 一兩 黃柏 一錢 鹽 車前子 一錢 白果 十枚 水煎連服四劑無不痊愈此不獨治黃

不但侵
矣所以
色變山
藥焚實
尤能清
熱生津
凡帶證
多係脾
濕初病
無熱但
補脾土
兼理氣
其病自
愈若濕
久生熱
必得清
腎火而
已始有
路去方
用黃柏
車前子
妙愈後
病愈後
當節飲
食或辛
熱之物
調養脾
土若恃
有此方
病發即
元氣矣
慎之

帶方也凡有帶病者均可治之而治帶之黃者功更奇也蓋山藥焚實專補任脈之虛又能利水如白果引入任脈之中更為便捷所以奏功之速也至於用黃柏清腎中之火也腎與任脈相通以相濟解腎中之火即解任脈之熱矣

黑帶下四

婦人有帶下而色黑者甚則如黑豆汁其氣亦腥所謂黑帶也夫黑帶者乃火熱之極也或疑火色本紅何以成黑謂為下寒之極或有之殊不知火極似水乃假象也其證必腹中疼痛小便時如刀刺陰門必發腫面色必發紅日久必黃瘦飲食必兼人口中必熱渴飲以涼水少覺寬快此胃火太旺與命門腰脫三焦之火合而熬煎所以熬乾而變為炭色斷是火熱之極之變而非少有寒氣也此等之證不至發狂者全賴腎水與肺金無病其生生不息之氣潤心濟胃以救之耳所以但成黑帶之證是火結於下而不炎於上也治法惟以洩火為主火熱退而濕自除矣方用利火湯 大黃 三錢 白木 五錢 茯苓 三錢 車前子 三錢 黃連 三錢 梔子 三錢 知母 二錢 王不留行 三錢 石膏 五錢 劉寄奴 三錢 水煎服一劑小便疼止而通利二劑黑帶變為白三劑白亦少減再三劑全愈矣或謂此方過於迅利殊不知火盛之時用不得依違之法譬如救火之焚而少為遲緩則火勢延燃不盡不止今用黃連石膏梔子知母一派寒涼之品入於大黃之中則迅速掃除而又得王不留行與劉寄奴之利濕甚急則濕與熱俱無停住之機佐白木以輔土茯苓以滲濕車前以利水則火退水進便成既濟之卦矣

赤帶下五

婦人有帶下而色紅者似血非血淋漓不斷所謂赤帶也夫赤帶亦濕病濕是土之氣宜見黃白之色令不見黃白而見赤者火熱故也火色赤故帶下亦赤耳惟是帶脈繫於腰臍之間近乎至陰之地不宜有

若血崩
數日血
下數斗
六脈俱

血崩昏暗六

婦人有一時血崩兩目黑暗昏暈在地不省人事者人莫不謂火盛動血也然此火非寔火乃虛火耳世人一見血崩往往用止澀之品雖亦能取效於一時但不用補陰之藥則虛火易於冲擊恐隨止隨發以致經年累月不能全愈者有之是止崩之藥不可獨用必須於補陰之中行止崩之法方用固本止崩湯大熟地一兩白朮一兩黃耆三錢當歸五錢酒洗黑薑二錢人參三錢水煎服一劑崩止十劑不再發倘畏藥味之重而減半則力薄而不能止方妙在全不去止血而惟補血又不止補血而更補氣非

無鼻中
微不可
息服此
遂恐氣
方脫不
將受峻
補也
力者用
遠人參
三錢煎
成沖服
衆炭末
一錢服
之待氣
息微旺
然後服
此方仍
加費衆
炭末一
錢無不
見效無
力者用
無反黃
酒沖服
衆炭末
三錢服
之待其
氣接神
清始可
服此方
人參以
衆炭末
亦加費
衆炭末

惟補氣而更補火蓋血崩而至於黑暗昏暈則血已盡去僅存一線之氣以為護持若不急補其氣以生血而先補其血而遺氣則有形之血恐不能遽生而無形之氣必且至盡散此所以不先補血而先補氣也然單補氣則血又不易生單補血而不補火則血又必凝滯而不能隨氣而速生況黑薑引血歸經是補中又有收斂之妙所以同補氣補血之藥並用之耳

年老血崩

婦人有年老血崩者其證亦與前血崩昏暗者同人以為老婦之虛耳誰知是不慎房幃之故乎夫婦人至五十歲之外天癸置之原宜閉關守塞不宜出陣戰爭苟或適興不過草草了事尚不至腎火大動倘興酣浪戰亦如少年之好合鮮不血室大開崩決而墜矣方用加減當歸補血湯當歸一兩黃耆一兩酒洗三七根末三錢桑葉十四片水煎服二劑而血少止四劑不再發然必須斷慾始除根若再犯色慾未有不重病者也夫補血湯乃氣血兩補之神劑三七根乃止血之聖藥加入桑葉者所以滋腎之陰又有收斂之妙耳但老婦陰精既虧用此方以止其暫時之漏寔有奇功而不可責其永遠之績者以補精之味尚少也服此四劑後再增入白朮五錢熟地一兩山藥四錢麥冬三錢北五味一錢服百劑則崩漏之根可盡除矣

少婦血崩

有少婦甫娠三月即使血崩而胎亦隨墜人以為挫閃受傷而致誰知是行房不慎之過哉夫少婦行房亦事之常耳何便血崩蓋因元氣衰弱事難兩顧一經行房洩精則妊娠無所依養遂致崩而且墜凡婦人之氣衰即不耐久戰若貪歡久戰則必洩精太甚氣每不能攝夫血矣况氣弱而又娠再加以久戰內外之氣皆動而血又何能固哉其崩而墜也亦無怪其然也治法自當以補氣為主而少佐以補血之品

一錢沖
入亦有
婦年
老血崩
者必係
氣沖血
室原方
加杭芍
炭三錢
貫衆炭
三錢
狂娠宜
避房事
不避者
縱幸不
致崩往
往墮胎
胎生不
亦難養
慎之戒

欲種子
者必待
落紅後
即三十
時辰雨
日半也
經來之
時數足
三十時
辰便可
入房一
日男二

斯為得之方用固氣湯 人參一兩 白朮五錢 大熟地五錢 當歸三錢 白茯苓二錢 甘草一錢 杜仲三錢
山萸肉二錢 遠志一錢 五味子十粒 水煎服 一劑而血止連服十劑全愈此方固氣而兼補血已
去之血可以速生將脫之血可以盡攝凡氣虛而崩漏者此方最可通治非僅治小產之崩其最妙者
不去止血而止血之味含於補氣之中也

交感血出九

婦人有一交合則流血不止者雖不至於血崩之甚而終年累月不得愈未免血氣兩傷久則恐有血枯
經閉之憂此等之病成於經水正來之時貪歡交合精冲血管也夫精冲血管不過一時之傷精出宜愈
何以久而流紅不知血管最嬌嫩斷不可以精傷凡婦人受孕必於血管已淨之時方保無虞倘經水正
旺彼欲湧出而精射之則欲出之血反退而縮入既不能受精而成胎勢必至集精而化血交感之際淫
氣觸動其舊日之精則兩相感召舊精欲出而血亦隨之而出治法須通其胞胎之氣引舊日之集精外
出而益之以補氣補精之藥則血管之傷可以補完矣方用引精止血湯 人參五錢 白朮一兩 茯苓三錢
去熟地一兩 芥穗三錢 黑薑一錢 黃柏五分 山萸肉五錢 車前子五錢 水煎連服四劑愈于劑不再
發此方用參朮以補氣用地萸以補精精氣既旺則血管流通加入茯苓車前以利水與竅水利則血
管亦利又加黃柏為引直入血管之中而引風精出於血管之外芥穗引敗血出於血管之內黑薑以
止血管之口一方之中是有調停曲折之妙故能祛舊病而除陳痼然必須慎房幃三月破者始不至
重傷而補者始不至重損否則不過取目前之效耳其慎之哉宜寡慾

鬱結血崩十

婦人有懷抱其鬱口乾古渴嘔吐吞酸而血下崩者人皆以火治之時而效時而不效其故何也是不識

日女三 日女四 日女五 日女六 日女七 日女八 日女九 日女十 日女十一 日女十二 日女十三 日女十四 日女十五 日女十六 日女十七 日女十八 日女十九 日女二十 日女二十一 日女二十二 日女二十三 日女二十四 日女二十五 日女二十六 日女二十七 日女二十八 日女二十九 日女三十 日女三十一 日女三十二 日女三十三 日女三十四 日女三十五 日女三十六 日女三十七 日女三十八 日女三十九 日女四十 日女四十一 日女四十二 日女四十三 日女四十四 日女四十五 日女四十六 日女四十七 日女四十八 日女四十九 日女五十 日女五十一 日女五十二 日女五十三 日女五十四 日女五十五 日女五十六 日女五十七 日女五十八 日女五十九 日女六十 日女六十一 日女六十二 日女六十三 日女六十四 日女六十五 日女六十六 日女六十七 日女六十八 日女六十九 日女七十 日女七十一 日女七十二 日女七十三 日女七十四 日女七十五 日女七十六 日女七十七 日女七十八 日女七十九 日女八十 日女八十一 日女八十二 日女八十三 日女八十四 日女八十五 日女八十六 日女八十七 日女八十八 日女八十九 日女九十 日女九十一 日女九十二 日女九十三 日女九十四 日女九十五 日女九十六 日女九十七 日女九十八 日女九十九 日女一百

凡跌打 損傷致 吐血嘔 血皆宜 如此治 法若血 聚胃中 宜加川 厚朴一 錢半薑 汁炒

為肝氣之鬱結也夫肝主藏血氣結而血亦結何以反致崩漏蓋肝之性急氣結則其急更甚更急則血不能藏故崩不免也治法宜以開鬱為主若徒開其鬱而不知平肝則肝氣大開肝火更熾而血亦不能止矣方用平肝開鬱止血湯 白芍醋炒 白朮土炒 當歸酒洗 丹皮 三錢 生地酒炒 甘草 二錢 三七根三錢 研黑芥穗 二錢 柴胡 一錢 水煎服 一劑嘔吐止二劑乾渴除四劑血崩愈方中妙在白芍之平肝柴胡之開鬱白朮利腰膈則血無積住之虞荆芥通經絡則血有歸還之樂丹皮又清骨髓之熱生地復清臟腑之炎當歸三七於補血之中以行止血之法自然鬱結散而血崩止矣

閃跌血崩十一

婦人有升高墜或閃挫受傷以致惡血下流有如血崩之狀者若以崩治非徒無益而又害之也蓋此證之狀必手按之而疼痛久之則面色痿黃形容枯槁乃是瘀血作祟並非血崩可比倘不知解瘀而用補澀則瘀血內攻瘀無止時反致新血不得生舊血無所化死不能悟豈不可傷哉治法須行血以去瘀活血以止疼則血自止而愈矣方用逐瘀止血湯 生地酒炒 大黃 三錢 赤芍 三錢 丹皮 一錢 枳殼炒 當歸尾 五錢 龜板 三錢 桃仁 十粒炒研 水煎服 一劑疼輕二劑疼止三劑血亦全止不必再服矣此方之妙妙於活血之中佐以下滯之品故逐瘀如掃而止血如神或疑跌閃升墜是由外而傷內雖不比內傷之重而既已血崩則內之所傷亦不為輕何以只治其瘀而不顧氣也殊不知升墜閃跌非由內傷以及外傷者可比蓋本寔不撥去其標病可耳故曰急則治其標

血海太熱血崩十二

婦人有每行人道經水即來一如血崩人以為胞胎有傷觸之以動其血也誰知是子宮血海因太熱而不固乎夫子宮即在胞胎之下而血海又在胞胎之上血海者衝脈也衝脈太寒而血即虧衝脈太熱而

凡血崩
證最宜
絕慾避
房無奈
少年人
彼此貪
歡故服
藥往往
不效若
三月後
崩正病
愈而房
事仍無
節制病
必復作
久則成
勞慎之

鬼崇之
事儒者
弗道然
城市鄉
曲往往
有是證
不可不
察其勿
以此言
為荒唐

血即沸血崩之為病正衝脈之太熱也然既由衝脈之熱則應當崩而無有止時何以行人道而始來果與肝木無恙耶夫脾健則能攝血肝平則能藏血人未入房之時君相二火寂然不動雖衝脈獨熱而血亦不至外馳及有人道之感則子宮大開君相火動以熱招熱同氣相求翕然齊動以鼓其精房血海泛濫有不能止遏之勢肝欲藏之而不能脾欲攝之而不得故經水隨交感而至若有聲應之捷是惟火之為病也治法必須滋陰降火以清血海而和子宮則終身之病可半載而除矣然必絕慾三月而後方可方用清海丸 大熟地一斤 山萸十兩 山藥十兩 麥冬肉十兩 北五味二兩 丹皮十兩 白朮一斤 白芍一斤 地骨皮十兩 龍骨二兩 元參一斤 乾桑葉一斤 沙參 石斛各十兩 右十四味各為細末合一處煉蜜丸桐子大早晚每服五錢白滾水送下半載全愈此方補陰而無浮動之慮縮血而無寒涼之苦日計不足月計有餘潛移默奪子宮清涼而血海自固倘不揣其本而齊其末徒以髮灰白礬黃連炭五倍子等藥末以外治其幽隱之處尤恐愈澀而愈流終必至於敗亡也可不慎與

鬼胎 十三

婦人有腹似懷妊終年不產甚至二三年不生者此鬼胎也其人必面色黃瘦肌膚消瘦腹大如斗厥所由來必素與鬼交或入神廟而興雲雨之恩或遊山林而起交感之念皆能召祟成胎幸其人不至浮蕩見祟而有驚惶遇合而生愧惡則鬼祟不能久戀一交媾即遠去然淫妖之氣已結於腹遂成鬼胎其先尚未覺迨後漸漸腹大經水不行內外相包一如懷胎之狀有似血臟之形其寔是鬼胎而非臟也治法必須以逐穢為主然人至懷胎數年不產即非鬼胎亦必氣血衰微況此非真妊則邪氣必旺正不敵邪其虛弱之狀必有可掬焉可純用迅利之藥以祛蕩乎必於補中逐之為的也方用蕩鬼湯 人參 當歸 大黃 各一川牛膝 雷丸 紅花 丹皮 各三 枳壳 厚朴 各一 小桃仁 三十 水煎服 一劑

此方陰
臨大矣
見有因
此病蓋
情而臨
於非命
勞瘵而
傷於妙
年深為
可惜若
服此方
不應宜
服此方
平胃散
無不見
效愈後
宜調養
飲血節
桂去粗
皮一錢
麝香

腹必大鳴可瀉惡物半桶再服一劑又瀉惡物而愈矣斷不可復用三劑也蓋雖補中用逐未免迅利
多用恐傷損元氣此方用雷丸以祛穢又得大黃之掃除且佐以厚朴紅花桃仁等味皆善行善攻之
品何邪之尚能留腹中而不盡逐下也哉尤妙在用參歸以補氣血則邪去而不正不傷若單用雷丸大
黃以迅下之必有氣脫血崩之患矣倘或知是鬼胎如室女寡婦輩邪氣雖盛而真氣未滿可用岐天
師新傳紅花霹靂散 紅花 半斤 大黃 五兩 雷丸 三兩 水煎服 亦能下胎然未免太於迅利過傷
氣血不若蕩鬼湯之有益無損為愈也在人臨證時斟酌而善用之耳

室女鬼胎 十四

女子有在室未嫁月經忽斷腹大如妊面色乍赤乍白六脈乍大乍小以為血結經閉也誰知是靈鬼
憑身乎夫人之身正則諸邪不敢侵其身不正則諸邪自來犯或精神恍惚而夢裏求親或眼目昏花而
對面相狎或假託親屬而暗處貪歡或明言仙人而靜地取樂其始則驚詫為奇遇而不肯告人其後則
羞赧為淫褻而不敢告人日久年深腹大如斗有如懷妊之狀一身之精血僅足以供腹中之邪則邪日
旺而正日衰勢必至經閉而血枯後雖欲導其經而邪據其腹則經亦難通欲生其血而邪食其精則血
寔難長醫以為胎而寔非真胎又以為癥而亦非癥病往往因循等待非因羞憤而亡其身即成勞瘵而
終不起至死不悟不重可悲哉治法似宜補正以祛邪然邪不先去補正亦無益也必須先祛邪而後補
正斯為得之方用蕩邪散 雷丸 六錢 桃仁 六十粒 當歸 一兩 丹皮 一兩 甘草 四錢 水煎服 一劑必下
惡物半桶再服調正湯治之 白朮 五錢 蒼朮 五錢 茯苓 三錢 陳皮 貝母 各一錢 薏米 五錢 水連煎
服四劑則脾胃之氣轉而經水漸行矣前方蕩邪後方補正實有次第或疑身懷鬼胎必大傷其血所
以經閉今既墜其鬼胎矣自當大補其血乃不補血而反補胃氣何故蓋鬼胎中人其正氣大虛可知

一錢以上二錢
 味共研
 細末開
 水為丸
 如桐子
 大空心
 開水服
 服後半
 日時煎
 平胃散
 一劑服
 之米泔
 米泔
 炒三錢
 厚朴
 二錢姜
 汁炒
 廣皮一
 錢枳實
 二錢土
 炒全
 當歸三
 錢酒洗
 一錢川
 洗服後
 必下惡
 物若不
 見下惡
 物次日
 再服平
 胃散不
 服桂香
 婦科調
 經尤難

氣虛則血必不能驟生欲補血必先補氣是補氣而血自然生也用二朮以補胃陽陽氣旺則陰氣難
 犯尤善後之妙法也倘重用補陰之品則以陰招陰吾恐鬼胎雖下而鬼氣未必不再侵故必以補陽
 為上策而血自隨氣而生也

調經經水先期十五

婦人有先期經來者其經甚多人以為血熱之極也誰知是腎中水火太旺乎夫火太旺則血熱水太旺
 則血多此有餘之病非不足之證也似宜不藥有喜但過於有餘則子宮太熱亦難受孕更恐有燥乾男
 精之慮過者損之謂非既濟之道乎然而火不可任其有餘而水斷不可使之不足治之法但少清其熱
 不必洩其水也方用清經散丹皮三錢地骨皮五錢白芍三錢大熟地二錢青蒿二錢白茯苓一錢黃
 柏五分鹽水煎服二劑而火自平此方雖是清火之品然仍是滋水之味火洩而水不與俱洩損
 而益也

又有先期經來只一二點者人以為血熱之極也誰知是腎中火旺而陰水虧乎夫同是先期之來何分
 虛實之異蓋婦人之經最難調苟不分別細微用藥鮮克有效先期者火氣之冲多寡者水氣之驗故先
 期而來多者火熱而水有餘也先期而來少者火熱而水不足也倘一見先期之來俱以為有餘之熱但
 洩火而不補水或水火兩洩之有不更增其病者乎治之法不必洩火只專補水水既足而火自消矣亦
 既濟之道也方用兩地湯大生地酒炒兩元參一兩白芍藥酒炒五錢麥冬肉五錢地骨皮阿膠各三錢水煎
 服四劑而經調矣此方之用地骨皮生地能清骨中之熱骨中之熱由於腎經之熱清其骨髓則腎
 氣自清而又不損傷胃氣此治之巧也況所用諸藥又純是補水之味水盛而火自平理也此條與上
 條參觀斷無誤治先期之病矣