

金匱懸解

三

金匱懸解卷十三

內傷雜病

昌邑黃元御撰

嘔吐噦下利

嘔噦者陽明胃病也下利者太陰脾病也胃以下行為順胃氣上逆則為嘔噦脾以上行為順脾氣下陷則為下利總以中氣之不治也中氣者升降脾胃之樞機樞機不利則升降失職而吐利乃作此中多挾木邪以木鬱則尅土甲木逆於上則胃氣逆而為吐乙木賊於下則脾氣陷而為利補土疏木乃吐利之定法土旺而木達膽胃降則嘔止肝脾升則利止矣

嘔吐一

問曰病人脈數數爲熱當消穀引飲而反吐者何也師曰以發其汗令陽氣微膈氣虛脈乃數數爲客熱不能消穀胃中虛冷故也

此段見傷寒太陽篇汗多亡陽濁氣上逆是以嘔吐陽不歸根客居膈上息道短促是以脈數膈上雖熱胃中則身虛冷虛冷則水穀不消而病嘔吐也

嘔吐二

跌陽脈浮而濇浮則爲虛虛則傷脾脾傷則不磨朝食暮吐暮食朝吐宿穀不化名曰胃反脈濇而濇其病難治

跌陽者陽明胃氣之所變現也動脈在足趺上之衝陽故口
跌陽陽明胃氣以下行爲順脈不應見浮緊浮則胃氣之虛
而不降也胃虛而上逆則脾虛而下陷陷則脾傷脾傷不能
磨化水穀故朝食而暮吐暮食而朝吐宿穀不化名曰胃反
胃反者飲食倒上是反順而爲逆也緊瀉者血寒而陽陷也
脾敗不磨脈見緊瀉水冰地圻微陽淪敗陷而不升故爲難

治

嘔吐三

脈弦者虛也胃氣無餘朝食暮吐變爲胃反寒在於上醫反下
之令脈反弦故名曰虛

肝膽脈弦弦者木鬱尅土胃易之虛也胃氣無餘不能消穀
朝食暮吐變爲反胃宗氣衰微寒在於上醫反下之令土敗
木賊脈反見弦故名曰虛也

嘔吐四

寸口脈微而數微則無氣無氣則營虛營虛則血不足血不足
則胸中冷

寸口者手太陰肺氣所變現也肺主氣寸口脈微而數者肺
中宗氣之虛也水穀之化營氣行於經絡其大氣之搏而不
行者積於胸中命曰宗氣宗氣者所以貫心肺而行呼吸營
氣之原也無宗氣則營氣虛營虛則血不足宗氣之根實本

於營而血藏於肝而血中之溫氣則化君火氣乃君火之降
斂者也營虛血少不能化火陽衰於上故胸中冷血陰也而
孕君火其性溫煖和煦後世但言涼血而不知煖血誤人多
矣

嘔吐五

先嘔却渴者此爲欲解先渴却嘔者爲水停心下此屬飲家嘔
家本渴今反不渴者心下有支飲故也此屬支飲

先嘔而後渴者積飲旣去而津亡作渴故爲欲解先渴而後
嘔者爲水停心下阻隔君火是以作渴渴而飲水爲停水所
阻乃復吐出此屬素有積飲之家也嘔家津液失亡本當發

金匱要略 卷十三
渴今嘔後反不渴者以心下有支飲停畱所嘔者但是新下之水故也此屬支飲此段見痰飲咳嗽中

嘔吐六

病人欲吐者不可下之

病人欲吐者陳宿在上故不可下

嘔吐七

嘔家有癰膿不可治嘔膿盡自愈

此段見傷寒厥陰嘔家而有癰膿當令其膿從嘔去不可降逆止嘔使膿無出路俟其膿盡癰平則嘔吐自愈矣

噦八

噦而腹滿視其前後知何部不利利之則愈

此段見傷寒陽明濁氣上逆則生嘔噦噦而腹滿者太陰之清氣不升陽明之濁氣不降也前後二陰必有不利之部前部不利利其水道後部不利利其穀道前後竅通濁氣下降則滿消而噦止矣

嘔吐丸

胃反嘔吐者大半夏湯主之

胃反嘔吐者前竅短澁後門乾燥多有糞若羊矢之證益手足太陽兩經同氣水穀入胃脾陽消磨散其精華上歸於肺霧氣化津傳於膀胱太陽水道清通穀道滋潤是以小便不

瀆大便不乾胃反氣逆肺金莫降津液凝瘀化生痰涎二陰
失滋枯澁燥結故糞若羊矢下竅堵塞濁氣莫泄逆而上衝
故嘔吐不止緣其陽衰土濕中氣頹敗不能腐熟水穀化氣
生津以滋腸胃下竅是以飲食不得順下而逆行也大半夏
湯人參補中氣之虛白蜜潤小腸之燥半夏降胃氣之逆中
氣旺而水穀消下竅開而渣滓降濁氣不升嘔吐自止陰陽
別論三陽結謂之膈手足太陽是謂三陽足太陽膀胱結則
小便瀆手太陽小腸結則大便乾下竅瀆結濁氣上逆故食
隔而不下總由陽明之陽虛噎膈與反胃頗同反胃之病在
胃之下脘噎膈之病兼在胃之上脘上脘氣閉則食不能入

下腕氣閉則入而復出陽明之性陽盛則開陰盛則閉故也

大半夏湯

七十

半夏

洗二斤

白蜜

一斤

人參

三兩

右三味以水一斗二升和蜜揚之二百四十遍煮取三升半溫服一升餘分再服

嘔吐十

胃反吐而渴欲飲水者茯苓澤瀉湯主之

胃反嘔吐而渴欲飲水者濕盛胃逆而火不根水也以戊土

上逆降路瘀塞君相二火不得下蟄逆刑辛金是以渴生茯苓

澤瀉湯茯苓澤瀉桂枝疏木而泄水姜甘白朮降逆而燥上也

茯苓澤瀉湯 七十一

茯苓

八兩

澤瀉

四兩

桂枝

二兩

生姜

四兩

甘草

二兩

白朮

三兩

右六味以水一斗煮取三升內澤瀉再煮取二升半溫服
八合日三服

嘔吐十一

吐後渴欲得水而貪飲者文蛤湯主之

吐後渴欲得水而貪飲者吐傷胃氣濕動肺逆鬱生上熱表
裏無降泄之路文蛤湯甘草大棗補土而益脾結石膏文蛤
清金而泄濕熱杏姜利氣而降逆麻黃發表而達鬱也

文蛤湯 七十二

文蛤

五兩

麻黃

三兩

生姜

三兩

石膏

五兩

甘草

二兩

大棗

十二枚

杏仁

五十枚

右七味以水六升煮取二升溫服一升汗出即愈

嘔吐十二

嘔吐而病在膈上後思水者解急與之思水者猪苓散主之
病在膈上嘔吐之後而思水飲是病去而津亡也其病當解
宜急與之水以益津液思水者痰飲雖去而土濕猶在渴欲
飲水恐其復致停癰猪苓散二苓白朮泄濕而燥土最爲相
宜也

猪苓散

七十三

猪苓

茯苓

白朮

等分

右三味杵爲散飲服方寸匕日三服

嘔吐十三

食已卽吐者大黃甘草湯主之

食已卽吐者胃之上口必有濕熱瘀塞大黃甘草湯大黃泄其鬱熱甘草補其中氣也

大黃甘草湯

七十四

大黃

四兩

甘草

一兩

右二味以水三升煮取一升分溫再服

嘔吐十四

嘔而脈弱小便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

此段見傷寒厥陰嘔而脈弱胃氣之虛小便復利腎氣之虛

腎司二便寒則膀胱失約故小便白利裏陽虛敗加以身熱而見厥逆者陰盛

於內而微陽外格故爲難治宜四逆湯以回裏陽也

四逆湯 七十五

甘草 二兩 乾薑 兩半 附子 一枚
炙 生用

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服強人可

大附子一枚乾薑三兩

嘔吐十五

諸嘔吐穀不得下者小半夏湯主之

方見痰飲

嘔吐而穀不得下者胃氣上逆濁陰不降也小半夏湯半夏生薑降逆氣而驅濁陰也

嘔吐十六

嘔而發熱者小柴胡湯主之

此段見傷寒少陽嘔者膽木之迫胃土甲木從相火化氣相火鬱升是以發熱小柴胡湯參甘大棗補胃土而益中氣柴胡黃芩疏甲木而清相火生薑半夏降濁而止嘔也

小柴胡湯

七十一

柴胡

八兩

黃芩

三兩

半夏

半斤

生薑

三兩

人參

三兩

甘草 三兩 大棗 一枚

右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升日三服

嘔吐十七

嘔而腸鳴心下痞者半夏瀉心湯主之

寒邪衝激則腸中雷鳴膽胃升鬱則心下痞硬心痞則火無降路必生上熱半夏瀉心湯黃芩黃連清上而泄火姜甘參棗溫中而補土半夏降逆而止嘔也

半夏瀉心湯 七十七

半夏 八兩 黃芩 三兩 黃連 一兩 乾姜 三兩 人參 三兩

洗

嘔吐噦

甘草

三兩

大棗

十二枚

右七味以水一斗煮取六升去滓再煮取三升溫服一升

日三服

嘔吐十八

嘔而胸滿者吳茱萸湯主之

嘔而胸滿者中氣虛寒膽胃泛升濁陰逆填塞於膈上也吳茱萸湯人參大棗補中而培土茱萸生姜溫胃而降逆也

吳茱萸湯

吳茱萸

一升

人參

三兩

大棗

十二枚

生姜

六兩

右四味以水五升煮取三升溫服七合日三服