



景岳全書卷之十二

雜證

謨

會稽 張介賓

會卿著

會稽 魯走

謙菴訂

風痺

經義

痺論曰風塞濕二氣雜至合而爲痺也其風氣勝者爲行痺寒氣勝者爲痛痺濕氣勝者爲著痺○帝曰具有五者何也岐伯曰以冬遇此爲骨痺以春遇此爲筋痺以夏遇此爲脉痺以至陰遇此爲肌痺以秋遇此爲皮痺○帝曰內舍五臟六腑何氣使然岐伯曰五臟皆有合病久而不去者內舍於其合也故骨痺不已復感於邪內舍於腎筋痺不已復感於邪內舍於肝脉痺不已復感於邪內舍於心肌痺不已復感於邪

邪內舍於脾皮痺不已復感於邪內舍於肺所謂痺者各以其時重感於風寒濕之氣也

痺論曰凡脾之各五臟者肺痺者煩滿喘而嘔○心痺者脉不通煩則心下鼓暴上氣而喘嗌乾善噫厥氣上則恐○肝痺者夜臥則驚多飲數小便上爲引如懶○腎痺者善脹尻以代踵脊以代頭○脾痛者四肢懈惰發欬嘔汁上爲大塞○腸痺者數飲而出不得中氣喘爭時發飧泄○胞痺者小腹膀胱按之內痛若沃以湯灌於小便上爲清涕○陰氣者靜則神藏躁則消亡飲食自倍腸胃乃傷淫氣喘息痺聚在肺淫氣憂思痺聚在心淫氣遺溺痺聚在腎淫氣乏竭痺聚在肝淫氣肌絕痺聚在脾諸痺不已亦益內也其風氣勝者其人易已也

呻論帝曰痺其時有死者或疼久者或易已者其故何也岐伯

曰其入臟者死其留連筋骨間者疼久其留皮膚間者易昌
○帝曰其客於六腑者何也曰此亦其飲食居處爲其病本
也六腑亦各有俞風寒濕氣中其俞而食飲應之循俞而入
各舍其腑也○帝曰痺或痛或不痛或不仁或寒或熱或燥
或濕其故何也曰痛者寒氣多也有寒故痛也其不痛不仁
者病久入深營衛之行濶經絡時踈故不痛皮膚不營故爲
不仁其寒者陽氣少陰氣多與病相益故寒也其熱者陽氣
多陰氣少病氣勝陽遭陰故爲痺熱其多汗而濡者此其逢
濕甚也陽氣少陰氣盛兩氣相感故汗出而濡也○帝曰夫
痺之爲病不痛何也曰痺在於骨則重在於脉則血凝而不
流在於筋則屈不伸在於肉則不仁在於皮則寒故且此五
者則不痛也凡痺之類逢寒則急逢熱則縱帝曰善

周痺篇帝曰願聞衆痺岐伯曰此各在其處更發更止更居更

起以右應左以左應右非能周也更發更休也刺此者痛雖已止必刺其處勿令復起○帝曰願聞周痺何如曰周痺者在於血脉之中隨脈以上隨脈以下不能左右各當其所帝曰刺此奈何曰痛從上下者先刺其下以過之後刺其上以脫之痛從下上者先刺其上以過之後刺其下以厭之○帝曰此痛安生何因而有名曰風寒濕氣客於外分肉之間迫切而爲沫沫得寒則聚聚則排分肉而分裂也分裂則痛痛則神歸之神歸之則熱熱則痛解痛解則厥厥則他痺發發則如是此內不在臟而外未發於皮獨居分肉之間真氣不能周故命曰周痺

長刺節論曰病在筋筋攀節痛不可以行名曰筋痺○病在肌膚肌膚盡痛名曰肌痺傷於寒濕○病在骨骨重不可舉骨髓酸痛寒氣至名曰骨痺

壽夭剛柔篇曰病在陽者命曰風病在陰者命曰痺陰陽俱病
命曰風痺病有形而不痛者陽之類也無形而痛者陰之類
也無形而痛者其陽完而陰傷之也急治其陰無攻其陽有
形而不痛者其陰完而陽傷之也急治其陽無攻其陰陽有
俱動乍有形乍無形加以煥心命曰陰勝其陽此謂不表不
裏其形不久

五邪篇曰邪在腎則病骨痛陰痺陰痺者按之而不得腹脹腰
痛大便難肩背頸項痛時眩取之湧泉崑崙視有血者盡取
之

五臟生成篇曰臥出而風吹之血凝於膚者爲痺凝於脉者爲
泣凝於足者爲厥此二者血行而不得反其空故爲痺厥也
脈要精微論曰按之至骨脉氣少者腰脊痛而身有痺也
九鍼論曰八風傷人內舍於骨解腰脊節腠理之間爲濶痺也

故爲治鍼必長其身鋒其末可以取深邪遠痺

四時氣篇曰著痺不去久寒

不已卒取其三里

主機真藏論曰風寒客於人

使人毫毛畢直皮膚閉而爲熱當

是之時可汗而發也弗治

病人舍於肺名曰肺痺發於上氣

○弗治肺卽傳而行之肝

病名曰肝痺一名曰厥脇痛出食

當是之時可按若刺宜

五臟生成論曰赤脉之至也

喘而堅診曰有積氣在中時害於

食名曰心痺得之外疾思

慮而心虛故邪從之○白脉之至

也喘而浮上虛下實驚有

積氣在胸中喘而虛名曰肺痺寒

熱得之醉而使內也○青

脈之至也長而左右彈有積氣在

心下支胠名曰肝痺得之

寒濕與疝同法腰痛足清頭痛○

黃脉之至也大而虛有積

氣在腹中有厥氣名曰厥疝女子

同法得之疾使四支汗出

當風○黑脉之至也上堅而大有

積氣在小腹與陰名曰腎 瘡得之沐浴清水而臥
逆調論帝曰人身非衣寒也 中非有寒氣也 寒從中生者何岐
伯曰是人多痺氣也陽氣少陰氣多故身寒如從水中出
一水不能勝二火故不能凍慄病名曰骨痺 詳寒熱門

論證 共二條

風痺一證卽今人所謂痛風也蓋痺者閉也以血氣爲邪所閉
不得通行而病也如痺論曰風氣勝者爲行痺蓋風者善行
數變故其爲痺則走注歷節無有定所是爲行痺此陽邪也
曰寒氣勝者爲痛痺以血氣受寒則凝而留聚聚則爲痛是
爲痛痺此陰邪也曰濕氣勝者爲著痺以血氣受濕則濡滯
濡滯則肢體沉重而疼痛頑木留著不移是爲著痺亦陰邪
也凡此三者卽痺之大則也此外如五臟六腑之痺則雖以
飲食居處皆能致之然必重感於邪而內連臟氣則合而爲

痺矣若欲辨其輕重則在皮膚者輕在筋骨者甚在臟腑者更甚若欲辨其寒熱則多熱者方是陽證無熱者便是陰證然痺本陰邪故惟寒者多而熱者少此則不可不察

觀痺論曰風寒濕三氣雜至

合而爲痺而壽夭剛柔篇又曰在

陽者命曰風在陰者命曰

痺何也蓋三氣之合乃尊古痺證

之所因也曰在陽爲風在陰爲痺又分言表裏之有殊也如

風之與痺本皆由感邪所致但外有表證之見而見發熱頭

疼等證或得汗卽解者是皆有形之謂此以陽邪在陽分是

卽傷寒中風之屬也故病在陽者命曰風若旣受寒邪而初

無發熱頭疼又無變證或有汗或無汗而筋骨之痛如故及

延綿久不能愈而外無表證之見者是皆無形之謂此以陰

邪直走陰分卽諸痺之屬也故病在陰者命曰痺其或旣有

表證而疼痛又不能愈此

曰半表半裏陰陽俱病之證故陰

陽俱病者命曰風痺此所以風病在陽而痺病在陰也然則諸痺者皆在陰分亦總由真陰衰弱精血虧損故三氣得以乘之而爲此諸證經曰邪入於陰則痺正謂此也是以治痺之法最宜峻補真陰使血氣流行則寒邪隨去若過用風濕痰滯等藥而再傷陰氣必反增其病矣

風痺治法 共五條

痺因外邪病本在經而濁則連臟故其在上則有喘嘔有吐食在中則爲脹滿爲疼痛在下則爲飧泄爲秘結諸病此皆風痺之兼證也凡見此者當於各門權其緩急先後而隨證治之

一痺證之風勝者治當從散宜敗毒散烏藥順氣散之類主之○若以風勝而兼微火者宜大秦艽湯或九味羌活湯之類主之

一痺證之寒勝者但察其表裏俱無熱證卽當從溫治之宜五
積散或小續命湯甘草附子湯之類主之○若寒甚氣虛者
宜三因附子湯之類主之

痺證之濕勝者其體必重或多寒或多痰或多汗皆脾弱陰
寒證也○若羌活勝濕湯乃兼風散濕之劑也○五積散乃
溫經散濕之劑也○真武湯乃溫中除濕之劑也○三因附
子湯乃補脾燥濕之劑也○調氣平胃散乃行氣行濕之劑
也○五苓散乃利水導濕之劑也○二陳湯六君子湯乃化
痰去濕之劑也○大抵治濕者欲其燥欲燥者宜從緩蓋脾
土喜燥而惡濕喜緩而惡寒故溫脾卽所以治濕也○然又
有濕熱之爲病者必見內熱之證消數之脉方可治以清涼
宣二妙散及加味二妙九當歸拈痛湯之類主之其有熱甚
者如抽新飲之類亦可暫用先清其火而後調其氣血

風痺之證大抵因虛者多因寒者多惟血氣不充故風寒得以入之惟陰邪留滯故經脈爲之不利此痛痺之大端也惟三氣飲及大防風湯之類方能奏效凡治痺之法惟此爲最其有宜酒者卽以三氣飲浸酒服之亦妙法見本方或用易老天麻丸亦可

歷節風痛

歷節風痛以其痛無定所卽行痺之屬也病源云歷節風痛是氣血本虛或因飲酒腠理開汗出當風所致或因勞倦調護不謹以致三氣之邪偏歷關節與氣血相搏而疼痛非常或如虎之咬故又有白虎歷節之名中臟經曰歷節疼痛者因醉犯房而得之此其槩也大都痛痺之證多有晝輕而夜重者正陰邪之在陰分也其有遇風雨陰晦而甚者此正陰邪侮陽之證也或得煖遇熱而甚者此濕熱傷陰之火證也有

火者宜從清涼有寒者宜從溫熱若筋脈拘滯伸縮不利者此血虛血燥證也非養血養氣不可凡諸治法總宜如前凡諸痺作痛者俱宜用火龍膏貼之

風痺論列方

六君子湯 補五

大秦艽湯 和二四五

敗毒散 散三六

真武湯 熟一四三

三氣飲 新熟十七

抽薪飲 新寒三

火龍膏 外一百二十

甘草附子湯 熟三一

易老天麻丸 和二七五

大防風湯 補九九

小續命湯 散五二

五積散

散三九

二陳散

和一

五苓散

和二八二

二妙散

寒二三四

三因附子湯 熟二三

加味二妙丸 寒二三五

當歸拈痛湯 寒一百三十

烏藥順氣散 散九三

九味羌活湯 散四四

調氣平胃散 和十八

羌活勝濕湯 和一七八

論外備用方

大建中湯 補三四

吳茱萸

愈風丹 和二七四

虛風

活絡飲 和二六九

風濕

茯苓丸 和百十四

痰飲痺痛

換骨丹 和二七九

史國公浸酒方

和二八

三痺湯 和二五八

血虛氣滯 鬱

痺湯 和二五七

溫經

虎骨散 和二五一

風毒走注

換腿丸 和二百八十

踈邪

桂心散 和二六五

風邪走痛 透經解藥

湯 和二七一

去風通經

虎骨酒 強筋骨 和二六八

和三二五

薏仁酒 和三二六

脚痺

秦艽地黃湯 和二六八

趁痛散 和二六七

行血行氣

豨莶丸 和二五六

六味茯苓湯 和二六一

痰痺

鷄鳴散 和二八五

風濕流注 白术酒 和一八

小潔身病

獨活寄生湯

和二百七十一
風寒濕痺

續斷丸

和三百五

風濕浮腫

續斷丹

和二五五

三氣

除濕蠲痺湯

和二六四

風濕

濕鬱湯

和二六六

風濕

薏仁湯

和二四七

流注

薰洗痛風法

和二七三

薰蒸法

和二七二

枳實散

和二六二

心痺痛

加味五痺湯

和二三五九

五臟痺

人參散

和二百六十
任督脇痛

紫蘇子湯

和二六三

肺痺胸痛

溫中法

麵丸熟一二二六脾痺多寒

當歸散

散九一

肺脾上氣

麻黃左經丸

散九六

風邪

半夏左經丸

散九七

風濕流注

大黃左經丸

散九八

閉結

神效左經丸

散九五

三氣

虎胫骨丸

寒三七

濕熱

羌活散

散八七

風氣

薯木丸

寒一二三

濕熱

苦參丸

寒一三八

陰虛風熱

熨背散 熱一二五 膜背痛 十味剉散 熱四九 血弱癰瘍

參附滲濕湯 寒濕痺痛

龍虎丹 熱一二七 走注

芎歸散 热一二三 温補行散愈 風燥濕化痰丸和一 七六

脉黃杏仁薏苡甘草湯 散四

風濕

汗證

經義

陰陽應象大論曰陽之汗以天地之雨名之

宜明五氣篇曰心爲汗

陰陽別論曰陽加於陰謂之汗

評熱病論曰陰虛者陽必湊之故 少氣時熱而汗出也

決氣篇曰津脫者腠理開汗大泄

骨空論曰風從外入令人振寒汗 出頭痛身重惡寒○大風汗

出灸諒譴諒譴在背下俠脊傍三寸所

金匱真言論曰夏暑汗不出者秋成風瘧

熱論曰暑當與汗皆出勿止

生氣逼天論曰因於暑汗煩則喘喝靜則多言體若燔炭汗出而散○汗出偏沮使人偏枯○汗出見濕乃生瘻瘍○勞汗當風寒薄爲皺鬱乃瘻○魄汗未盡形弱而氣燥穴俞以閉發爲風瘧○陽者衛外而爲固也

評熱病論曰人所以汗出者皆生於穀穀生於精今邪氣交爭於骨肉而得汗者是邪却而精勝也○復熱者邪氣也汗者精氣也今汗出而輒復熱者是邪勝也○汗出而脉尚躁盛者死

熱病篇曰熱病已得汗出而脉尚躁喘且復熱喘甚者死○熱病已得汗而脉尚躁盛此陰極之脉也死其得汗而脉靜者