



石室秘錄目錄

山陰陳士鐸遠公甫敬習

義烏

金以謀孝芑甫訂定
李祖脉子永甫參攷

卷一

正醫法

反醫法

順醫法

逆醫法

內治法

外治法

完治法

碎治法

大治法

小治法

偏治法

全治法

生治法

死治法

上治法

中治法

下治法

先治法

後治法

急治法

緩治法

本治法

末治法

不內外治法

卷二

真治法

男治法

女治法

虛治法

實治法

寒治法

熱治法

通治法

塞治法

解治法

飲治法

升治法

墮治法

開治法

閉治法

吐治法

泄治法

王治法

霸治法

倒治法

縛治法

肥治法

瘦治法

摩治法

浴治法

達治法

發治法

奪治法

深治法

淺治法

長治法

短治法

日治法

夜治法

氣治法

血治法

臟治法

腑治法

常治法

變治法

初治法

終治法

耑治法

分治法

同治法

異治法

勞治法

逸治法

吸治法

引治法

單治法

雙治法

立治法

卧治法

饑治法

飽治法

卷三

富治法

貧治法

產前治法

產後治法

老治法

少治法

東南治法

西北治法

皮毛治法

肌膚治法

筋脉治法

溫治法

清治法

收治法

散治法

軟治法

堅治法

抑治法

揚治法

疫治法

火治法

靜治法

動治法

春夏治法

秋冬治法

奇治法

平治法

奇治法奇音鶴

耦治法

形治法

氣治法

暗治法

近治法

久治法

暫治法

遠治法

明治法

輕治法

重治法

瘟疫治法

得治法

意治法

傷寒相舌秘法

一論五行

二論臟腑

三論陰陽

四論晝夜

五論四時

六論氣色

七論脈訣

八論強弱

九論寒熱

卷四

十論生死

十一論真假

十二論老少

十三論氣血

十四論命門

十五論任督

十六論子嗣

十七論瘟疫

岐天師兒科治法

諸真人傳授兒科

張真人傳痘疹門

錢真人傳痘瘡神方

岐天師又傳治回毒歲久不愈方

岐真人傳兒科秘法

長沙真人張冒傷寒方

兒痢

雷真君親傳活人錄

傷寒門四十條

中寒門六條

中暑門九條

水濕門九條

熱症門三條

燥症門

內傷門三十四條

血症

腹痛

喉痛

氣鬱

癲症

狂症

呆病

厥症

斑疹

亡陽

痢疾

五絕

砒毒

虎傷

湯火傷

癰疽併無名瘡毒

石室秘錄目錄

目錄

石室秘錄目錄

卷一

正醫

肺經生癱
腎兩陽脹滿
久嗽服氣
水瀉
血痢
腰痛
心病
仲怔
不水

反醫

發狂見鬼
摔倒不知人
中風墮地

順醫

胃虛
氣虛
火吐
酸水
瀉
腰痛
心病
仲怔
不水

逆醫

腎氣喘上逆
火大吐
雙蛾

內治

肺癰
陽虛
陰虛
症瘕

外治

頭痛
兩足痛
腰下痛
脣癰
治頑癬
接舌生舌

完治

生齒固齒
瘡症
腎虛如白虎湯症
直中陰經之火
陽明之火
汗出如雨不止

碎治

脾不化
食滯
夢遺喘噦
口眼歪斜
目痛

大治

虛症
虛如白虎湯症
直中陰經之火
陽明之火
汗出如雨不止

小治

中風不語
上熱下寒
兩腸脹滿
胃氣痛

偏治

瘧蟲病
瘧疾
虛勞

死治

卒倒
頭痛
統治諸癥

上治

眉落
烏髮
瘻瘍
目生星

中治

下痢
通治

通治

下血
通治

大瀉通治

下治

鵝膝風
多骨癰
囊癰
騎馬癰

先治

外感初起
傷寒初起

急治

中邪
中痰
中氣
氣喘
非外感
腹痛
非

後治

補正致邪
內傷

緩治

火吐
火瀉
火渴

本治

精滑夢遺
大便不通
小便不通

末治

瘧症不已
夜卧不睡
產婦感中風邪

不內外治

跌仆斷傷

陰治

腎虛感寒
水虧夜熱

陽治

傷寒發班
中暑火熱

假治

假熱
假寒

卷二

真治

真熱
真寒

男治

狐疝
強陽不倒

女治

瘻陽不振
風邪入血室

虛治

氣虛
血虛

實治

治實邪

寒治

吐血
衄血
目睡

熱治

心腎
脾胃

塞治

飽食嘔中
結胸內傷肝鬱

解治

亡陽下血
頭汗手汗吐血

斂治

陽虛下陷
陰虛下陷

升治

腹痛三症
墮治

墮治

開隔開膈尸厥

閉治

交感脫精
夢遺脫精

吐治

痰塊壅塞

泄治

飲食難消
大渴大吐
發背癰腫狂言見鬼

王治

肺葉倒轉
墮水淹死

霸治

肺癰開刀
兩手不能下叉伸

縛治

氣虛多痰

肥治

瘦人多火

瘦治

手足疼痛
頸項強直
口眼歪斜

摩治

臟腑癥結
腹脹止手汗

浴治

治癆頭止手汗
大丹痧疹

達治

疏通肝邪

異治

中濕中暑
傷寒久坐

勞治

久卧

深治

病入膏肓
骨髓腦中

淺治

細小疾病

長治

痿症腹痛
筋肉拔睛

短治

陽明口渴用石羔湯
附子理中湯

日治

日間發寒熱

夜治

夜發寒熱

氣治

治血宜順性

血治

肺脾同治
心腎同治

臟治

腎肝同治
肺經獨治

腑治

小便閉塞
大便秘結

腑治

治胆怯
頭虛吐噃

常治

日痛

變治

傷寒變結胸
中暑變亡陽

終治

傷風調理
火症調理

初治

傷暑初治
傷風初治

火病初治

論反胃變噎
中暑調理

病入膏肓
骨髓腦中

細

小

疾

病

筋肉拔睛
腹痛

背脊骨痛
病

兩腿酸痛

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病入膏肓
骨髓腦中

細

小

疾

病

筋肉拔睛
腹痛

背脊骨痛
病

兩腿酸痛

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

病

逸治

過勞
治氣勞

吸治

胞上井
瘡毒初起

引治

厥逆
虛火沸騰

單治

諸痛治肝
各症治胃

雙治

心痛治肝
肺散治腎

立治

腰痛治腎
腰痛治脾

臥治

瘧風治風
瘧風治風

鐵治

霍亂治寒
蟲痛治寒

飽治

治脾寒
治脾寒

膏深宜補正氣

治脾寒
治脾寒

卷三

富治

膏深宜補正氣

貧治

貧賤不可與
富貴人同治

產前治

子懸倒養
橫生倒養

產後治

產後宜補
胎動

老治

老人宜補腎

少治

少年人宜治脾胃

東南治

東南治

西北治

西北治

獨治

雙味治病

形治

平日頭痛
足痛

氣治

氣逆痰多
氣虛痰熱

筋脉治

筋病
脉病

溫治

虛癆
久寒

清治

脉燥
久瀉

收治

久寒
久汗

散治

散鬱
注夏

軟治

消痞塊
注夏

堅治

肺火
肝火

抑治

心火
腎火

揚治

氣沉血滯
肝火

痰治

久病初起之痰
久病之痰

火治

治陽明胃火
各經之火

瘀治

解火鬱
火鬱

靜治

治手足麻木

動治

春宜理氣
夏宜健脾

春夏治

春秋宜潤肺

秋冬治

冬宜補腎

奇治

治奇症四十七

平治

脾氣虛
諸用藥方

奇治

單味治病

三論陰陽

四論晝夜

五論四時

暗治

鬼門暗疾
產門生瘡

產門生蟲

明治

治瘡毒頭面瘡
手上手足瘡

久治

虛寒久治

暫治

傷風傷暑

傷食陽溫

遠治

中風痿症

食炭脹

近治

痺倒中惡

心痛暴亡

輕治

小柴胡湯

心癢腹痛欲死

重治

大渴大瀉

大汗大吐

得治

失治

意治

神治

傷寒相舌秘法

一論五行

二論臟腑

岐天師又傳治回毒久不愈方

岐真人傳兒科秘方

長沙張真人傳治小兒感冒風寒方

兒科

初生病下吐瀉
下不竟
肚胎突出

生下不肯食乳

六論氣色

七論脉訣

八論強弱

卷四

九論寒熱

十論生死

十一論真假

十二論老少

十三論氣血

十四論命門

十五論任督

十六論子嗣

十七論瘟疫

岐天師兒科治法

諸真人傳授兒科

張真人傳痘瘡門

錢真人傳痘瘡神方

石室秘錄卷之四

山陰陳士鐸遠公甫敬習

義烏金以輝李祖詠子芑甫參定

十論生死

雷真君曰。知生死而後可以為醫。生中知死。死中知生。非易易也。何以知生中有死。如傷寒症七日不汗死是也。何以知死中有生。如中風中惡中毒是也。生中之死而辨其不死。死中之生而辨其不生。醫道其庶幾乎。傷寒至七日猶無汗。人皆謂必死矣。而予獨斷其不死者。非因其無汗而可生也。蓋傷寒邪盛。禁汗之不得出。其人無煩燥之盛。腎水猶存。邪不能蒸乾之也。雖無汗必有汗矣。七日來復。豈虛言哉。此生中之死而辨其不死之法也。中風不語。中惡不出聲。中毒致悶亂。雖其人之氣猶存。似乎不死。然而遺尿則腎絕矣。手撒則肝絕矣。水不下喉。則脾胃絕矣。古本強則心絕矣。聲如軒則肺絕矣。五臟無一生。無有不死者。倘有一臟之未絕。未死者。看何臟之絕。而救何臟之氣。則死猶不死矣。然而五臟之中。尤最急者。莫過心腎。心腎之藥。莫過人參附子。二味二味相合。肺無經不入。救心腎而各臟亦無不救之矣。雖將死之人。必有痰涎之作祟。似祛痰化涎之藥。亦不可輕廢。然不多用人參。而祇用祛痰化涎之藥。適足以死之也。即或偶而生全。未幾俱歸於死。此死中之生而辨其不生之法也。

張公曰。真奇絕之文。

十一論真假

雷真君曰。病之有真有假也。大約寒熱之症居多。內經已辨之無遺義矣。予再取而論之者。以真假之病難知。而用藥者不可徒執泛逆之治法也。予有治真假寒之法。而不必尚夫湯劑也。如人下部冰涼。上部大熱渴欲飲水。下喉即吐。此真寒反視假熱之症以欺人。自當用八味湯。大劑探治與飲人。或不敢用或用之不多。或病人不肯服。當用吾法治之。以一人强有力者。擦其脚心。如火之熱。不熱不已。以人熱為度。後用吳茱萸一兩。為末附子一錢射香。一分為細末。以少少白麪入之。打為糊作膏。兩箇貼在脚心之中。少頃必睡熟醒來。下部身熱而上部之火自息矣。急以八味湯與之。則病去如失。至於治真熱假寒之法。則又不然。如人外身冰涼。內

心火熾發。寒發熱戰慄不已。此內真熱反現假寒之象。自當用三黃石膏湯加生姜乘熱飲之。醫或信之不真。或病家不肯與服。予法亟宜用之也。井水一桶以水撲心胸。似覺心快撲之至二三十次。則內熱自止。而外之戰慄不覺頓失。急以元參麥冬白芍各二兩煎湯與之。任其恣飲。則病不至再甚矣。

張公曰。何方法之奇。至此遵而行之。

十二論老少

雷真君曰。老人與小兒最難治也。老人血氣已衰。多飲食則不生精而生病。小兒精氣未滿。多飲食則傷胃傷脾也。故治老人小兒當另立一門。雖岐天師已立有門有方。然終覺未全。今另留數方。半治老人之生精。半治小兒之傷胃也。生精者。生其腎之精也。人生腎氣有餘。而後脾胃之氣行。脾胃氣行。而後分精四布於各臟腑。俱得相輸以傳化。方名養老丸。用熟地八兩。巴戟天四兩。山茱萸四兩。北五味一兩。薏仁三兩。芡實四兩。車前子一兩。牛膝三兩。山藥四兩。各為末蜜為丸。每日吞五錢。自能生精壯氣。開胃健脾也。又何慮飲食之難化乎。小兒之方。單顧其胃。天師已有神方傳世。今再立一方。亦治腎以生土也。論小兒純陽不宜補腎。不知小兒過於飲食。必至傷胃。久之傷胃而脾亦傷。脾傷而肺金亦傷。肺金亦傷。而腎水更傷矣。小兒至腎水之傷。則癆瘍之症起。雞胸大肚之證見。苟治之不得法。而仍治以治胃之藥。未能奏功。復用攻利之藥並進。殤人夭年可憫。今立一方。治小兒腎藏之損。實有奇功。方名全幼丸。用熟地二兩。麥冬一兩。山藥三兩。芡實三兩。車前子一兩。神麩五錢。白朮一兩。地栗粉三兩。鼈甲三兩。生何首烏三兩。茯苓一兩。各為末蜜為丸。每日白滾水送下三錢。一料前症盡愈。二方實可佐天師之未逮也。

張真君曰。妙絕之論。妙絕之方。

十三論氣血

雷真君曰。氣無形也。血有形也。人知治血。必須理氣。使無形生有形。殊不知治氣。必須理氣。使有形生無形也。但無形生有形。每在於倉皇急危之日。而有形生無形。要在於平常安適之時。人見用氣分之藥速於見功用。血分之藥難於奏效。遂信無形能生有形。而疑有形不能生無形。不知氣血原疊相生長。但止有緩急之殊耳。

故吐血之時。不能速生血也。當亟補其氣。吐血之後。不可純補氣也。當緩補其氣。氣生血而血無奔軼之憂。血生氣而氣無輕躁之害。此氣血之兩相須。而兩相得也。

張真君曰。論妙極無弊之道也。

十四論命門

雷真君曰。命門為十二經之主。內經已詳言之。余再取而尚論者。蓋命門之經雖乾。而命門之主尚晦也。命門既為十二經之主。而所主者何主也。人非火不能生活。有此火而後。十二經始得其生化之機。命門者。先天之火也。此火無形。而居於水之中。天下有形之火。水之所剋。無形之火。水之所生。火尅於水者。有形之水也。火生於水者。無形之水也。然而無形之火。偏能生無形之水。故火不藏於火。而轉藏於水也。命門之火。陽火也。一陽昭於二陰之間者也。人先生命門而後生心。其可專重夫心乎。心得命門。而神明有主。始可以應物。肝得命門而謀慮。膽得命門而決斷。胃得命門而能受納。脾得命門而能轉輸。肺得命門而准節。大腸得命門而傳道。小腸得命門而布化。腎得命門而作強。三焦得命門而決瀆。膀胱得命門而收藏。無不借命門之火。以溫養之也。此火宜補而不宜渴。宜於水中以補火。尤宜火中以補水。使火生於水。而還以藏於水也。倘日用寒涼以伐之。則命門之火微。又何能生養十二經耶。此內經所謂主不明。則十二官危。非重言命門歟。

張真君曰。命門得天師之辨。正若日月之經天。今又得雷真君之尚論。則命門何至於晦而不彰乎。萬世之大幸也。

張景岳先生謂善補陰者。宜於陽中補陰。無伐陽以救陰。善補陽者。宜於陰中補陽。無伐陰以救陽。深得此意。李子永識。

十五論任督

雷真君曰。任督之脉。在臟腑之外。別有經絡也。每為世醫之所略。不知此二部之脉。不可不講。非若衝蹻之脉。可有可無也。任脉起於中極之下。以上毛際。循腹裡上闢元。至咽喉上頤。循而入目。此任脉之經絡也。督脉起於少腹以下。骨中央。女子人繫廷孔。在溺孔之際。其絡循陰器合纂間。繞纂後。即前後二陰之周也。別繞臂至

少陰與巨陽中絡者合。少陰上股內後廉。貫脊屬腎。與太陽起於目內眞。上額交顙。上入絡腦。還出別下項循肩膊。夾脊抵腰中。入循膂絡腎。其男子循莖下至篡。與子等。其少腹直上者。貫脣中央。上貫心入喉。上督環唇。上繫兩目之下中央。此腎之經也。二經之病各有不同。而治法實相同也。蓋六經之脉絡原相貫通。治任脉之癰癩而督脈之遺溺脊強亦愈也。然此二脉者。為胚胎之主脉。無則女子不受姓。男子難作。強以射精。此脉之宜補而不宜渴明矣。補則外腎壯大而陽旺。渴則外腎縮細而陽衰。補則子宮熱而受胎。渴則子宮冷而難妊矣。

張真君曰。妙絕令人知任督之至要。所以用藥不效也。知任督何難治病哉。

十六論子嗣

雷真君曰。人生子嗣。雖曰天命。豈盡非人事哉。有男子不能生子者。有女子不能生子者。男子不能生子有六病。女子不能生子有十病。六病維何。一精寒也。一氣衰也。一痰多也。一相火盛也。一精少也。一氣鬱也。精寒者。腎中之精寒。雖射入子宮。而女子胞胎不納。不一月而即墮矣。氣衰者。陽氣衰也。氣衰則不能久戰。以動女子之歡心。男精已泄而女精未交。何能生物乎。精少者。雖能射。而精衰必薄。胞胎之口大張。細小之入。何能屢足。故隨入而隨出矣。痰多者。多濕也。多濕則精不純。夾雜之精。縱然生子。必定夭喪。相火盛者。過於久戰。女精已過。而男精未施。及男精既施。而女興已寢。又安能生育哉。氣鬱者。乃肝氣抑塞。不能生心包之火。則懷抱憂愁。而陽事因之不振。或臨鑪而興已閑。或對壘而戈忽倒。女子之春思正濃。而男子之浩嘆頑起。則風景蕭條。房幃寂寞。柴米之心難忘。調笑之言絕少。又何能種玉於藍田。毓麟於蘭室哉。故精寒者。溫其火。氣衰者。補其氣。痰多者。消其痰。火盛者。補其水。精少者。添其精氣。鬱者。舒其氣。則男子無子者。可以有子。不可徒補其相火也。十病維何。一胚胎冷也。一脾胃寒也。一帶脉急也。一肝氣鬱也。一痰氣盛也。一相火旺也。一腎水衰也。一任督病也。一膀胱氣化不行也。一氣血虛而不能攝也。胚胎之脉。所以生物者也。煖則生物。而冷則殺物也。縱男子精暖而射入之。又安能始之而不吐乎。脾胃虛寒。則帶脉之間必然無力。精即射入於胚胎。又安能勝任。於帶脉宜弛不宜急。帶脉急者。由於腰膝之不利也。腰膝不利。則胚胎無力。又安能載物乎。肝氣鬱。則心境不舒。何

能為歛於床第。疾氣盛者身肥婦也。母論身肥則下體過胖。子宮縮入難以受精。即或男子甚健。鼓勇而戰射精直入。而濕由膀胱必有泛濫之虞。相火旺者必過於焚燒。焦乾之地。又若草木之難生。腎水衰者則子宮燥涸。木苗無雨露之潤亦成痿黃。必有墮胎之嘆。任督之間倘有疝瘕之症則精不能生。因外有所障也。膀胱與胞胎相近。倘氣化不行。則水濕之氣必且滲入於胞胎而不能受妊矣。子懷胎必氣血足而後能養。倘氣虛則陽衰。血虛則陰衰。氣血雙虛則胞胎下墜而不能升舉。小產之不能免也。故胞胎冷者溫之。脾胃寒者暖之。帶脉急者緩之。肝氣鬱者開之。疾氣盛者消之。相火旺者平之。腎水衰者補之。任督病者除之。膀胱氣化不行者助其腎氣。氣血不能攝胎者益其氣血也。則女子無子者亦可以有子。而不可徒治其胞胎也。種子方莫妙用岐天師之方。故不再定。

張真君曰。男女之病各各不同。得其病之因。知其方之當。何患無子哉。以男子六病。女子十病。問人之有無。即可知用藥之宜一矣。

十七論瘟疫

雷真君曰。古人云。疫來無方。非言治疫之無方。乃言致疫之無方也。然亦未嘗無方。疫來既有方。而謂治之無方可乎。大約瘟疫之來多因人事之相召。而天時之氣運適相感也。故天氣既相侵而地氣亦復相應。合天地人之毒氣而瘟疫成焉。侵於一鄉而一鄉之人病。釀於一城則一城之人病。流於千里則千里之人病。甚且死亡相繼。閨門闔境無不皆然。深可痛也。此等病必須符水救之。然而符水終不肯傳於世。今別定一法。用管仲一枝浸於水缸之內。加入白礬少許。逐日飲之。則瘟疫之病不生矣。真至神之法也。

張真人曰。妙方。此先治瘟疫之法也。

兒科治法

天師曰。兒科得其要。無難治人。今傳一法門。使萬世小兒盡登仁壽。法在先看氣色。後看脉。小兒有疾。其顏色必鮮艷。以鼻之上眼之中間中正精明穴上辨之。色紅者心熱也。紅筋橫直現於山根。皆心熱也。色紫者心熱之甚。而肺亦熱也。色青者肝有風也。青筋橫現者。乃肝熱也。青筋橫現者。亦肝熱也。直者風上行。橫者風下行。

也色黑者風甚。而腎中有寒。色白者肺中有痰。色黃者脾胃虛而作瀉。黃筋現於山根。不論橫直。總皆脾胃之症。止有此數色無他顏色故一覽而知小兒之病矣。大人看脈於寸關尺。小兒何獨不然。但小兒不必看至數。止看其數與不數耳。數甚則熱。不數則寒也。數之中浮者風也。沉者寒也。緩者濕也。濁者邪也。滑者痰也。如此而已。七表八裏俱不必去看。自知吾訛。則脉散亦不必讀也。方止歇者。乃痛也。餘亦不必再談。小兒症大約吐瀉厥逆。風寒濕熱而已。其餘痘疹瘡瘍。無他病。或心癟腹痛。或有痞塊。或有瘡疔。可一覽而知也。然而小兒之病。虛者十之九。實者十之一。故藥宜補為先。今立三方。通治小兒諸症。第一方人參三分。白朮五分。茯苓一錢。甘草一分。陳皮二分。神麃三分。半夏一分。此六君子加減也。通治小兒脾胃弱病。神效。如傷肉食者。加山楂五粒。傷米食者。加麥芽五分。傷麯食者。加茱萸子三分。吐者。加白蔻一粒。去甘草。加生姜三片。瀉者。加乾姜三分。猪苓五分。第二方治外感也。或傷風傷寒。或咳嗽或發熱。或不發熱。或頭痛或鼻塞或痰多或驚悸或角弓反張。皆以此方通治之。無不神效。方用柴胡七分。甘草三分。桔梗五分。半夏三分。黃芩三分。白芍二錢。白朮二錢。當歸五分。陳皮二分。茯苓五分。水煎服。頭痛加蔓荆子三分。心痛手不可按者。乃實火也。加梔子一錢。按之不痛者。乃虛火也。加甘草八分。管仲五分。廣木香三分。乳香一分。腸痛者。加芍藥三錢。腹痛者。以手按之。手按而疼甚者。乃食也。加大黃一錢。按之而不痛者。乃寒也。非食也。加肉桂三分。乾姜三分。有汗出不止者。加桑葉一片。腹痛而紅腫者。乃火也。加黃連三分。白蒺藜一分。喉痛者。加山荳根二分。第三方治虛寒之症。夜熱出汗。夜啼不寐。此仲久嗽。不行遲語。遍龜背狗肚。將成癆瘵等症。方用熟地三錢。山茱萸二錢。麥冬二錢。北五味五分。元參二錢。白朮二錢。茯苓一錢。薏仁三錢。丹皮一錢。沙參二錢。地骨皮二錢。水煎服。倘兼有外感。少加柴胡五分。白芍三錢。白芥子一錢。餘無可加減矣。

諸真人傳授兒科

痘瘡計日

痘瘡瘳病

疹

痘治法

天師曰。今人看痘為難治。不知得其法則無難也。初起之時。不論身弱身強。先以補氣補血之藥為君。加一發散之藥。則重者必輕。而輕者必少。無如世人皆以寒涼之品為主。又助以散之味。此所以輕變重。重至死也。

吾今傳五方。朝夕服之。至七日無不結癰。再無回毒之症。十人十活。不殺一小兒也。

第一日方

見小兒身熱眼如醉眼者。此出痘兆也。若不是醉眼。則非出痘。不可用此方。用此外感方治之。若見眼醉。急投此方。則痘點即見。必不待三日而自見也。方用黃芪三錢。白朮一錢。甘草一錢。當歸二錢。川芎二錢。茯苓三錢。柴胡一錢五分。升麻五分。麥冬二錢。元參三錢。陳皮五分。荆芥一錢。金銀花先用五分。水三碗煎湯二碗。再煎藥至五分。與小兒飲之。此方五歲以上俱照此分兩。五歲以下減半。週歲內者。又遽減之。服此藥自然神思清爽。病家不肯服。勸其速服。包其速愈。不妨身任之。服後見點。再用第二方。

第二日方

白朮二錢。麥冬三錢。甘草一錢。桔梗二錢。當歸五錢。元參二錢。生地五錢。柴胡一錢。升麻三分。荆芥一錢。茯苓二錢。白芍三錢。白芥子二錢。金銀花三錢。水煎服。服此藥後一身盡見點矣。其色必紅而無色白色黑之虞矣。

第三日方

人參五分。白芍三錢。白朮二錢。茯苓二錢。元參二錢。神麃三分。丹皮一錢。水煎服。此方服後盡皆灌漿無不氣血之足。永無退症之虞矣。再服第四日方。

第四日方

人參一錢。當歸二錢。熟地五錢。茯苓二錢。金銀花三錢。陳皮五分。甘草一錢。元參三錢。白朮三錢。白芍二錢。神麃五分。服此方後小兒必然口健要吃食不已。不妨少少頻與。亦不可食多也。第五方再不必用矣。然更傳之者。恐小兒多食。別生他病。故又傳此方。

第五日方

人參一錢。茯苓三錢。白朮二錢。甘草一錢。有食加麥芽五分。山楂五粒。若不傷食不必加。止加金銀花三錢。能服此方後期七日前而回春也。以上本兒年歲小者。俱照第一方減之。如小兒已身熱也。三日用第三方。四日則用第四方。若如壞症。另用壞症方。

秦真人傳瘡瘍症方

治痘瘡症已黑者
人將棄之下喉即活

人參三錢陳皮一錢蟬脫五分元參三錢當歸三錢荆芥穗一錢水二鍾煎八分灌下。下喉即活。大約壞症皆元氣虛而火不能發也。我用參以助元氣用元參以去浮游之火用陳皮去痰開胃則參無所得而相得益彰。荆芥以發之又能引火歸經當歸以生新去舊消滯氣蟬脫亦解毒去斑世人如無知此法妙初起不可服必壞症乃可一劑即回春不必再劑也。

雷真君傳痘瘡壞症方

痘瘡壞症最為可憐身如黑團之氣口不能言食不能咽世人到此盡棄之溝中醫者到此亦置而不顧誰知盡人皆可生之乎吾有奇方名必全湯人參三錢元參一兩荆芥一錢金銀花一兩陳皮三分水煎五分灌之下喉而眼開少頃而身動久之而神氣回口能言食能下矣不必再服他藥痘瘡白面而生全至奇至神之方也蓋痘瘡壞瘡皆氣虛而火不能發也火毒留於中而不得出也故形此狀其實臟腑未壞我用參以固元氣用元參以去火用金銀花以消毒用陳皮以化痰用荆芥以引經而發出於外內中原有生機所以一劑回春也

疹治法

凡疹初起小兒必發熱口必大渴呼水其發疹之如紅雲一片大約發班相同但班無頭粒而疹有頭粒也頭如蜜蜂之狀無他別也我今傳四時之疹方用元參三錢麥冬二錢蘇葉一錢升麻八分天花粉一錢金銀花三錢陳皮三分甘草一錢生地三錢黃芩八分桂枝二錢水半鍾煎五分熱服凡有疹子無不神效惟夏天加青蒿三錢可也小兒初生數月減半一週外俱照此分兩不再傳方也服吾方一劑即愈何至三揖。

張真人傳痘疹門

痘瘡初起方

白芍二錢柴胡一錢當歸一錢陳皮五分荆芥八分防風三分生地二錢甘草一錢桔梗一錢麥冬一錢乾葛一錢水煎服二劑痘瘡惡者必變為良

痘瘡出齊方

人參一錢黃芪一錢甘草一錢白芍二錢生地二錢麥冬二錢柴胡八分紅花五分水煎服。有熱加黃連五分。或黃芪一錢梔子一錢亦可。有驚加蟬退去翅足三分。色黑者加肉桂五分。大便閉結不通加大黃三分。腹痛加芍藥一錢甘草一錢泄瀉加茯苓一錢有汗倍加黃芪。有痰加白芥子一錢痒荆芥子六分。身痛者加廣木香三分。色白者寒也加肉桂一錢人參黃芪俱多加。痘瘡頭不突者氣虛也倍黃芪。腰不滿者血虛也加當歸一錢熟地二錢可也。

痘瘡將回方

人參一錢白朮一錢茯苓一錢甘草五分桔梗三分升提其氣而又益肺金使皮毛得諸補藥之益也。水煎服。有紅紫乾燥黑陷者熱未退也。本方加黃芩一錢如痘色白黑灰黑色而陷。寒虛也加肉桂三分。人參一錢灌膿者倍加人參。再加黃芪二錢當歸三錢泄瀉加乾姜五分。茯苓一錢心慌悶亂者多加人參。嘔吐者亦加人參乾姜。身癢者加廣木香三分。當屬不屬多加人參大便閉者加大黃三分。口渴者熱也加麥冬二錢元參一錢失音者加石菖蒲三分。桔梗一錢痘瘡入眼成翳者加蟬退五分。從前初起方中即加蟬退七個則目無痘矣。咽喉之中防其生痘者初起方即用桔梗一錢即無此症。小兒痘症有此三方再無死法。神而通之可稱神醫矣。壞疔亦以此方治之無不生者。總之小兒宜補不宜散一言盡之矣。○疹乃熱也不可用人參白朮法當用補血而不可散血俱宜切記。

方用當歸二錢元參三錢升麻三錢甘草三分乾葛一錢水煎服此治疹奇方也。有此奇方為骨。又出入加減可也。心火熱極加黃連三分。肝火加梔子六分。肺火加黃芩一錢麥冬一錢辨各經病亦看小兒山根之色然看之時須用洗去面上塵土細看之痘疹全書統諸症以立言而余總秘要以傳方。有此四方為骨參之彼書出入加減神奇之極矣。

錢真人傳痘瘡神方

不論起初灌瓶收磨俱用之神妙無比

人參一兩白朮八錢茯苓五錢陳皮三錢白芍一兩生甘草三錢元參八錢蟬退一錢柴胡一錢黃連五分。神