



中華民國十一年六月再版

類分王孟英醫案(全二冊)

定價洋六角

外埠酌加運費滙費

編校者

青浦陸士謭

印刷所

上海世界書局

發行所

上海世界書局

板權所有不准  
翻印

分發行所

北京漢口杭州世界書局

總發行所

(上海四馬路)

世界書局

分類 王孟英醫案

卷二

青浦陸士諤編校

嘔吐

朱某患嘔吐。諸藥不效。甚至大小便祕。糞從口出臭不可當。自問不起矣。孟英用代  
赭旋覆湯加蟻蠅蟲服之而愈。

陳芟裳之太夫人。陡患嘔吐。徹夜不止。次早延孟英診之。自述因寒而致。孟英知芟  
裳進場家無主藥之人。若明言屬熱。必致畏藥不服矣。漫應曰固寒也。而疏方則芩  
連梔棟。以大苦寒為劑。投之良愈。

趙子善。今愛。患發熱嘔吐。口渴便祕。而年甫三齡。不能自言病苦。孟英視其舌微絳  
而苔色乾黃。因與海蛇鼠矢竹茹知母花粉杏貝巵斛之藥。二劑果下。未化宿食。色  
醫粘膩。設投俗尚溫燥消導法。必致陰竭而亡。繼往維揚。孟英臨別贈言。謂其體質  
勿宜溫補。次年偶病。果為參朮殞命。惜哉。

蘭谿吳氏婦。盛夏患惡阻。洪某進旋覆薑桂等藥而壯熱神昏。脅疼欲墮。二便秘滯。  
嘔吐不休。數日而洪子危芩連梔竹茹知母銀花綠豆為劑。佐以蘇葉三分。冬瓜煮  
湯煎藥。下嚥即安。數服而愈。

與菜園患發熱嘔吐。莖縮腹痛。孟英診脈絃與而數。苔色膩黃。曰熱伏厥陰也。與棟實通草卮蓮茹斛絲瓜絡。一劑知。數劑愈。

潘媼久患痛吐。多藥莫痊。孟英視之。脉絃勁而數。曰口苦而渴乎。大便不暢乎。小溲如沸乎。病者云誠然。第冷氣時衝。欲嘔不暢。渴喜飲沸。吐沫極酸。總由積寒深重耳。孟英曰。因此諒諸醫必用溫燥之藥矣。須知氣衝覺冷者。熱極似寒。渴欲飲沸者。飲邪內踞。吐沫作酸者。曲直所化。其病在絡。故吐之不易。方以茹旋危棟枇杷葉絲瓜絡木通生薑衣海蛇鳧茈蘇葉炒黃連煎吞。當歸龍鬚丸。一劑知。五劑愈。

噫

予素患噫氣。凡體稍不適。其病即至。既響且多。勢不可遏。戊子冬發之最甚。苦不可言。孟英曰。此陽氣式微。而濁陰上逆也。先服理中湯一劑。隨以旋覆代赭湯投之。遂愈。嗣後每發。如法服之。輒效。後來發亦漸輕。今已不甚發矣。予聞孟英常云。此仲聖妙方。藥極平淡。奈世人畏不敢用。殊可陋也。

袁某患噫聲。聞于鄰。俞某與理中湯。暨旋覆代赭湯。皆不效。孟英診之。尺中虛大。乃詰之曰。爾覺氣自少腹上衝乎。病者云誠然。孟英曰。此病在下焦。用胡桃肉故紙。韭菜絲小茴鹿角霜枸杞。當歸茯苓覆盆龍齒牡蠣。服一劑。其衝氣即至喉而止。不作聲為噫矣。再剝寂然。多服竟愈。

許太常滇生之夫人。患腿痛而素多噫氣。若指頭一搓。或眉間一抹。其噫即不已。向以為虛。在都時服補劑竟不能愈。冬間旋里。孟英診脈絃滑。乃痰阻于絡氣不得宣也。以絲瓜絡竹茹旋復橘絡羚羊茯苓豆卷金鈴柿蒂海蛇茅薜荔為方。吞當歸龍鬚丸而安。其媳為阮芸臺太傅之女孫。在都因喪子悲哀。患發厥。屢服補劑以致汎愆。或疑為娠。孟英曰。脈雖絃數以滑。乃痰挾風陽而為厥也。與大劑蠲痰息風舒鬱清營之劑。漸以獲愈。

呃

一老人霍亂後。目閉呃忒。醫謂脫陷在即。與桂附回陽之藥。業已煎矣。適孟英至。詢知溺赤口乾。診得脈形更數。而藥香撲鼻。即曰此藥中有肉桂。叟勿服也。服之必死。迫今將藥傾潑。而與肅肺清胃之劑。果得漸安。

黃履吉截瘻後。患浮腫。趙某聞其體素虛。切其脈絃細。遂用溫補。馴致呃忒不休。氣衝礙卧。飲食不進。勢瀕于危。請孟英決其及返餘杭否。孟英曰。脈雖絃細而有力。子必誤服溫補矣。肯服吾藥。猶可無恐。因與括婁薤白合小陷胸橘皮竹茹湯加柿蒂旋覆蘇子香附赤石紫苑杷葉為方。四劑而瘳。

陳笠塘年近花甲。于初冬時偶從梯半一跌。遂發寒熱。痰多欬逆。沈辛甫作虛痰類中挾風溫治。熱退便行。而痰逆不休。且兼呃忒。改從清肅鎮攝。其呃日甚。因拉孟英。

商之。診脈左絃澀不調。右兼更滑。察其呃時有微甚而有欲呃不爽之象。詢其噴嚏久不作矣。曰此氣鬱于肝。欲升而不能升。痰阻于肺。欲降而不能降之證也。補攝之品咸在禁例。以柴胡枳殼石菖蒲紫蘇薤白。婁仁竹茹橘皮白前為劑。覆杯而減。再劑而安。

錢某患感。醫治旬日。漸致神昏瘛瘲。大便泄瀉。以其體素弱而吸洋烟也。胥束手矣。始丐診于孟英。左脈絃更。右則虛大而滑。汗出不解。目睭耳聾。譏語溲紅。時時呃逆。心下拒按。舌不能伸。幹齒視苔。滿黃微燥。曰溫邪雖陷。氣分未清。裏氣雖虛。伏痰內盛。幸瀉數次。邪勢稍衰。先予人參牡蠣犀角元參竹葉竹茹銀花石斛枇杷葉川貝母蓮子心為劑。調服萬氏清心丸一顆。目明熱退。呃減舌伸。臂顯赤斑。夜亦能寐。詰朝去參蠅牛黃丸。如竹瀝桑枝絲瓜絡。痰果大吐。瘛瘲即平。再去犀元桑枝加紫苑海蛇呃止。胸舒。苔色漸退。稀糜漸進。耳聽略聰。再去竹葉蓮心紫苑加沙參花粉。服五帖而下堅矢。嗣投調養而安。

脹

許某于醉飽後。腹中脹悶。大解不行。自恃強壯。仍飲酒食肉。二日後腹痛。猶疑為寒。又飲火酒。兼吸洋烟。併小溲而不通矣。繼而大渴引飲。飲而即吐。而起居如常也。四朝走懇孟英診之。脈促歇止。滿舌黃苔。極其穢膩。而體豐肉顫。證頗可危。因婉言告。

之曰。不過停食耳。且飲山楂神麴湯可也。午後始覺指冷倦怠。尚能坐轎出城。到家氣逆。夜分痰升。比曉胸腹額上俱脹裂而死。蓋知下之不及。故不與藥也。  
許仲筠患腹痛不饑。醫與參朮薑附諸藥。疼脹日加。水飲不沾。沈沈如寐。孟英診脈絃細。苔色黃膩。投以枳樸黃連卮棟香附葵藜延胡等藥。二劑便行脈起。苔退知饑而愈。

吳醞。香大令四令媳。時患腹脹減餐。牙宣悶痛。久治不效。肌肉漸消。孟英診脈絃細而數。肝氣雖滯。而陰虛營熱。豈辛通溫運之可投耶。以烏梅黃連卮子木瓜首烏鼈甲茹貝。服之果愈。繼與甘潤滋填。肌充胃旺。汎準脈和。積歲沈疴。宛然若失。吳誦青室年近五旬。天癸已絕。偶患腹脹。局醫黃某。知其體素羸也。投以腎氣湯。而寒熱漸作。改從建中法。旬日後病劇而崩。愈補愈甚。乞援於孟英。脈洪而數。渴飲苔黃。是吸受暑邪。得溫補而血下漏也。與犀角元參茅根柏葉卮棟知斛花粉白薇等藥。數劑始安。續加生地二至二冬。滋養而愈。次年患病。仍為誤藥而殞。

宋氏婦患癓。反覆已經向痊。忽然腹脹上至心下。氣喘便溺。閉湯飲不能下嚥。自汗不能倚息。家人惶惶。且極貧不能延診。走乞孟英擬方挽救。因以桂枝石膏旋赭杏朴芩半黃連通草為劑。果覆杯而病若失。張養之目擊歎為神治。  
何氏婦年未四旬。于庚戌冬患腹脹善嘔。或云寒凝氣滯。宜吸雅片煙以溫運之。及

煙癰既成。而病如故。或云冷積也。莫妙于蒜罨。往夏遂以蒜杵如泥偏塗脊骨。名曰水灸。灸後起疮痛潰。骨蒸減餐。其脹反加。經乃漸斷。招越醫莊某治之。云勞損也。進補陽服至冬令。便瀉不飢。骨立形消。卧牀不起。今春請神方于各乩壇。皆云不治。其夫因蒲艾田薦于許信臣學使。隨任廣東。家無主意。束手待斃而已。蒲聞而憐之。為屈孟英一診。以決危期之遲速。初無求愈之心也。切其脈絃細數。循其尺索刺粗舌絳無津。飲而不食。兩腋腫痛。攀不能伸。痰多善怒。腹脹堅高。上膚黃粗。循之戚戚然。晝夜殷屎。愁容黎瘁。小溲短澀而如沸。大便日瀉十餘行。脈色相參。萬分棘手。惟目光炯炯。音朗神清。是精氣神之本實未撥。病雖造于極中之極。郤非虛損之末傳也。殆由木土相凌。為嘔為脹。洋烟提澀其氣。益令疏泄無權。蒜灸刲耗其陰。更使鬱攸內燦。進以溫補。徒為壯火豎懾。而涸其津。溉以滋填。反致運化無權。而釀為瀉。固之澀之。然費苦心。余謂賴有此瀉。尚堪消受許多補劑。縱臨證心粗。不詢其瀉出之熱。而且膩。豈有腎虛脾敗之瀉。可以久不安穀而延之至今乎。夫人氣以成形耳。法天行健。本無一息之停。而性主疎泄者肝也。職司敷布者肺也。權衡出納者胃也。運化精微者脾也。咸以氣為用者也。肝氣不疏。則鬱而為火。肺氣不肅。則津結成痰。胃氣不通。則廢其容。脾氣不達。則滯其樞機。一氣偶愆。即能成病。推諸外感。理亦相同。

如酷暑嚴寒人所共受。而有病有不病者。不盡關乎老少強弱也。以身中之氣有愆有不愆也。愆則邪留著而為病。不愆則氣默運而潛消。調其愆而使之不愆。治外感內傷諸病無餘蘊矣。今氣愆其道。津液不行。血無化源。人日枯瘁。率投補藥。更阻氣機。是不調其愆而反錮其疾也。疾日錮。腹愈脹。氣日愆。血愈枯。或以為乾血勞。或以為單腹脹。然汎斷于腹脹半年之後。是氣愆而致血無以化。非血病而成脹矣。既脹而馴致脰腫筋掣。不可謂之單脹矣。脰處裂有血紋。堅如鱗甲。顯為熱壅。不屬虛寒。借箸而籌。氣行則熱自泄。首重調愆。展以輕清。忌投剛燥。熱泄則液自生。佐以養血。須避滋膩。宜取流通。徐洄溪所謂病去則虛者亦生。病留則實者亦死。勿以藥太平淡。而疑其不足以去病也。艾田云。薛一瓢謂人須修到半个神仙身分。方可當得名醫二字。聆君妙論。不愧名醫。于是以沙參竹茹絲瓜絡銀花棟實枇杷葉冬瓜皮黃檗當歸麥冬枸杞白芍出入為方。用水露煮葦莖。鷄湯煎藥。服四劑。脈柔滑暢。濶減餐加。乃參以西洋參生地黃連花粉薏苡卮子之類。又六劑。舌色漸淡。腰腫漸消。服至匝月。忽然周身汗出漆漆。而脹脹皆退。舌亦津潤。皮膚漸蛻。肌肉漸生。足亦能伸。便溺有節。並不另授峻補。兩月後可策杖而行矣。天時漸熱。服藥已久。以虎潛丸方。熬為膏。用藕粉瀆搗成丸。因丸劑皆藥之渣質。脾運殊難。孟英凡治陰虛須滋補者。悉熬取其精華。而以為佐使者和之為丸。不但藥力較優。亦且餌之易化。如法服

至長夏健步經通。遂以康復。艾田云。此證人不能治。神亦不能治。君竟能肉白骨而生之。不僅半個神仙。殆人而仙者耶。抑仙而降為人者耶。水露以甜水貯瓶蒸取其露。宜臨時蒸用。取其有升氣。

瓶汗水停久則失性矣。一名

余雖挈眷回籍。而會垣戚友。未能恝然置之。故時住寓焉。今六月初二日。刺船返里。欲避暑月。應酬之繁也。嗣因亢旱河涸。舟楫不通。或以肩輿相招。余畏長途而郤之。中秋後。河漸通。乃二十夜夢先慈以不必進省為訓。初謂心有所憶也。至九月下旬。欲展墓於皋亭山。因赴杭視弟妹。舟人忘備白米。強啖冬春米飯一餐。遂腹脹不飢。越日抵寓。身漸發熱。徐君亞枝為余多剷清化。至十六日始解極堅燥矢。解後大渴。喜飲少頃。則傾囊而吐。吐則氣自少。腹上湧味極酸苦。甚至吐蛇。趙君笛樓診云。十日不食。中已大虛。一解之後。更無砥柱。故肝木乘而衝侮也。投參芩椒梅萸連橘半茹薑等四劑。吐止。稍進飲食。然飢肉削盡。寐則肢惕。而稍一展動。則絡痛異常。大解必旬日一行。極其艱澀。扶病而歸。兩跗皆腫。自知虛不易復。而性不受藥。遂啖肥濃。至冬杪腫消。而大便始潤。津液易奪而難復。如此。且稍或煩勞。即作寒熱。至次年三月。各恙始休。而步履如常。惟肌肉不能復舊。以脾主四肢。胃主肌肉。而束骨利機關也。余脾胃素弱。故畏藥如虎。稍有惡劣之氣者。飲之即吐。若吞丸藥。則不能尅化。生冷硬物。概不敢嘗。最奇者。冬春米飯之氣。亦所素畏。偶食之。輒小病。而未有如此。

之劇者。嗣後不敢略試矣。且深悔不遵先慈母夢示。遂息影窮鄉。不復寓省。乃不知者。徑目余為神仙中人。蓋余能安其癥也。而吳越之間。亦未嘗不偶遊焉。次年夏。遊武林。晤許貫之茂才。見其令媛環姑。患瘍膨聚。氣云起於桐鄉外家。食冬春米飯也。可見人之脾胃。有同於我者矣。

盛澤王西泉丈仲郎。巽齋刑部夫人。年未四旬。而十八年前。誕子之後。汎即不行醫。以為虛。頻年溫補。略無小效。董味青茂才。囑就余診。脉弦滑而體甚豐。乃氣鬱生熱。熱爍津液。以成疾。疾復阻其氣道。不能化血以流行。以致行度愆期。腹形脹痛。肢背不舒。骨疼寐惕。渴不欲飲。間或吐酸。二便不宣。苔黃口苦。皆風陽浮動。治節橫斜之故也。與沙參蛤粉各四錢。絲瓜絡石菖蒲各一錢。紫苑仙夏旋覆蒺藜各一錢五分。茯苓三錢。丹參二錢。黃連四分。海蛇四兩。鳬茈一兩。服十餘劑。來轉方云。脹痛蠲而腹背皆舒。夜寐安而二便亦暢。酸水不吐。疾出已鬆。是肝已漸柔。惟食少無味。骨節痠疼。右甚。乃陽明虛無以束骨利機關也。擬通養法。參鬚石菖蒲各一錢。茯神絡石各三錢。葱苡四錢。仙夏竹茹各一錢五分。木瓜八分。薑汁炒黃連三分。十大功勞一兩。仲冬招余往遊。復視則諸恙皆安。惟右腰尚疼耳。即於通養方內。加黃柏仙靈脾。服之遂愈。

脈至細數則  
陰竭陽亢不  
拘何病均忌  
此脈而虛勞  
為尤甚

鍾耀輝年踰花甲。在都患腫。起自腎囊。氣逆便溏。諸治不效。急買車返杭。託所親謝金堂邀孟英治之。切其脈。虛象顯然微而弱。詢其溺清且長。曰都中所服。其五苓八正耶。抑腎云理中加茯苓附子之症也。通利無功。滋陰亦謬法。宜補土勝溼。與大劑參朮。果即向安。越八載以他疾終。

一男子患喉痺。專科治之。甫愈而通身腫勢日甚。醫者驚走。孟英診之曰。病藥也。投附于理中湯。數劑而痊。予謂喉痺治以寒涼法原不謬。而藥過于病。翻成溫補之證。是病于藥也。非病于病也。嘗聞孟英云。病于病而死者十之三。病于藥而死者十之七。以予觀之。誠非激論也。吁可歎已。

王小谷體厚善飲。偶患氣逆。多醫咸從虛治。漸至一身盡腫。酷肖回春錄所載康副轉之證。因懲治於孟英。脈甚細數。舌絳無津。聞有讖語。乃真陰欲匱。外候雖較輕於康。然不能收績矣。再四求疏方。與西洋參元參二地二冬。知母花粉茹貝竹瀝葱鬚等藥三劑。而囊腫全消。舉家忻幸。孟英以脈象依然。堅辭不肯承手。尋果不起。

石北涯今正久患齦疼。漸至身面浮腫。或以為虛。或以為溼。病日以劇。氣逆不饑。孟英察脈。左洪數右絃滑。陰分雖虛。先當清其肺胃之疾熱者。投白虎加沙參花粉冬瓜皮枇杷葉厄子竹茹蘆根。服之腫即消。繼佐滋陰。齦疼亦止。

一嫗患面目肢體浮腫。便溏腹脹。腸鳴時痛。飲食日減。醫與理中腎氣多劑。病日劇。

而束手矣。始丐孟英診馬。按脈絃細。沉之帶數。舌絳口乾。腫處赤痛。渴少而熱。乃陰虛肝熱。鬱火無從宣泄而成此病。火愈鬱則氣愈張。氣愈張則津愈枯。再服溫燥如火益熱矣。授白頭翁湯加棟實銀花元參丹皮綠豆皮。危子冬瓜皮數劑。證減知飢漸佐養血充津之品而愈。前此諸醫謂其山居久受濕蒸。且病起霉雨之時。而又便溏脈細。遂不察其兼證而羣指為寒溼也。嗣有黃梅溪令堂患證類此。而燥熱之藥服之更多。肌削津枯。脈無胃氣。邀孟英往勘。不遑救藥矣。

馬翠庭齷尹令寵。患兩腰疼腫。便溏不渴。醫進蒼朮木瓜草薢獨活等藥。其病日甚。不食不眠。筋掣欲厥。孟英切其脈絃滑而數。詢其渴極熱如沸。曰非寒溼也。肝火為患耳。便瀉是土受木乘。不渴乃內有伏痰。予危隣苓蓮茹棟通草半夏蠶砂絲瓜絡草。為方一劑知二劑已。

方氏婦勞傷挾感。業已治愈。服補藥數劑。漸形浮腫。或謂邪未淨而補之早也。用消導清解法皆不應。且兼咳逆碍眠。便溏溲澀。又謂腎氣不納。改從滋填。其勢益增。遂束手矣。况余視之。脉浮無汗。尺靜經行。既非根帶之虛。亦豈邪留誤補。殆愈後復感風邪。肺氣阻痺。水津失布。所謂皮水證也。與香薷杏仁紫蘇橘皮兜鈴射干紫苑通草葱白天泉水蘆火煎服。覆杯而愈。

沈雪江光祿年五十歲。於客臘偶患頭暈。既而右手足麻木。醫進再造丸九十餘顆。

漸至攣曲不伸。針藥無效。仲春余遊檇李。吳門李君雨村招往視之。手足亦腫而疼。便堅。溲赤。口乾舌絳。準頭一瘰磊然。脈象弦滑而數。平時屢有鼻衄。肝陽易動。曲運神機。體質性情陰虛火盛。風自火出。燐液成痰。竄入絡中。則為是證。初起若以竹瀝一味灌之。可以漸愈。乃溫補率投。遂成銅疾。幸而病在經絡。停補尚可延年。苟欲望有轉機。必用清通宣泄。擬方三劑。腫痛稍瘥。議者謂藥太清涼。多服恐妨脾胃。更醫復進溫補。併雨村亦不延診矣。迨四月中旬。大便忽秘。飲食不思。半月餘。更衣極艱。滯而解後。胸次愈形窒塞。遂不食。然參藥不輟也。至五月十八日。復解燥矢。仍不思食。勉強啜粥。輒嘔吐。次日轉為滯下。色如魚腦。日數十行。醫謂有出無入。脾胃兩敗矣。溫補方再加固澀之品。遂鼻衄如注。且有成塊成條之堅韌紫血。自喉間涌出。雖未飲不能下嚥。小溲澀滯不行。時欲呷茶以潤口。或云已傳關格。無藥可施。而引火歸元之法。愈用愈劇。諸醫無策。眷屬惶惶。業辦後事矣。乃弟雲峰侍詔余春日所囑。浼人聘余往援。二十四日余抵。未見其面色枯黧。牙關緊而舌不出齒。脉至右滑左弦細數皆上溢。而尺不應指。胸悶溺澀。陽宜通而不通。是滋膩阻塞氣道也。血溢下利。陰宜守而不守。是溫燥灼爍營液也。吾先慈所謂人身如欹器。滿則必覆。半年蠻補。填滿胃中。設不傾筐倒篋而出。亦必塞死。豈可不加揣測。而誤認為神機化滅之出入廢。關開不禁之下利。陰盛格陽之吐衄。而再施鎮納堵截之藥哉。古云上部有

脉下部無脈。其人當吐。不吐者死。今火熾上炎。鼻血大流。湯水不能下咽。有升無降。與吐何殊。况見證雖危。而呼吸不促。稍能安寐。皆是未絕之生機。考古下利而渴者屬厥陰。白頭翁湯主之。滯下不食者為噤口。參連湯主之余合而用之。加石菖蒲宣氣通陽。石斛芳根生津涼血。一服而利減其半。次日去連柏加元參犀角童便專治其衄。一服血漸少。利漸止。然離絡之血不可不使之出。未動之血亟當使其各安於位。故以西洋參丹參麥冬茯苓菖蒲石斛小麥竹葉梔子甘草稍燕窩等出入三劑。血既止。牙關漸開。苔色黃膩。啜飲必拍膈。始得下行。因參以小陷胸法數劑。自覺身體略輕。手腕稍舒。改清肅肺胃。展氣化以充津。苔漸退。渴亦減。脉較平。守至閏月二十二日。尺脉滑動。於方中加肉蓯蓉麻仁二味。夜間即解。堅黑燥矢。而漸能進粥。隨去麻蓯。加生地。服至六月初七日。口始不渴而喫飲。繼因遇飲西瓜汁。大便溏瀉。復延余住。以六君去朮草加苡蔻數帖而安。隨去蔻加首烏絡石石斛十大功勞。服二十劑。漸能起坐。右腿可以屈伸。但喫而無力耳。中秋後又邀余住。則胃氣已復。右指已伸。皮膚色澤。而右臂未能動。右頰猶覺木硬。是絡中之痰未淨。肝藏之風易生氣血之灌溉流行。因有所阻碍。而不能貫注也。以養血息風蠲痰宣氣之方。加竹懶為嚮導。服後足漸能立。十月間食蟹過多。大解泄瀉。余以六君加藕木香蘇葉調愈。嗣余遊盛湖轉禾適交至節。而天暎不藏。又因勞怒陡發頭暈。嘔吐痰涎。目閉不言。不

食不便。舉家無措。醫者率主首烏牡蠣等滋攝之治。余脉之弦而緩。是中虛不能禦木。故內風上僭。陰柔之品徒滯中樞。不可服也。仍用六君去甘草加菖蒲黃連旋覆花薑皮鉤藤三帖霍然。小寒後余遊姑蘇轉禾。又因天暖而發鼻衄。改換養陰潛陽法而瘳。次年春季出門。因不節勞。至端陽復中而逝。

賢倡橋朱君蘭坡令堂。年已六旬。素患跗腫。夏季患瘧轉痢。痢止而腹之疼脹不休。漸至腕悶。面浮。一身俱腫。偏治罔效。卧牀百日。後事皆備。聞余遊禾。諄乞一診。左極弦細。右弱如無。舌赤無津。呻吟嘔沫。不眠不食。溲短目眵。係肝旺之體。中土受傷。運化無權。氣液兩竭。如何措手。勉盡人謀。方用參鬚石菖蒲仙夏各一錢。石斛冬瓜皮建蘭葉各三錢。竹茹一錢五分。薑汁炒川連四分。陳米湯煎服。詰朝蘭坡忻忻然有喜色。而相告曰。已轉機矣。求再診。余往視。面浮已減。病者蹶然曰。胸腹中舒服多矣。故不呻吟。且進稀粥。按脈略起。遂於原方加冬蟲夏草一錢。烏梅肉炭四分。服後連得大解。色醬而夾蠕蠕之蟲。盈萬腹之疼脹遂蠲。肢腫亦消。舌潤進粥。又邀余診。色脈皆和。喜出望外。初亦不知其蟲病也。所用連梅不過為泄熱生津柔肝和胃之計。竟能暗合病情。殆蘭坡孝心感格。故危險至是可以一二劑取效。謹誌之以見重證。不可輕棄。而余徼幸成功。實深慚恧。將返棹留與善後方。惟加燕窩根薏苡白蒲桃乾而已。冬初余再遊禾。詢其所親云。已出房矣。因索原方案歸錄之。

痞積

陳芟裳患淋久不愈。延至溽暑。邀孟英診之。曰。易事耳。與補中益氣湯而愈。其子荷官病痞積腹脹。發熱乾嘔。善食黃瘦。便溏溺赤。兒科藥廣服無功。已將絕望矣。孟英聞而憐之。曰。吾于幼科雖未討論。姑贈一方。或有生機也。以黃連白芍牡蠣鼈甲雞肫皮五穀蟲霞天麵木瓜山楂棟實橘皮桔梗旋覆花子丹皮等藥投之一劑知旬餘愈。

高若舟偶患腹脹。醫投溫運。漸至有形如痞。時欲衝逆吐酸。益信為虛寒之疾。溫補之藥備嘗飲食日減。其痞日增。肌肉漸消。卧榻半載。甲辰春迓孟英診脈沉絃而與滑。大解不暢。小溲渾短。苔色黃膩。乃肝鬱氣結。鬱則生熱。補則凝痰。與危棟萸連元胡烏藥旋枳雞金鱉甲茹橘芩夏等藥服之。證雖遞減。時此少陽之氣而欲仲之象發寒熱。四肢痠痛。或疑為瘧。孟英曰。此氣機宣達。鬱熱外泄。病之出路。豈可截乎。參以秦艽柴胡豆卷羚羊蠶砂。合法桑枝之類。迎而導之人皆疑久病元虛。藥過涼散。而若舟堅信不疑。孟英識定不感寒熱。漸息攻衝亦止。按其腹尚堅硬。時以龍蒼滾痰丸緩導之。飲食遞加。漸次向愈。若舟善作隸。因集詩品書一聯以贈孟英云。古鏡照神。是有真宰。明漪絕底。如見道心。蓋頌其隔垣之視也。

朱念民患泄瀉。自謂春寒偶薄而飲燒酒。次日轉為滯下。左腹起一痞塊。痢時絞痛。