

秦皇士傷寒大白

卷二

身喘嘔發譫煩潮似
重逆吐狂語躁熱瘧

下畜衄昏口口頭身
血血血焦燥渴眩癢

精校本
斷句

傷寒大白

王大錯署簽

傷寒大白卷一目錄

傷寒熱病總論

驗舌色

驗唇口論

驗二便論

辨脉論

南北方宜發表不同論

南北方宜清裏相同論

三陰熱病論

三陰寒病論

陰症似陽論

陽症似陰論

宜發表忌發表論

宜清裏忌清裏論

宜和解忌和解論

宜吐法忌吐法論

宜溫經忌溫經論

宜攻下忌攻下論

宜消導忌消導論

宜補虛忌補虛論

誤下不宜再下論

惡寒 發熱

寒熱症 身痛

頭痛 項強

咽痛

傷寒大白卷二目錄

似瘧

唇焦

潮熱

衄血

煩燥

畜血

譫語

下血

發狂

嘔吐

喘逆

身重

身癢

頭眩

口渴

口燥

傷寒大白卷三目錄

無汗

自汗

頭汗

盜汗

懊懷

不得卧

發黃

面赤色

胸滿

脅滿

心下滿

結胸

痞滿

咳逆

呃逆

腹痛

傷寒大白卷四目錄

下痢

小便

大便

合病

併病

壞症

附昏冒

熱入血室

不語

發斑

溫病

疫病

夾食

瘧病

陰陽厥

足冷

傷寒大白卷二

雲間秦之楨皇士纂著

似瘧

似瘧者。發作有時而准也。按似瘧與潮熱皆不失時候。但熱不寒者。名潮熱。先寒後熱者。名似瘧。故曰似瘧。表症也。發於晝。邪在陽分。氣分者。輕發於夜。邪在陰分。血分者重。若發於寅卯二時。少陽症也。柴胡湯主之。寒多者。加羌活防風。熱多者。加黃芩山梔。若發於辰巳午三時。或一日一發者。太陽症也。加減羌活湯主之。寒多倍加羌活防風。熱多加黃芩山梔。發於未申二時。或間日一發者。陽明症也。乾葛湯主之。若寅卯先見煩燥。煩熱至未申而熱甚者。陽明而兼少陽也。重加柴胡黃芩。若發時寒多。加羌活防風。熱多加知母石膏。此以時候分各經主治之法也。又有一日一發。惡寒頭痛脈浮而數。為太陽經。即以前方羌活湯。若間日發作。熱多寒少。脈長而大。煩渴消水者。為陽明經。即以前方乾葛湯。加減主之。若寒熱口苦。脈弦而數者。為少陽經。即以前方小柴胡湯。加減服。

之。此又據症據脈分各經主治之法也。寒熱發在午前者表症也。宜發表。寒熱發在午後者邪在半表半裏。一半散表。一半清裏。若但熱不寒發在午後者瘧陽症。宜清裏為急。大凡似瘧發作不愆其期者則非虛熱。不論日數悉作邪治。有表邪惡寒失散表邪。內伏變症有裏邪失治裏邪病必不愈。若發時手足皆冷。甚至麻木。此積熱從內發外風寒束其外裏熱不得發越。是以手足反冷。宜先散表邪。後清積熱。積熱先感伏於內未曾發病風寒後感束於外其病乃發。後感之風寒在外而近故先寒先感之積熱在內而遠故後熱。積熱本病表寒標病近者先治。故凡病先散表後清裏也。若發時胸前或滿或嘔或熱或嘈或痛或惡心。此痰飲內伏故嘔吐也。宜以二陳導痰湯熱令有火加山梔川連沖竹瀝熱服。若胸前飽悶嘔吐不食。此食滯胃家宜以平胃保和散青皮檳榔散草菓飲加白豆蔻川連。若內有積熱忌辛燥者沖蘿蔔汁以似瘧症必夾痰食而起者。故曰瘧家中脘多畜黃水腸胃有痰飲積食至其時則發作。上潮宜先用吐法。隨用導痰湯草菓飲保和散消盡痰積重加檳榔查肉則無瘧母癖塊。

之患。大凡痰飲食積似瘧症。若在熱令發作。雖忌辛溫燥味。又忌生冷抑遏。以此症最易變重。夫瘧疾間日而發。發後清爽。仍能行走飲食。若一日一發。發後身雖涼。不能起身飲食。乃太陽經先寒後熱之寒熱病。非真瘧也。初起先寒後熱。宛似瘧症。夫忌風寒飲食。一熱不涼矣。此症如發熱汗多。表邪不解。久病不愈。直待汗少。方是熱減可愈之機。若一起從來無汗。或汗向少。尚有惡寒表症。直待汗多。方是表邪表散之徵。故曰無汗惡寒。表症也。欲其有汗。散表為先。有汗潮熱裏症也。欲其無汗。清裏為急。如初起胸前飽悶。惡寒發熱。不思飲食。此胃家有滯。直待胸前寬適。飲食能進。方有愈期。若胃強能食。發熱不止。此陽明有熱。必減其飲食。則穀氣不助熱邪。而熱自減。故云日暮微煩。減穀即愈。太陽病得之八九日。如瘧狀。發熱惡寒。熱多寒少。其人不嘔。清便欲自可。一二三度發。脈微緩者。為欲愈也。脈微而惡寒者。此陰陽俱虛。不可更發汗。更下。更吐也。面色反有熱色者。未解也。以其不得小汗出。身必癢。宜桂枝麻黃各半湯。

太陽病得之八九日。一日一發。先寒後熱。如瘧狀。若其人不嘔。清便則裏無邪。當自可。若一日二三度發。則是邪散變輕。而無准期。脈又見微緩。則為自愈。若仍見惡寒表症。而脈微。當知陰陽俱虛。不可更發汗。更下。更吐也。若見面熱赤色。此其表邪未解。未得小汗出。身必發癢。仍當發汗。冬月北方用麻桂各半湯。

南方三時用羌活防風湯。

服桂枝湯。大汗出。脈洪大者。與桂枝湯如前法。若形如瘧。日再發。汗出必解。宜桂枝二麻黃一湯。

服桂枝湯。汗大出。病不解。脈反洪大。又與桂枝湯。又見形如瘧。若一日兩發。此是表邪欲解之象。因桂枝止治風邪。寒邪終不得散。故加麻黃一半。以散寒邪。則汗出而必解。可見太陽似瘧。皆主散表。不比陽明似瘧。有汗下兩條者。

病人煩熱。汗出則解。又如瘧狀。日晡所發熱者。屬陽明也。脈實者。宜下之。脈虛

浮者宜發汗。下之與大承氣湯。發汗宜桂枝湯。

太陽如瘧皆表邪。今日晡發熱。此陽明似瘧之症。故分脈沉而實。宜下之。以大承氣脈若不實而浮。尚是太陽似瘧。而以桂枝發汗也。

少陽篇曰。婦人中風七八日。續得寒熱。發作有時。經水適斷者。此為熱入血室。其血必結。故使如瘧狀。發作有時。小柴胡湯主之。

此條專言女科熱入血室似瘧症。小柴胡湯兼治少陽厥陰。再加引入血分之味。

小柴胡湯 見寒熱頭眩二門

按似瘧症。若發寅卯二時。又見弦數之脈。以此方主治。若惡寒身痛加羌活。無汗加防風。胸前飽悶加枳殼厚朴。草薢白芷。口渴加知母。石膏。乾葛。嘔惡加竹茹。倍半夏。

加減羌活湯 見惡寒

似瘧發於午前。見惡寒身痛。伸欠拘禁。為太陽症。故以此方發表。

升麻乾葛湯

升麻 乾葛 白芍藥 甘草

此治陽明經有汗惡寒之瘧。若無汗去白芍藥。加防風惡寒身痛。加羌活。嘔惡加半夏厚朴。口渴消水加乾葛石羔。胸前飽悶加草薢白芷。薤白虎加桂枝湯。

似瘧症表有寒邪忌白虎裏有積熱忌桂枝。今以石羔之清涼同桂枝亦能散表。桂枝辛熱同石羔亦化清涼。桂枝治先惡寒石羔治後發熱。

二陳導痰湯

半夏 南星 枳實 赤茯苓 橘紅 甘草 石菖蒲

胸前飽悶又見寒熱似瘧。此因痰成瘧故立此方。外感表邪加羌活柴胡乾葛。裏有積熱加山梔黃連白芷菖蒲。

平胃散 見謔語

腸胃溼熱恆發似瘧。若發時胸前飽悶悉以食積主治。兼冒寒邪加羌活柴胡。

葛根防風內兼積熱加山梔黃連枳殼食積重者加查肉一兩青皮三錢嘔吐加竹茹半夏白芷薤

草菓飲

草菓仁 青皮 白芷 甘草 紫蘇 白芷薤 山查 萊菔子

人冒外邪但發寒熱不成瘧症若腸胃先有食積痰涎後又外感風寒則發似瘧故家秘以此消痰積若發時惡寒身痛此後感之表邪急也加羌活柴胡升麻口渴唇焦先感之積熱重也加梔連

不思飲食似瘧不愈消其飲食不助熱邪而熱自除能食而似瘧不愈禁其飲食不助邪熱而熱自減以似瘧之症皆因內有痰飲積熱故耳家秘截瘧飲

羌活 柴胡 升麻 半夏 厚朴 檳榔 青皮 枳殼 木通 查肉
潮熱

潮熱者如潮水之有准而不失其時但熱不寒不若似瘧先寒後熱尚有表症

者發作有時。不若發熱壯熱煩熱常熱不休者。雜症潮熱有實有虛。外感潮熱。惟以陽明腸胃積熱燥屎所致。故潮熱多用清下二法。以裏症多也。然又有分別發於寅卯二時。先有微寒而熱者。此少陽潮熱。無汗脈浮。柴胡防風湯。有汗脈弦。小柴胡湯。大便秘有下症者。大柴胡湯。虛人柴胡引子。發於巳午二時。或一日一發者。此太陽潮熱。脈浮無汗。羌活冲和湯。熱結膀胱。導赤各半湯。重加羌活。發於申未二時。或間日發作者。此是陽明腸胃積熱。宜川連枳殼湯。然脈浮無汗。尚宜乾葛解肌湯。有汗脈大口渴。用葛根白虎湯。若胸前飽悶。右脈弦滑。保和散。重加消導。若大便秘結有下症者。大乾葛湯下之。若腹脹滿作痛。欲大便不得。便手足熱。熱多汗。用三乙承氣湯。潮熱不用發表之方者。以潮熱無表症耳。若表邪未散者。仍用發散。是以潮熱亦有用雙解散。小柴胡湯和解而愈者。未可徒恃清下二法者。總之自汗脈沉數。無表邪之潮熱。宜清裏。不必解表。無汗脈浮大。有表症之潮熱。宜解表。即有裏邪。亦只宜雙解表裏。未可單清裏熱。反礙表邪。即表邪盡解。裏症潮熱如無下症者。未可即下。以上言有表有裏。

之潮熱也。又有外不常熱。每至五更。即覺煩熱。至辰巳或午未申。則內火上冲。或嘔或脹。或作痛。或胸前脅肋一片。每至其時。發熱如火。一日一發。不愆其期。此積熱痰火。內伏作患。從裏發外之潮熱也。宜升麻清胃湯。合枳殼川連湯。梔連二陳湯。加海石瓜樓。清積熱化痰涎。甚至腹作痛。有下症者。導痰湯。加大黃玄明粉下之。若食滯未消。忌寒涼抑遏者。宜保和脾胃散。消食積。若痰食皆消。惟存積熱不解。家祕用乾葛而熱從表解。川連同枳殼而泄大便。川連同木通而清小便。得內外分消之法。此言裏有積熱之潮熱也。又有熱病後。每至申酉。微有潮熱。此名日暮微煩。陽明腸胃積熱未清。二便未滑。又食穀太早。仲景云。損穀即愈。此言戒穀食。并用寒涼微下大腸。損其腹中之穀食。兼清其餘熱。宜用枳殼木通川連大黃黃芩山梔以治之。或梔子豆豉湯。加枳實大黃同食。復主治亦可。

太陽病重發汗。復下之。不大便。舌燥而渴。日晡小有潮熱。從心下至小腹硬滿而痛。手不可近者。大陷胸湯。

此條不治潮熱。但治結胸。故詳註結胸症。

陽明潮熱。大便鞭。可與承氣湯。若不轉矢氣。此但初頭鞭。後必溏。攻之必脹滿不食。

此申明用承氣法。必以轉矢臭氣為糞定硬。若不轉臭氣。其糞初頭一段雖硬。後即是溏糞。若誤攻。腹必脹滿不食。

陽明病。脈遲。汗出不惡寒者。其身必重。短氣。腹滿而喘。有潮熱者。此外欲解。可攻裏矣。手足汗出者。大便已鞭也。大承氣湯。若微發熱惡寒者。外未解也。如熱不潮。未可與承氣湯。若腹大滿不通者。可與小承氣湯。微和胃氣。勿令大泄。

陽明病。脈不浮大。而遲緩。汗出不惡寒。且腹滿潮熱。手足汗出。大便已鞭。可攻裏矣。若尚見發熱惡寒。又無潮熱裏症。未可用承氣湯。即令腹大滿。大便不通。只可與小承氣湯。微和胃氣。勿令大下。

陽明病。譫語。有潮熱。反不能食者。胃中必有燥糞五六枚也。若能食者。但鞭爾。大承氣湯主之。

此以不能食。別有燥屎。以能食。別無燥屎。言陽明熱。本能食。今反不能食。此腸胃中填實無餘地。納穀即大實大滿互詞。故斷其必有燥屎五六枚。宜大承氣湯主之。若能食者。但硬大便。未必有乾結燥屎。未可用大承氣湯。陽明病。譫語發潮熱。脈滑而疾者。小承氣湯主之。與湯一升。腹中轉失氣者。更服一升。不轉失氣。勿更與之。明日不大便。脈反微澀者。裏氣虛也。為難治。不可更與承氣湯也。

陽明病。譫語潮熱。脈沉數者。是下脈。今脈滑疾。尚是浮動表邪之脈。且以小承氣湯服之。察其若轉失氣。仍以小承氣湯更服一劑。若不轉失氣。勿更服。明日不大便。脈反微澀。則裏氣已虛。不可更投承氣湯。故曰難治。

二陽併病。太陽症罷。但發潮熱。手足熱。熱汗出。大便難而譫語者。下之則愈。大承氣湯主之。

太陽症罷。但發潮熱。已無表證矣。汗出大便難而譫語。皆下症。故用大承氣湯。陽明病。脈浮而緊者。必潮熱發作有時。但浮者必盜汗出。