

足本陳修園醫書四十八種

三星書店發行

R2-51
34-2

行之常。散者仍其散之常。充者仍其充之常。血循經常之道。而無吐衄崩下之病。每千古無一人談及。祭於高士宗引而不發處。細繹斯論。大為訝異。人身熱散者難治。三身涼脈靜者易治。若喘咳急而上氣逆。脈見弦緊細數。有熱者得吐者正一外感吐血。先見頭痛惡寒發熱等症。必取微汗則愈。宜香蘇飲加荆芥穗一錢。丹皮白芍各一錢五分。三十五分。

夏令秋令感暑氣燥氣而吐血方治見咳嗽門不贅。

內經云。不遠熱則熱至。血溢血泄之病生矣。凡人不避暑熱。及過食博炙之物。以致血熱妄行。宜四生丸。一百

瘻血而吐。必先胸痛。血色必紫或黑而成塊。脈必滯濇。宜四物湯加醋炒大黃。桃仁。丹皮。香附各一錢五分。如紫血盡鮮血見。卽用六君子湯加當歸調之。九十一出高

一傷寒及溫病。應發汗而不汗之。內熱蓄血。及鼻衄吐血不盡。內餘瘀血。大便黑。面黃。宜犀角地黃湯。九十九

一高鼓峯心法。於血症獨精。其云除瘀血與傷寒外。其餘俱屬七情饑飽勞力等因。必見惡心。驗症分明一味固元湯主之。方用人參。炙耆。歸身。甘草。煨薑。大棗。白芍水煎服。血症最繁。以一方統治。胡念齋深服之。胡念齋云。補藥可用。溫藥亦須急加。附桂炮薑隨宜。一仁齋直指。謂陽虛陰必走。大吐大衄。外有寒冷之狀。可用理中湯加南木香。或甘草乾

薑湯其效更著又有飲食傷胃。胃虛不能傳化。其氣上逆。亦能吐衄。亦宜上二方。余用甘草乾薑湯。其乾薑炮黑。加五味子二錢。甚效。從慎柔五書得來。

一內經云。血氣者。喜溫而惡寒。寒則滯而不流。溫則消而去之。此數語為治血之要旨。所以楊仁齋高鼓峯方法神驗。卽張景岳用熟地一兩。澤瀉附子牛膝各一錢五分。肉桂一錢。炙甘草二錢。水煎服。名為鎮陰煎。方雖駁雜。而溫藥較多。亦能奏效。

一褚氏遺書云。血雖陰類。運之者其陽和平。陽和二字。指心肺而言。其心肺之陽宣暢。如日月一出。爝火無光。凡諸般邪熱之氣俱除。血無所擾。則循行常道矣。運之者三字。更妙。血不自運。必藉氣以運之。既已運矣。則隨衝任而行於經絡。散於脈外。充於皮毛。有經常之道可行。何至妄行而為失血之症耶。諸家俱贊此二句之妙。絕未能發明其旨。甚矣醫道之難也。高鼓峯雖未能悟到此旨。而固元湯與之暗合。慎柔和尚以保元湯為主。亦不過取黃耆補氣以生血。而亦與此旨暗合。合之則效速。二公所以名噪一時也。余於此千慮一得。不敢自祕。保元湯七 保元湯慎柔方無肉桂有
根薑三片黑棗二枚 當歸補血湯六

一血症有不宜剛燥之劑者。或血虛煩渴燥熱。睡寤不甯。五心煩熱。宜聖愈湯八。

一舌上出血如孔鑽者。煎香薷汁服。外用槐花炒研。捲蒲黃灰亦可。掺之。齒齦血出。用生竹茹四兩。醋浸一宿含之。牙縫出血。以紙絳蘸乾蟾酥少許。於出血處按之。立止。滿口齒血出。枸杞子為末。煎湯漱之。然後吞下。根亦可。鼻衄。用生茅花或根一兩。

煎服。以上症或統用甘露飲。八十一

滋腎丸。九十一

一血淋尿血。用苧麻根十枚水煎服。又用海螵蛸、乾地黃、赤茯苓各等分為末。每服三錢。以柏葉車前子煎湯下。又用亂髮燒灰。用麝香少許。用米醋溫湯調下。如痛不可忍。以藕汁蘿蔔汁白蜜調下。又房勞兼小便尿血。宜鹿角膠半兩。沒藥另研。油頭髮繩各三錢為末。茅根汁打麵糊丸。如梧桐子大。每服五十九。鹽湯下。

一下血先便後血為遠血。用竈中黃土八錢。甘草生地白朮熟附子阿膠黃芩各一錢五分。水煎服。名黃土湯。下血先血後便為近血。宜赤小豆三兩。浸令出芽晒。當歸一兩。共為末。以漿水服一錢五分。日三服。名赤小豆當歸散。二方俱出金匱。

一大便下血不止。諸藥不效者。宜濟生烏梅丸。六十一

一皮膚血汙。宜郁李仁去皮研二錢。以鵝梨汁調下。又用人中白培乾。入麝香少許。溫酒調服立效。又用六味地黃湯加五味一錢。麥門冬川續斷各二錢。

一諸竅出血。宜頭髮敗棕陳蓮蓬各等分。俱燒灰研。每服三錢。木香湯下。

一婦人血崩。審其寒熱虛實。照以上諸方擇用。若脫血之嘔。不省人事。大汗不止者。宜參附湯。貧者以當歸補血湯。加熟附子二三錢。一百零五

一大吐大衄大崩之症。血若稍止。急用獨參湯服。服後聽其熟睡。切勿驚醒。則陰血復生矣。

癲狂癇

癲者癲呆之狀。哭笑無時。語言無序。其人當靜。狂者罵詈不避親疎。其人常動。癇者忽然猝倒無知。口角流涎。手足抽掣。或作五畜聲。數刻卽愈。愈後卽如平人。作止有間斷。所以名癇也。皆痰火為病。而癇病多由胎中受驚。一觸而發也。治宜調中。補北瀉南。不必過求奇險。脈實者吉。沉細者凶。

一前症屬於實痰實火者。宜滾痰丸。六十

一肝火之為害。非泛常之藥所可療。時賢葉天士獨得其祕。急用當歸蘆薈丸。每服三十丸。一日兩三服。不可遲疑敗事。九十八

一前症屬虛者。宜磁砂丸。二十 二加龍骨湯加鉛丹二錢。或再加阿膠三錢。二十

此二方神妙。非可以思議及者。

一前症既愈。卽宜以和平之劑收功。宜硃砂安神丸。二十

消渴

口渴不止為上消。治以人參白虎湯。食入卽饑為中消。治以調胃承氣湯。飲一溲一為下消。治以腎氣丸。趙養葵大變其法。謂治消無分上中下。先以治腎為急。以六味丸料一斤。入肉桂一兩。五味子一兩。水煎六七碗。恣意冷飲之。熟睡而渴如失矣。白虎承氣皆非所宜也。喻嘉言曰。腎者胃之關也。關門不開。則水無輸泄。而為腫滿。關門不闔。則水無底止。而為消渴。金匱腎氣丸。蒸動精水上承君火。而止其下入之陽光。彼症取其閩。此症取其闔。一

開一闔。具通天手眼。子和試之。何其陋也。又白茯苓丸治腎消。方用白茯苓覆盆子黃連
括蔞根草薢人參熟地黃元參各一兩。石斛蛇牀子各七錢半。雞胫胫三十具。微炒共為
細末。煉蜜和搗三五百杵。丸如桐子大。每服三十九。食前磁石湯送下。喻嘉言治驗。加犀
角一兩。又以六味丸加犀角收功。按此與八味地黃丸一陰一陽相為表裏。皆為神方。
脈宜數大。忌虛小。

傷食

傷食病必有胸悶吞酸嗳腐腹脹腹痛等症。宜平胃散加麥芽、稻芽、山楂、神曲、蘿蔔子、消
之。或以所傷之物燒灰加入為引導。如初傷時食尚在膈。服此湯以手探吐。如傷之已久。
腹滿拒按。宜三一承氣湯下之。愈後服香砂六君子湯加乾薑調養。若無吞酸嗳腐等症。
但見頭痛惡寒發熱。是外感症。切不可誤用消導之品。致外邪陷入。變症百出。傷寒不禁。
食。故桂枝湯啜粥。是開章第一義。讀仲景書自明。西北之人。一遇頭痛惡寒發熱之症。便云
有食。卽服神曲山楂等藥。往往誤事。余為活人計。不得不大聲疾呼也。脈滑而實。時
書以右闔之上為氣口。謂氣口緊盛傷於食者妄也。

張景岳云。偶病之人。多有非食而疑食者。曰某日曾食某物。或某肉某麪。其日卽病。醫者
不論虛實。但聞此言。且見胃口不開。必先治食。夫未病之人。誰有不食。豈必預為停食以
待病至者。斯可信其無食乎。及其病也。則或因勞倦。或因風寒。或因七情。病發不測。而且

無服無滯。與食何干。藥不對病。而妄行剝削。必反增病。此斯道之莫須有也。由此推之。則凡無據無證。而妄行胡猜者。皆其類也。良可慨矣。

黃履索著折肱漫錄云。五穀皆養補脾氣之物。一燬成炭。反能消食者何。蓋火能軟堅。化物燼從火化故也。諸炭能消食。亦能傷脾。功用不減於山楂神麩。不可忽之以為食物。而多服常服也。愚按今人用白朮炒焦。不知其傷脾。地黃燒炭。不知其傷腎。當以先生之言正之。

瘡疾

寒熱往來有定候。一日一發者邪淺。二日一發者邪深。三日一發者邪更深。先寒後熱者為順。先熱後寒者為逆。自子至午發者為陽。自午至子發者為陰。單寒無熱者名牡瘡。為純陰病。單熱無寒者為禦瘡。為純陽病。瘡病因勞而發者。名勞瘡。因食而發者名食瘡。更有鬼瘡為祟病。瘡瘍是感嵐氣而成。種種不同。總以少陽一經為主。以少陽居陰陽之界。偏陰則寒多。偏陽則熱多。陰陽俱病。則寒熱等。單寒單熱。為陰陽偏造其極。即祟瘡瘡瘍。亦陽氣之虛。正虛不能勝邪。內虛不能禦外。脾胃之陽虛。不能熟腐水穀。俱不離少陽一經。

瘡脈自弦浮弦表邪 沉弦裏邪 滂弦屬熱 過弦屬寒 沟弦屬熱 賽弦食積 吐數雙弦 代散莫收

初起俱宜小柴胡湯。一日一服。五日必愈。方中柴胡一味少則用四錢。多則用八錢。切不可少。此一味。神農推為上品。久服延年益壽之藥。自李東垣及李時珍之書行。此藥之真面目漸掩。張景岳新造五柴胡飲為散劑。更屬無知妄作。流毒非輕。凡初起無汗。

去人參加桂枝三錢。服後食熱粥。溫覆微似汗則愈。未愈再服之。有利無弊。切勿惑於淺人之說。若發熱甚。汗不出。可加麻黃三錢。如病家惑於邪說。牢不可破。卽以杏仁紫蘇防風各三錢。代麻黃。服後溫覆微似汗。不用食粥。上下午瘡不必過分。惟以寒多者屬陰盛。加桂枝三錢。生薑宜倍用之。或再加吳萸三錢。單寒無熱者亦用此法。或去黃芩。再加熟附子三錢。熱多者屬陽盛。加知母貝母各三錢。汗多而大渴大熱者。加生石膏五錢。麥冬三錢。粳米四錢。單熱無寒者亦用此法。或再加知母三錢。先熱後寒者名瘡瘍。治同。宜加桂枝二錢。是從金匱白虎加桂枝湯中倣出。鬼瘡脈乍大乍小。加藿香二錢。以香為天地之正氣。正能勝邪也。天麻三錢。以天麻形如魁羊。有二十四子。周環於外。其苗名赤箭。取弧矢以示威之義也。瘡瘍加蒼朮藿香各二錢。食瘍以平胃散採入柴胡一味為君。融合二方為一方。卽前人複方法也。勞瘍是虛人不能耐勞。而病瘍。宜小柴胡原方去半夏。加括蔥根二錢。或佐以補中益氣湯。一切瘍疾口渴。俱去半夏。加括蔥根以生津液。凡一切瘍疾。欲急於取效。俟三發之後。以小柴胡湯加常山三錢。寅時服。渣再煎。於辰時再服。如吐。任其吐去。痰涎自愈。時醫惑於俗傳本草謂常山是截瘍猛藥。邪未盡而強截之。多變他病。此無稽之臆說也。蓋常山從陰出陽。為透邪外出之良藥。仲景用其苗名為蜀漆。今人用其根。何嘗是強截之藥。一久瘍不愈。及三陰瘍三日一發者。諸藥不效。惟以白朮一兩。或二兩。加生薑五七錢水。

煎一杯於寅時服之。渣再煎於上午再服。如熱多者以當歸一兩餘代白朮。如脾胃
兩虛諸藥不效者用近效白朮湯。一日兩服。服到十日必愈。書成友人自安徵回。贈余
附經也。中有三陽交於膽。三陰交於脾。三陽之瘡治膽。三陰之瘡治脾。向真是
名言。可佩。此君若得名師益友而講論之。將來為醫中一大巨擘。恨未晤其人。

一初病瘡世稱胎瘡。纏綿難愈。與痘疹之症本於胎毒無異。宜六君子湯加草菓烏梅或

合小柴胡湯。

一久瘡不愈不必治瘡。只以六君子湯補中益氣湯。兼在桂附八味丸調理半月。無不痊
愈。今醫俱遵景岳法。用何人飲休瘡飲。方中以何首烏一兩為主。據云中和之道。其實
苦澁之品不能養人。余屢見久服此藥多變出腫脹等病。學者不可不知。

痢疾

下利穢濁膠粘似膿似血。小腹隱痛。欲便不便。裏急後重是也。舊說偏寒偏熱。主補主攻。
皆不可拘執。惟所列死證數條緣時醫治不得法。流連致死。或過信前醫之說。棄而不治。
坐視其死。余目擊心傷。日夜焦心。從內經仲景言外之旨。及散見於各條之下。一一體認。
而參以所治之症。大有所悟。藥到病瘳。厥效彰彰可紀。請先言救逆之道。而次及恆法。
一醫書云。脈沉小者易治。脈浮大者難療。又云發熱不休者死。此遵內經腸澼一論。執一
不通之過也。余別有所悟。脈浮為表。邪浮而兼大。是表邪侵於陽明之界而下利。仲景
有葛根湯等治法。發熱不休。非感冒風寒。即是經絡不和。宜用桂枝湯當歸四逆湯祛。

殺

風寒以調經絡人參敗毒散加老米名倉廩湯亦是此意。但藥方輕薄不能速效耳。大抵初病治法發熱惡寒者香蘇飲加防風川芎以取微汗則愈。重必用桂枝湯當歸四逆湯之類。若寒熱往來多嘔者必用小柴胡湯。若熱多而口渴者小柴胡湯去半夏加括薑根主之。若發熱不惡寒裏急後重者以葛根黃芩黃連甘草湯照古法先煎葛根後煎諸藥日服二三劑必愈。若用痢門方如芍藥湯之類其邪無不陷入變危者余深恨倪氏痢疾三方為救人之具。

一醫書云腹痛不休者死。按其治法不過用木香檳榔砂仁及消食行滯之品安能以救死症。若果消渴口中熱胸腹脹滿堅實而拒按為實症。三承氣湯可以擇用。或以三一承氣湯代之。若果不渴口中和脈遲小而無力或手足冷腹痛而喜按為虛寒症非四逆湯不可。若腹痛而下利重滯者再加白芍三錢。如腹痛不止虛煩而喜按脈弦者為肝邪犯土宜小建中湯服一時許即以小柴胡湯去黃芩加白芍藥繼之神效。

一醫書云下痢純白者死。下痢如屋漏水者死。按其治法不過用阿膠地榆槐花營虎之類安能以救死症。如果下奔鮮血口渴便短裏急後重脈盛者為火症宜白頭翁湯一日兩服。虛人及產後加阿膠甘草亦有下鮮血而非火症者。若血帶黯而成塊者屬熱者少屬寒者多俱宜從脈症細辨之。若口中和脈細小便長手足冷者屬虛寒無疑宜以理中湯加竈心土八錢主之下血多者宜間服黃土湯一日二服三日漸愈益以脾

胃如分金之爐。理中湯分其清濁。是治其本源也。屋漏水。卽血水之黯滯。不稠者為虛寒症。誤用寒涼攻破所致。若見咽痛。語言無序。半日必死。亦用理中湯救之。

一醫書云。能食者輕。不食者重。絕食者死。發嘔者死。蓋不能食有食滯。卽宜以平胃散加消導之藥。若脾胃虛弱。卽宜用香砂六君子湯。及理中湯。健脾以運胃。又有辨於其微者。不飢而不思食者。是脾病。宜以上二方。飢而不能食者。是肝病。宜烏梅丸。至於絕食頻嘔。即是噤口痢。丹溪用人參石蓮肉黃連煎湯。入生薑汁徐徐呷之。只認作濕熱上衝之症。故不效。宜參上諸法治之。若食入卽吐。不利於香砂橘半者。宜用乾薑黃連黃芩湯。苦辛以開柜格。若胸滿而吐。及乾嘔吐涎沫者。宜吳茱萸湯。溫鎮以和土木。其效如神。凡心下痞滿。從仲景三瀉心湯。及厚朴生薑甘草半夏人參等湯擇用。如神。一醫書云。婦人新產卽發痢者死。余故金匱白頭翁湯。加甘草阿膠之例。可知產後宜照病用藥。毫無顧忌。又云小兒出痘後。卽發痢者死。余以為不盡然。大抵產後失於過溫致死。痘後失於過寒致死。俱因病而藥之。不必泥於一說。

恆法

一痢疾無外症惡症。但見裏急後重。便膿血者。三日內俱宜芍藥湯。六十

一痢疾腹中撮痛。或下血片。及噤口惡痢。諸藥不效者。宜斗門秘傳方。七十

一痢疾不論新久。以陳米湯送下香蓮丸二錢。一日三服。極驗。至於久痢。以四君子湯。六

君子湯補中益氣湯十全大補湯送下法本薛氏多效

一久痢諸藥不效。審其為虛脫不禁無餘邪者。宜真人養臟湯。

五十七

一久痢流連不愈。愈而又作。名為休息痢。是兜濬太早。餘邪未盡。宜羊脂四錢。白蠟三錢。黃連末三錢。白蜜八錢。烏梅肉炒研末二錢。血餘灰三錢。煎攪為丸。丸如桐子大。以米飲送下三十九日三服。此孫真人法也。又有服補中益氣湯不應。反下鮮紫血塊者。此久風成飧泄。風氣通於肝。肝傷不能藏血也。宜玉屏風散去白朮倍防風。加羌活葛根升麻主之。玉屏風散

六十

一洞泄寒中注下水穀。赤痢白痢。食已卽出。食物不消者。宜聖濟附子丸。

七十

時疫

修園
新訂

程山齡云。時疫之症。須知有來路兩條。去路五條。何謂來路兩條。疫有在天者。在人都如春應溫而反寒。夏應熱而反涼。秋應涼而反熱。冬應寒而反溫。非其時而有其氣。自人受之。皆從經絡而入。或為頭痛發熱咳嗽。或脰腫發頸大頭風之類。斯在天之疫也。若一人之病染及一室。一室之病染及一鄉。以及闔邑病氣穢氣。互相傳染。其氣從口鼻而入。其見症增寒壯熱。胸膈飽悶。口吐黃涎。乃在人之疫。以氣相感。與天無涉。所謂來路兩條者。此也。夫在天之疫。邪從經絡入。寒多者治以辛溫。宜五積散。熱多者治以辛涼。宜九味羌活湯。審其氣虛不能作汗者。宜人參敗毒散。熱甚格邪不作汗者。宜防風通聖散。若發頸

及大頭症。是風火相乘而為毒。宜防風通聖散。加牛蒡子、金銀花、桔梗、貝母、瓜蒌仁之類。俾邪從經絡入者。仍從經絡出。此以發汗為去路也。在人之疫。邪從口鼻入。或香蘇飲加玉竹川芎。忍冬。或神木散加葛根葱頭。或藿香正氣散之類。俾其從口鼻入者。仍從口鼻出。此以解穢為去路也。至於經絡口鼻所受之邪。傳於陽明之經。則為自汗。大渴大熱。班黃等症。宜甘露飲生其津液。以為勝邪回生之本。甚者必用人參白虎湯。以清陽明散漫之熱。此以清火為去路也。如入於胃腑。則為譁語發狂。大便實。小腹拒按等症。宜三一承氣湯下之。或內有實熱。外有實邪者。宜防風通聖以而解。此方疫症第一良方。用之得法。不論新久。頭頭是道。此以攻下為去路也。復有虛人患疫。或病久變虛。或誤治變虛。須用四物湯。四君子湯。補中益氣湯等加減。此以補養托邪為去路也。要之疫症必從大汗而解。人壯者不戰而汗。人虛者必戰慄而後大汗。汗未徹者。俟七日後而又作汗。以上五法。該於發汗一法之中。散邪是發汗正法。而穢濁之氣襲經絡。不以辛香解之。則汗不出。火邪內燔。血乾津涸。非清火則陰氣不滋。而汗不出。胃氣壅塞。不攻其實。則濁氣不解。而汗不出。汗由液化。其出自陽。其源自陰。非補養陰陽。則氣血不充。而汗不出。此發汗一法。為治疫大關頭。有汗則生。無汗則死。若治之失法。或涸其汗源。或強迫使汗。皆枉其死也。可不慎哉。未汗宜陽脈忌陰脈。已汗宜陰脈忌陽脈。

避疫法

避疫之法。惟在節慾節勞。仍勿忍飢以受其氣。膽為中正之官。膽氣壯則十一經之氣賴以俱壯。邪不能入。醫統云。男人病邪氣出於口。女人病邪氣出於前陰。其對坐之間。必須識其向背。或以雄黃塗鼻孔中。從容察位而入。

暑症

潔古謂動而得之為中熱。靜而得之為中暑。暑陰而熱陽。未免稱名不正。蓋夏日炎炎。人觸之則生暑病。即為中熱。無非動以得之。他若畏熱求涼。涼襲於外。則為發熱惡寒。頭痛項強等症。宜九味羌活湯以散之。涼中於中。則為吐瀉腹痛。宜理中湯以溫之。若兼煩躁。則間用涼水調下大順散。病雖作於暑月。不得以暑病名之也。大抵暑症辨法。以口渴煩心溺赤。身熱脈洪而虛為的。輕者為傷。以六一散蕩滌熱氣。從小便而泄。若暑熱閉鬱而無汗。必用香薷飲。發越陽氣。微上微下。解表兼利小便。則愈重者為中。大渴大汗。宜白虎加人參湯主之。或汗出身熱。而兩足冷者。是暑而挾濕。宜白虎加蒼朮湯主之。若中暑昏悶不醒。並伏暑停食吐瀉。用半夏四兩。醋煮茯苓甘草各二兩。共為末。以生薑汁為丸。如菜豆大。每服五六十九。開水送下。若昏憒不醒者。研碎灌之立甦。此孫真人之神方也。消暑丸。為暑症第一神方。至於生脈散。清暑益氣湯。為暑傷元氣而立。或預服以却暑。或病愈後以收功。非暑病正方也。

六一散五
香薷飲四十

清暑益氣湯九
生脈散七

濕病

濕有從外入者。有自內得者。陰雨濕地皆從外入。其症頭重腰冷。一身盡重。冷漿瓜果。皆自內得。其症泄濁腹脹。腸有水氣。淋濁痰飲。然外濕亦可漸入於內。內濕亦有浸漬於外。失此不治。則鬱而為熱變症多端。不可不察。

濕脈多緩。

是怠緩非和緩。

浮大者易治。

沉細小者難醫。

一內外濕。總方宜二陳湯加蒼朮白朮羌活主之。外濕加紫蘇防風。猪苓澤濁乾葛木瓜主之。內濕加木通澤濁砂仁木香。食積加山楂麥芽枳實。寒濕加乾薑。濕熱加黃連。黃芩。熱輕者只用連翹。檳榔時嚼亦妙。

八十一

一受濕腰痛。其痛冷重沉著。如帶五千錢。宜腎著湯。

八十

一白濁不止。為濕熱下注。婦人白帶亦然。宜萆薢分清飲。如婦人白帶。加半夏苡實苡仁黃柏生白朮主之。

八十二

一傷濕一身盡痛。不可轉動。宜一味白朮酒。

五十五

一蒼朮多脂易黴而治濕。與殭蠶死於風而治風。驢皮動火。製成阿膠而降火。俱是造物妙處。卽大易所謂同氣相求。內經所謂衰之以其屬是也。蓋濕邪在人腸胃。原自不安。一得蒼朮。氣味便與之合。一氣從汗出。味隨水穀下行。先誘之而後攻之也。

頭痛

大抵暫痛為邪。久痛為虛。邪則分寒熱而除之。虛則審陰陽而補之。然亦有久痛為邪所

經新痛因虛而發者當因脈證而辨之。脈浮滑者生。短濇者死。

一傷寒六經俱有頭痛太陽痛在腦後必連項強宜九味羌活湯加葱白三根。陽明痛在額前必連目眶宜升麻葛根湯少陽痛在側必兼兩脇痛多嘔宜逍遙散去白朮加半夏黃芩川芎。太陰無頭痛然濕土動而生痰亦為頭痛宜二陳湯加製南星蒼朮川芎。少陰頭痛脈細但欲寐宜五積散加細辛附子。厥陰頭痛如破乾嘔吐涎沫宜吳茱萸二錢人參一錢五分生薑四錢大棗四枚水煎服名吳茱萸湯。

一火邪頭痛火盛者宜竹葉石膏湯加減方見傷寒如火勢輕者只用辛涼之品火鬱發之之義也宜加味逍遙散加葛根二錢酒炒黃柏一錢薄荷五分四十

一氣實有痰或頭重眩暉用大黃酒炒三遍為末茶調三錢服此釜下抽薪之法也。

一偏頭痛宜二陳湯偏在右者加沙參二兩酒炒黃芩黃連川芎防風製南星之類偏在左者加當歸一兩川芎白芍白芷柴胡防風之類二十八

一氣虛頭痛宜補中益氣湯少加川芎蔓荆子之類五

一血虛頭痛宜四物湯倍川芎加黃柏知母少加蔓荆子細辛之類九當歸補血湯加鹿茸五錢水酒各半煎六

一眉棱角痛宜半夏六錢生薑三片水煎調沉香末五分服
一真頭痛痛甚腦盡痛手足寒至節不治然不忍坐視其死急灸百會。吞黑錫丹三十

一腎虛頭痛諸藥不效。宜六味湯去丹澤加枸杞三錢。萸甘草細辛各一錢。川芎二錢。內
旋蓉三錢五分。如命門火虛者用八味湯加減如上法。十四

一蒸法最效。方用川芎半兩。晚蠶沙二兩。殼蠶如患者年歲之數。以水五碗煎至三碗。就
砂鍋中以厚紙糊滿中間。開錢大一孔。取藥氣薰蒸痛處。每日一次。雖年久者三五次
永不再發。

瘻瘍

普明子曰。瘻瘍者肝病也。肝主筋。肝經血燥有火。則筋急而生瘻瘍。多生於耳前後者。膽
之部位。膽與肝相表裏。其初起即宜消瘻丸。消散之。不可用刀針及敷滑爛之藥。若病久
已經潰爛者。外貼普救萬全膏。內服消瘻丸。並逍遙散。自無不愈。更宜戒惄怒。斷煎炒。及
發氣閉氣諸物。免致膿水淋漓。漸成虛損。患此者可毋戒與。
新採消瘻丸。此方奇效。治愈者不可勝計。予亦刻方普送矣。

元參熟地黃、牡蠣煅、牡去心蒸、貝母各四兩共為末。煉蜜為丸。每服三錢。開水下。日二服。

愚按普明著醫學心悟一書。逐末亡本。用之鮮效。惟此方平淡而神奇。當共寶之。但耳
前後為少陽部位。渠云肝之部位者誤也。故改正之。

眩暉

內經云。上虛則眩。又云腎虛則高搖。髓海不足則腦轉耳鳴。皆指不足而言。仲景論眩以