

天竺黃 二錢 甘草 五分 麝香 少許

右為細末煉蜜丸如芡實大每服半丸不拘時生薑湯化下
木通散 治小兒肝心有熱驚悸用此藥瀉肝風降心火利驚

熟

羌活

山梔子

各二錢

大黃

煨

木通

赤茯苓

甘草

各一錢

右剉每服二錢入紫蘇葉些少水一盞煎至五分不拘時服

癩

嬰驚癩卽急驚之證但驚癩發時仆地作鼈醒時吐沫急慢驚

則不作鼈不吐沫也 **仁齋**曰癩小兒之惡候也蓋小兒血脉

不斂氣骨不聚為風邪所觸為乳哺失節停結癖積而得之其

候神氣拂鬱瞪眼直視面目牽引口噤流涎腹肚膨脹手足搐掣似死似生或鼈或啞或項背反張或腰脊強直但四體柔弱發而時醒者爲癇若一身強硬終日不醒則爲瘖證矣

陰陽二癇陽癇初作時病先身熱痙瘓驚啼叫噉而後發脉浮者爲陽癇乃急驚也內在六腑外在皮膚爲易治 若病先身

冷不驚瘈不啼呼而作脉沉者爲陰癇乃慢驚也此病內在五藏外在骨髓劇者難治 曾陽癇者因感驚風三次發搐不與

去風下痰則再發然三次者非一日三次也或一月或一季一

發驚搐必經三度故曰三次所謂驚風三發便爲癇卽此義也

其病主身熱自汗兩目上視嚼沫咬牙手足掣擗面色紅紫六

脉浮數以百解散加五和湯水煎疏解次下痰用水晶丹或半

夏九 陰癇者因慢驚後去痰不盡痰入心包而得四肢逆冷吐舌搖頭口嚼白沫牙關緊閉但不甚驚搐作啼面色或白或青脉息沉微故嬰孩寶書云睡中吐舌更搖頭正此之謂治以固真湯加曰生湯同煎調寬氣飲和解

風驚食三癇千金云小兒之癇有三風癇驚癇食癇也風癇緣衣煖汗出風因入也初時先屈指如數物乃作驚癇起于驚怖大啼乃作食癇其先不哺乳吐而變熱後發然風癇驚癇時時有之十兒之中未有一二凡是先寒後發熱者皆食癇也驚癇皆按圖灸之風癇當以猪心湯食癇當下乃愈紫霜丸佳 按此論三癇蓋有三因之分風癇屬外因驚癇屬內因食癇屬不內外因也又按全嬰方云風癇因將養失度血氣不和或厚衣

汗出腠理開舒風邪而入之其病在肝肝主風驗其證目青面
紅發搐宜驅風膏大青膏琥珀散鎮驚藥有熱四順飲退後與
驚利丸下其痰涎驚癇因血氣盛實藏府生熱或驚怖大啼精
神傷動外邪所入爲之其病在心心主驚驗其證忽然叫發
搐宜琥珀散紅龍散鎮心丸有熱四順飲利驚丸下之不生別
病也食癇其病在脾脾納食驗其證噉吐酸氣卽發搐此病或
大便酸臭紫九子下之已上三證大同小異並屬陽也各目睛
鮮斜手足潮搐或作猪聲發過卽差皆十生一死也
五藏癇三因云古方有五癇五藏癇六畜癇等名證不同難于
備載別錄有五癇之證一曰馬癇作馬嘶鳴以馬屬在午手少
陰君火主之故其病應于心二曰羊癇作羊叫聲以羊屬未足

太陰濕土三之應土八三日雞癰作雞叫散以雞屬酉足陽明
燥金主之應平胃四日猪癰作猪叫散以猪屬亥手厥陰心包
主之應平右腎五日牛癰作牛吼散以牛屬丑手太陰濕土主
之應平肺此五癰應乎五畜應乎五藏者也發則旋暈顛倒口
眼相引目睛上搖手足搐搦背脊強直食頃乃甦各隨所感施
以治法 **錢**凡治五癰各隨藏治之每藏各一獸犬癰反折上
竄犬叫肝也羊癰目瞪口呆吐舌羊叫心也牛癰目直視腹滿牛叫
脾也雞癰驚跳反折手縱雞叫肺也猪癰如尸吐沫猪叫腎也
五癰重者死病後甚者亦死輕者五色丸主之 **薛**面赤目瞪
吐舌齧舌心煩氣短其散如羊者曰心癰面青唇青两眼上
竄手足攣掣反折其散如犬者曰肝癰面黑目振吐涎沫形

體如尸其殼如猪者曰腎癰 面如枯骨目白反視驚跳反折
搖頭吐沫其殼如雞者曰肺癰 面色痿黃目直腹滿自利四
肢不收其殼如牛者曰脾癰 五癰通用五色丸爲主仍參以
各經之藥 心痛屬血虛者用養心湯發熱飲冷爲實熱用虎
睛丸發熱飲湯爲虛熱用妙香散 肝癰者虛證用地黃丸抽
搐有力爲實邪用柴胡清肝散大便不通用瀉青丸 腎癰者
用地黃丸紫河車丸之類腎無瀉法故徑從虛治之 肺癰者
屬氣虛用補肺散面色痿黃者土不能生也用五味異功散面
色赤者陰火上衝于肺也用地黃丸 脾癰者用五味異功散
若面青瀉利飲食少思用六君子加木香柴胡 按千金叙六
畜癰無五藏之分屬錢氏始分之而無馬癰一證曾氏謂初發

作羊犬齧者咽喉爲風痰所梗齧自如此其理甚明言六畜者特強名耳故丹溪謂子經旣無所據而治法亦未見有五者之分所以不必分五也

治法仁齋曰大槩血滯心竅邪氣在心積驚成癇通行心經調平血脉順氣豁痰乃其要也假令小兒有熱有痰不欲乳哺眠睡不安常常驚悸此皆發癇之漸卽以紫霜丸導之方見變時

間量與紫霜丸減其盛氣則無驚風癇釣之患癇證方萌耳後高骨間必有青紋紛紛如線見之則爲爪破須令出血啼叫尤得氣通諸癇發不能言者蓋咽喉爲氣之道路風傷其氣以掩聲音道路之門抑亦血滯于心心竅不通所致耳南星炮爲末雄猪膽汁調和少許啖之輒效若夫錢氏五癇丸并南星散以

菖蒲煎湯調下甘遂猪心湯和蘇合香丸一丸皆治癰之要藥

也 〔劉〕小兒神尚弱驚則神不守舍空則痰涎歸之或飲食有

失節脾胃有傷積爲痰飲以致痰迷心竅而作者治法當尋火

尋痰而前人多用鎮墜清心之藥固可以治熱可以清痰若以

頑痰膠固者此藥未易驅逐在上者必用吐吐後方宜服此藥

有痰實在裏者亦須下之隨病輕重而用之也 〔潔〕如有客痰

發熱而有酸煎大黃荆芥湯下五色丸 潮熱有時積熱也桃

枝丸主之 方見積熱壯熱不退常用地骨皮散 方見潮熱下五色丸 用

熱當用防風黃芩湯下大青膏 身溫不熱當用白虎湯加蒼

朮下五色丸 〔薛〕此皆元氣不足之證須以紫河車 卽小兒胞衣 丸

爲主而以補藥佐之設若泛行尅伐復傷元氣則必不時舉發

久而變危多至不救 一老人生子方週歲秋初暴冷忽發搐
似驚癇過則氣息淹淹此元氣虛弱所致與補中益氣湯而愈
一小兒十歲一小兒七歲各有癇證歲發二次後因出痘及
飲食停滯發頻數用六君子補中益氣二湯而愈 一小兒
患前證每發吐痰困倦半餉而甦諸藥不應年至十三而頻發
用紫河車生研爛入人參當歸九如桐子大每服三五十九日
進三五服乳化下一月漸愈又佐以八珍湯全愈 一小兒七
歲發驚癇每作先君令其恣飲人乳後發漸疎而輕至十四歲
復發仍用人乳不應余令用肥厚紫河車研爛人乳調如泥日
服二三次至數具而愈後常用加減八味丸而安至二十三歲
發而手足厥冷仍用前法佐以八味丸十全大補湯而痊

通治五癰錢氏五色丸

朱砂

研半兩

水銀一分

雄黃

熬一兩

鉛

三兩同水銀熬

真珠末

研一兩

右煉蜜丸如麻子大每服三四丸金銀薄荷湯下

三因六珍丹

雄黃

雌黃

朱鑽珍珠

各一兩

鉛

二兩熬成屑

水銀

一兩半

右研令極勻蜜丸桐子大每服三九至五九薑東湯下須搗

二三萬杵乃可丸

風癰口議云先用化痰寬利胸膈開通閉竅安鎮心神然後與

治風癰藥服之又云先用化痰風丹去其風熱次服奪命散定痛

散風丹 治小兒風癰先用此藥

牛膽南星 二錢

羌活

獨活

防風

天麻

人參

川芎

荊芥穗

細辛 各一錢

右為末煉蜜為丸如梧桐子每服一丸用薄荷湯紫蘇湯不拘時送下

保安丸 治小兒諸風癰久後亦驗

五靈脂 半兩

川烏 生用去皮半

右為末猪心血為丸如梧桐子大每服一丸用生薑湯化下不拘時服

獨活湯 治小兒風癰解表通裏

獨活

麻黃去節

川芎各一錢

大黃

甘草各半錢

右剉碎每服二錢用水一鍾生薑二片煎至四分不拘時溫

服

細辛大黃湯治小兒風癰肉熱

天麻

防風各半

細辛

大黃焙

川芎

各二錢半

甘草

炙一錢半

右剉碎每服二錢入犀角少許用水一鍾煎至四分不拘時

服

牛黃丸治小兒風癰迷悶抽搐涎潮

牛膽南星

全蝎

焙去毒

蟬殼

各二錢半

防風

牛黃

白附子

生

在僵蚕

炒去絲嘴

大麻

各一錢

麝香 半錢

右爲末以水煮去皮核取肉和水銀半錢研極細次入藥末和丸如菜豆大每服三五丸用荊芥生薑煎湯送下不拘時服

化鳳丹 涼風化痰退熱定搐

牛膽南星 二錢

羌活

獨活

天麻

防風

甘草

荊芥穗

人參

川芎

各一錢

右件爲末煉蜜爲丸如皂子大每服一丸薄荷湯化開服

方一

有全蝎一枚一方有細辛無甘草

驚癇口議先涼三焦利驚去熱安神定志平調府藏溫化痰涎

然後與治驚風藥服之

比金丹

人參

白茯苓

遠志去心

山藥

辰砂

天麻

石菖蒲

川芎

甘草

炙各一分

天南星

炮二錢生薑汁製

右為細末煉蜜為丸皂子大每服一粒煎金銀薄荷湯化下

一方有琥珀二錢

青黛二錢

無山藥

錢氏蛇黃丸治驚癇因震咳恐怖叫號恍惚是也

蛇黃

真者三箇火煨醋淬

鬱金

七分一處為末

麝香

另入一匙

右為末飯丸桐子大每服一二丸煎金銀磨刀水化下

鎮驚丸 治小兒一切驚癇

茯神 去木

鉄粉

遠志 去心薑製焙

紫英石 燒醋淬

人參

琥珀

滑石

蛇黃 煨醋淬

南星

炮各二錢半

龍齒

熊膽 各半分

輕粉 三分

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大朱砂爲衣每服三五丸煎

金銀湯磨化不拘時服

虎睛丸 治小兒驚癇邪氣入心

虎睛 細研

犀角 鎊

遠志 薑製焙去心

大黃 溼帛裹煨

石菖蒲

麥門冬 去心各二錢半

蜣螂 三枚去足翅炒

右爲細末粟米粉打和爲丸如梧桐子大每服五七丸竹葉煎湯磨化或金銀煎湯亦可不拘時服

七寶鎮心丸 治小兒驚癇心熱

雄黃 鐵粉 琥珀 遠志去心薑製焙各二錢

朱砂一錢 麝香少許 金銀箔四片

右為細末煮束取肉為丸如梧桐子大每服三五丸煎去心

麥門冬湯化下不拘時服

清神散 治小兒驚癇

犀角 白蘇皮 石菖蒲 遠志去心薑製焙

半夏泡各二錢半 茯神半兩 大黃焙 人參

甘草炙各一錢半

右為末每服半錢煎去心麥門冬湯調不拘時服

食癇妙聖丹 治小兒食癇通利