




外科正宗目錄

卷一

癰疽原委論第一

癰疽治法總論第二

癰疽陽症歌第三

癰疽陰症歌第四

癰疽半陽半陰症歌第五

癰疽五善歌第六

癰疽七惡歌第七

治病則例歌第八

癰疽灸法并禁灸瘡穴第九

論病生死法第十

察形色順逆十一

病有三因受病主治不同論十二

調理須知十三

雜忌須知十四

卷二

瘡瘍看法十五

腫瘍治法十六

腫瘍主治方十七

潰瘍治法十八

潰瘍主治方十九

卷三

癰疽圖形二十

癰疽諸名歌二十一

腦疽二十一

卷四

發背二十三

疔瘡二十四

脫疽二十五

卷五

凍瘡二十六

贅疽二十七

卷六

咽喉二十八

時毒二十九

癰瘤三十

肺癰三十一

卷七

流注三十二

乳癰三十三

附骨疽三十四

卷八

腸癰三十五

臍毒三十六

痔瘡三十七

下疳三十八

魚口便毒三十九

卷九

囊癰四十

懸癰四十一

臀癰四十二

楊梅瘡四十三

結毒四十四

多骨疽四十五

陰瘡四十六

卷十

傷寒發頤四十七

痼發四十八

療疽四十九

小腹癰五十

鵠口疽五十一

龍泉疽虎鬚毒五十二

石榴疽五十三

穿踝疽五十四

大麻風五十五

翻花瘡五十六

腋癰五十七

脅癰五十八

鼻痔五十九

骨槽風六十

紫白癰風六十一

齒病六十二

腦漏六十三

破傷風六十四

跌撲六十五

金瘡六十六

杖瘡六十七

竹木刺六十八

湯潑火燒六十九

甲疽七十

繭脣七十一

痞癰七十二

天蛇毒七十三

頭痛七十四

合谷毒七十五

鼻出血七十六

牙縫出血七十七

血箭血瘰七十八

卷十一

鵝掌風七十九

腎囊風八十

疥瘡八十一

癩瘡八十二

血風瘡八十三

頑癬八十四

膿窠瘡八十五

火丹八十六

天泡八十七

肺風粉刺酒戲鼻八十八

雀斑八十九

汗斑九十

油風九十一

白屑風九十二

耳病九十三

漆瘡九十四

痊癰瘡九十五

疥癬九十六

痰包九十七

癩風九十八

溼腫九十九

女人面生鰲黑斑一百

鈕釦風一百一

枯筋箭一百二

婦人腳丫作癢一百三

手足破裂一百四

眼丹一百五

眼胞菌毒一百六

黑子一百七

體氣一百八

白禿瘡一百九

奶癰一百十

蟾拱頭一百十一

小兒遺毒爛斑一百十二

螻蛄串一百十三

小兒痘風瘡一百十四

小兒赤遊丹一百十五

走馬疳一百十六

重舌一百十七

胎瘤一百十八

鵝口瘡一百十九

痘癰一百二十

痘疔一百二十一

黃水瘡一百二十二

卷十二

大人口破一百二十三

唇風一百二十四

臭田螺一百二十五

牛程躑一百二十六

蜣螂蛙一百二十七

田螺泡一百二十八

皴痛一百二十九

凍風一百三十

陰蝨一百三十一

蒲桃疫一百三十二

咬傷一百三十三

風犬傷一百三十四

惡蟲叮咬一百三十五

百蟲入耳一百三十六

誤吞針鐵骨哽咽喉一百三十七

人面瘡一百三十八

陰毒一百三十九

失榮症一百四十

中砒毒一百四十一

落下頷拏法一百四十二

救自刎斷喉法一百四十三

試知百病死生法一百四十四

造孽報病說一百四十五

仙方活命飲今古不同論一百四十六

拾遺症一百四十七

綳縛背瘡法一百四十八

癰疽內肉不合法一百四十九

煉元明粉法一百五十

煉金頂砒法一百五十一

煉硝石法一百五十二

取蟾酥法一百五十三

製附子法一百五十四

昇白靈藥法一百五十五

製寒食麪法一百五十六

製披針喉針法一百五十七

諸藥製法一百五十八 逐日人神歌一百五十九

十二時人神歌一百六十

十干日針忌歌一百六十一

屍神歌圖一百六十二 醫家五戒一百六十三

醫家十要一百六十四

外科正宗卷五

海甯許

耀辛本訂

明崇川陳實功著

吳江徐大椿靈胎評

海甯蔣光焞寅昉校

瘰癧類第二十六

夫瘰癧者。有風毒熱毒氣毒之異。又有瘰癧筋癧痰癧之殊。風毒者。外受風寒。伏於經絡。其患先寒後熱。結核浮腫。熱毒者。天時亢熱。暑中三陽。或內食膏粱厚味。釀結成患。色紅微熱。結核堅腫。氣毒者。四時殺厲。

之氣感冒而成其患耳。項胸腋驟成腫塊。令人寒熱頭眩。項強作痛。瘰癧者。累累如貫珠。連接三五枚。此不作寒熱。其患得於誤食蟲蟻鼠殘不潔之物。及宿茶陳水。或內有汗液。其患先小後大。初不覺疼。久方知痛。筋癰者。憂愁思慮暴怒傷肝。蓋肝主筋。故令筋縮結蓄成核。生於項側筋間。形如棋子。堅硬大小不一。或陷或凸。久則虛羸。多生寒熱。勞怒則甚。痰癰者。飲食冷熱不調。饑飽喜怒不常。多致脾氣不能傳運。遂成痰結。初起如梅。如李。生及徧身。久則微紅。後必

潰破易於收斂。凡觀此症。分別施治。風毒者。散其風。除其溼。如防風解毒湯之類是也。熱毒者。清其脾瀉其熱。連翹消毒飲之類是也。氣毒者。調其血。和其氣。藿香正氣散之類是也。瘰癧者。散其堅。和其血。散腫潰堅湯之類是也。筋癰者。清其肝。解其鬱。柴胡清肝湯之類是也。痰癰者。豁其痰。行其氣。芩連二陳湯之類是也。又有寡婦尼僧。鰥夫庶妾。志不得發。思不得遂。積想在心。過傷精力。此勞中所得者。往往有之。最爲難治。宜先養心血。次開鬱結。益腎安神。疎肝快膈。

如歸脾湯益氣養榮湯俱加香附青皮山梔貝母木
香之類是也。又男人不宜太陽青筋潮熱咳嗽自汗
盜汗。女人又忌眼內紅絲經閉骨蒸五心煩熱男婦
有此後必變爲癆瘵難治之症。體實者初起可服散
腫潰堅攻利之藥得效者十中三四有不察虛實盡
劑追伐損傷元氣致成壞病者十有八九。此非患者
之命自由誤於醫人之手。予常治初起成核服前藥
未效者用針刺核內深入三四分用冰蠟散撚成條
插入核內糊紙封上待至二七後核子自然落出隨