

類證治裁
卷八

類證治裁卷之八

丹陽林嗣基著

男芝本校

調經論治

婦科首重孕育。孕育先在調經。素問曰。女子二七天癸至。任脈通。大衝脈盛。月事以時下。言天一之真精至。月信亦通。乃能孕子。謂之月事者。女子屬陰。其血如潮。應月之盈虧。有常期者也。故謂之經。儻一愆期。則失其常度。而諸病生焉。夫任主胞胎。衝爲血海。二脈流通。臟腑之血。鬱阻。注於此。衝任皆奇經。而血之生化。由脾胃。若七情內損。冤抑。外重。貳忿。飲食勞倦。致脾胃日虧。化源日薄。衝

任日衰神色。所重尤在調肝。蓋婦女善鬱。未失條暢。枝葉萎悴。肝不藏血。經之月田不調也。然不調之中。有先期。有後期。有錯亂。有痛。經有倒。經有居。經有淋瀝不斷。有枯閉不通。經不準。必不受孕。然參前數日受孕者有之。當經行食禁生冷。藥忌寒涼。以血得寒則凝滯不行。不慎禁忌。則腹痛瘕泄。亦致不調。且血隨氣行。經不調多由於氣。丹溪謂經來成塊者。氣之凝也。將行作痛者。氣之滯也。行後作痛者。氣血虛也。先期而來者。血熱。後期乃至者。血虛。亦無不由氣也。錯經妄行者。氣之亂也。色淡者。虛而挾水也。紫者。氣之熱。黑者。熱甚也。乍少乍多。淋瀝不斷者。氣不攝血也。故調經必兼氣藥。更若臟損經閉。則由悲傷肺。憂傷心思。傷脾。怒傷肝。

房勞傷腎。肺傷則氣陷血脫。心傷則驚悸盜汗。脾傷則食減肌瘦。
肝傷則髮焦筋痿。腎傷則淋帶骨蒸。甚至嗽熱泄瀉。衝任虧敗。源
涸流竭。如素問云。二陽之病發心脾。有不得隱曲。其在女子爲不
月。夫心主血脉。脾統血。因思慮過度。所願不遂。鬱而成損。則先經閉
而後乾歟。累月經年。遂成乾血。勞瘵治難措手矣。古謂經前勿補。
經後勿瀉。此爲經期腹痛者言之。其實調經之要務。令血氣和平。
自然經準受孕。如陽太過。則先期。原因有火。然虛而生火。仍當養
營攝血。亦有無火而先期。或補中氣。或固腎關。不宜過用寒涼也。
陰不及。則後期。本屬血虛。然有血熱而燥癥者。宜清補。亦有血逆
而留滯者。宜疏利。毋庸預執溫補也。其陰陽乖亂。錯經妄行。或由

火邪搏營。遲早互見。或由經氣舛逆。口鼻上衝。務審其虛實寒熱而調之。至於經期前後腹痛。虛實懸殊。經未行而先痛者。血爲氣滯。經通則痛自除。經已行而猶痛者。衝脈本虛。血去則痛益甚。滯者理其氣。溫而行之。虛者培其營。峻以填之。設淋瀝不止。必固以攝之。亦有腹愈痛經愈多至痛欲死者。係火搏於血。治宜行血。如芎歸、芍等。理脾。如荅等。以益母破氣中之血。以延胡破血中之氣。以香附開其鬱。虛者加人參。理脾則血有統。破結則火痛悉除。故調經莫如入珍湯加益母、延胡。其經閉不行。肥人多痰塞。川芎、川連導痰湯加澤蘭。瘦人多鬱火。四物湯加丹皮、山梔。因脾胃虧而食少者。旺其運納之權。歸芍異功散。因肝腎虧而骨蒸者。壯其營陰之木。地黃湯去萸澤蘭。加龜板五味子。因思慮鬱損心

脾者

歸脾丸
小營煎

因勞歎欬傷肺氣者

叔勞散
紫苑湯

或溫養下焦

熟地沙苑
子杜仲龍

眼。芡實。鹿角膠。

或宣通奇脈

杞子牛膝當歸澤蘭茯神香附

若枯閉日久輕用破血通經

則愈枯其枯矣

又有經後發熱倦怠兩目如帛蔽不明此脾腎精

華不能上注於目也

朝用

補中益氣湯

夕用

地黃丸加杞子

至於七七數盡當

斷不斷或因氣血有餘

若已斷復來者卽爲崩漏宜固攝衝脈

大補元煎加續斷阿膠海螵蛸兔絲

年高經或大行腹痛不止者危

經閉論治

潔古曰經言月事不來者胞脈閉也胞脈屬於心絡於胞中今氣

上迫肺心氣不得下通故月事不來先服降心火之劑

加芩連四物湯三和硝黃

湯去後服局方五補丸後以湯

治脾養血也李氏論經閉有二曰

湯去後服局方五補丸後以湯治脾養血也李氏論經閉有二曰

血滯血枯如經行時餘血一點未淨或外感風寒內傷生冷七情
鬱結爲痰爲瘀凝窒經絡爲血滯或經盡後勞傷衝任欬嗽骨蒸
火逼水涸爲血枯血滯經閉如當歸散元歸散以破瘀加味導以滌痰滯
去則經通若血枯經閉多主傷肝素問云有病胸脇支滿妨於食
病至則先聞腥臊臭出清液先唾血四支清目眩時時前後血病
名血枯此得之年少時有所大脫血若醉入房中氣竭肝傷故月
事衰少不來也治以四烏鰡骨一蘆茹二物并合丸以雀卵大如小豆日乾以五丸爲後飯
飲以鮑魚汁利腸中及傷肝也益胸脇支滿肝病也妨食肝病傳脾也故聞腥臊臭出清液肝病肺乘也故唾血四支清目眩肝血傷矣蘆茹卽茜根能散血後飯先藥也鮑魚汁利腸垢和肝傷取臭穢以佐烏鰡骨辟宿瘀也有因飲食勞倦損傷脾胃者節齋云只宜補養脾胃白术爲君茯苓芍藥爲臣佐以黃耆甘草

陳皮。麥芽。川芎。當歸。柴胡。脾能生血。經自行矣。有因思鬱致損心血者。寇宗奭

云。童男室女。積想在心。思慮過度。男則神色消散。女則月水先閉。

蓋憂愁思慮。多傷心脾。故神衰食減。火炎爍金。肺金燥。腎水絕。木

氣失榮。四肢乾瘦。五臟傳遍死矣。能改易心志。用藥扶持。宜柏子

蘭湯。益陰制火。忌青蒿等涼而行血。凡經閉因血滯者。多凝瘀積痰。

牛膝散。若胃熱消渴。津液燥竭。玉燭散。若思鬱成損。歸脾湯。潮熱骨蒸。

導痰湯。若胃熱消渴。津液燥竭。玉燭散。若思鬱成損。歸脾湯。潮熱骨蒸。

加味逍遙散。室女經行復閉。羸熱成勞。肝脈弦出寸口。上魚際者。

急與婚配。宜加味小柴胡湯。若乾嗽。杏仁五味白芍貝母。婦人經少漸閉。

五心煩熱。肌削脈數。乃陰虛陽乘。當養血益陰。人參固本丸。下利而經

斷者。利止經自來。若脈微濶。雖經止二三月不行。亦非胎養血經。

卷之二
自行也。

經先期至者主血熱。加味四物湯。

加味四物湯。

立齋分肝經血燥者。

加味逍

脾

經鬱滯者。

歸脾湯。

肝經怒火者。

加味小柴胡湯。

血分有熱者。

加味四物湯。

勞役

動火者。

補中益氣湯。

景岳分血赤濃紫脈洪多火而經早者。

清化微

火陰虛內熱動血者。

保陰煎。

脈症無火心脾不攝經亦早者。

小營煎。

七

福飲加杜仲五味子。

若一月二三至者乃氣血敗亂當調其寒熱虛實不

得以經早血熱概之大約血熱者腹多不痛其來必多

固經丸

加生地

黃芍藥。

經遲後期至者主血虛。

加味八珍湯。

立齋分脾經血虛者。

人參養營湯。

肝經血

少者。

地黃湯。

氣血俱弱者。

八珍湯。

景岳分血淡不鮮脈微遲無火而

後期者

大營煎

亦有陰火內燉血本熱而仍後期者乃水虧血少

加味四物湯

過期作痛者氣血兩虛

八珍湯

肥人過期色淡爲痰

二陳湯加芩歸貝母

大約血虛者腹多空痛脈大無力或濡細

八物湯

加木香加香附

經遲早無定乍前乍後多因心肺虛損

滋血湯

或因受驚氣亂經亦

亂者茯神棗仁柏子仁或氣盛於血不受孕者

抑氣散景岳分三

陰虧兼陽虛者

大營煎

憂思損心脾者

歸脾湯

食少脾不健運

宜溫燥者

理中湯

脾虛不攝爲淋漏者

七福飲

保元湯加杜仲

木瓜加茯神

六君湯去獨活

情志不遂肝脾氣結經期亂者

逍遙飲

多驚惕者

補肝散去獨活

越痛散加秦艽

有經前身痛拘急者散其風

加桂枝芍藥散

有經前腹痛畏冷者溫其

氣血

寒調經飲加薑桂茴香

氣滯者行其滯

加味烏藥湯

血瘀者逐其瘀

通瘀煎

經痛

調經飲加桂枝芍藥散

血瘀者逐其瘀

通瘀煎

病結者。理其絡。失笑散。癰瘕痞脹者。調其氣血。交加地黃丸。虛寒急痛者。溫其裏。五物散。煎。痛在經後者。補其虛。八珍湯。一切心腹攻築。脇肋刺痛。月水失調者。和其肝。元胡索散。加枳壳。經滯脅腹痛不可忍者。導其壅。琥珀散。從本事方改訂。并治產後惡露。不快。血上搥心。迷悶。不醒。氣絕欲死。金匱云。婦人腹中痛。當歸芍藥湯主之。此補中瀉木。又云婦人腹痛。小建中湯主之。此亦補脾伐肝之意。

色經

凡經以色紅爲正。其紫者風也。四物湯加荆防白芷。黑者熱甚也。四物湯加芩連。紫黑兼腹痛者。氣血併也。西烏湯。加蓬朮、川連。不痛者。但加川連。淡白者。虛而兼帶也。芎歸湯。加參耆水、芍。赤白兼膚。腹冷痛者。虛寒也。伏龍肝湯。如米泔水。如屋漏水。或帶黃混濁模糊者。溼痰也。六君湯。加蒼朮、香附。如豆汁者。熱

也。四物湯加丹參、丹皮成塊成片者。血隨氣凝或風冷乘之也。

通瘀煎。去澤泄。風

丹參、丹皮加味防風丸。

入胞門忽崩鮮血。

一味防風丸。旋覆花湯下。

倒經期氣逆直犯清道而爲吐衄宜折其逆勢而調之。

用山梔、丹皮、生地、丹

參、白芍、蘇子、鬱金、童便。或用四物湯和韭汁童便服。

龍膽丹皮、青皮、黃芩、白芍、山梔

補

因心氣不足衄血面黃者。

茯苓、補

居經三月一行爲居經。俗名按季。或由脈微氣血俱虛或由寸口脈微而濇少陰脈微而遲或由陽脈浮大陰脈反弱又一歲一行者爲避年此因稟受不齊勿與經閉同治。

淋瀝症多氣不攝血。

止經湯。加參耆子宮虛寒淋瀝。

膠艾四物湯。

血分有熱不

斷。蒲黃散。

作多經水過多

當歸飲

過多淋瀝

膠艾四物湯

經水濇少

四物加薑花湯

調經脈候

尺脈滑血氣實婦人經脈不利。少陰脈弱而微微則少血。寸口脈浮而弱浮則爲虛弱則無血。脈來狀如琴絃苦少腹痛主月水不利孔竅生瘡。肝脈沈主月水不利腰腹痛。尺脈來而斷續者月水不利當患小腹引腰痛氣滯上攻胸臆。腎脈微濇爲不月。

附 方

氣血

八珍湯

見一卷中風

阻痰

導痰湯

見一卷中風

四物湯 見一卷中風

歸芍異功散 異功散見中風 此加 歸 芍各二錢

六味地黃湯 見一卷中風

歸脾湯 見二卷勞瘵

小營煎

歸 炙草 地各二錢半

白芍一錢半

山藥各二錢

劫勞散

見二卷欬嗽

杞子一錢半

棗仁各二錢

紫菀湯

見二卷肺瘡

補中益氣湯

見一卷中風

大補元煎

見一卷中風

芩連四物湯

四物湯加 芩 連

心火氣血破瘀通補肝熱瀉通瘀補氣血

三和湯

地硝

芍薄荷

芩歸等分水煎

梔翹草大黃

朴

五補丸

參

芍地芩

牛膝地骨皮

等分蜜丸酒下

衛生湯

歸兩

芍各二兩水煎

黃耆三兩劉寄奴

枳壳延胡

沒藥

每服半

當歸散

歸末酒

芍下二錢

劉寄奴當歸

每服三錢

加薑煎

元歸散

元胡索

芍當歸

每服三錢

加薑煎

柏子仁丸

柏子仁各一兩

牛膝熟地

卷柏各五錢三兩酒煮杵成膏

澤蘭葉蜜丸

續斷

澤蘭湯

澤蘭葉各一兩

牛膝水煎

甘草五錢

每服

牛膝散

牛膝各一兩

芍歸

丹桂

桃仁

延胡

木

玉燭散

見六卷腹痛

香各七錢五分

爲末每服三錢

酒調

加味逍遙散

見一卷火

加味小柴胡湯小柴胡湯見一卷溫此加麥冬生地

各二錢

固本丸見一卷中風

加味四物湯四物湯加丹梔柴

清化飲地

芍丹芩麥各二錢石斛一錢

如小水赤熱怒火動血加黑山梔

夜熟加地骨皮

保陰煎見五卷瘧

七福飲見三卷鬱

固經丸黃藥

白芍各三兩黃芩二兩

炙龜版四兩

酒糊丸

桐子大每

服五十九丸

白湯下

加味八珍湯八珍湯加

皮各八分

柴胡

黃耆各五分

香附

丹

虛血氣

心脾內熱火熱血陰益怒肝

養營湯

見二卷勞瘵

大營煎

見三卷關格

二陳湯

見一卷中風

八物湯

地黃 檳榔各五分

芍

延胡

苦棟各一錢

木香

滋血湯

參耆

芥

山藥各一錢

芍

芍

地

各八分

歸附丸

當歸四兩
薑汁製

香附八兩童便浸透晒乾再加酒醋鹽爲末

醋糊丸
空心砂仁湯下三錢

血

歸附丸
虛加熟地
寒加桂附

抑氣散

香附四兩
未開水

陳皮一兩
下二錢

茯神
甘草各五錢

爲

理中湯

見一卷中風

六君子湯

見一卷中風

保元湯

見一卷火

虛脾補脾虛脾盛氣

亂氣經痛虛阻痰遲經