

醫門法律三

子仙珍藏

三卷中風門方目

一 侯氏黑散

二 風引湯

三 愈風丹

四 胃風湯

五 薏苡仁湯

六 排風湯

七 人參補氣湯

八 舒筋保安散

九 解風散

十搜風順氣丸

十一桂枝湯

十二小續命湯

十三防風通聖散

十四祛風至寶膏

十五不換金丹

十六三化湯

十七攝生散調蘇合丸

十八烏藥順氣散

十九勻氣散

二十稀涎散

二十一加味六君子湯

二十二三聖散

二十三轉舌膏

二十四正舌散

二十五資壽解語湯

二十六瀉青丸

二十七愈風湯

二十八四白丹

二十九大秦芫湯

三十養血當歸地黃湯

三十一天麻丸

三十二滌痰湯

三十三青州白丸子

三十四竹瀝湯

三十五貝母瓜蒌散

三十六千金地黃湯

三十七涼膈散

三十八清心散

三十九地黃飲子宣明方

四十三因白散子

四十一二丹丸

四十二稀養丸

四十三黑錫丹

四十四三建二香湯

四十五星附散

四十六古今錄驗續命湯

四十七千金三黃湯

四十八近効白朮附子湯

四十九史國公浸酒方

附痺證方目 二十方

五十三痺湯

五十一桂枝五物湯

五十二味劉散

五十三烏頭粥

五十四薏苡湯

五十五通痺散

五十六控涎丹

五十七人參丸

五十八括蘘薤白半夏湯

五十九腎瀝湯

六十吳茱萸散

六十一羚羊角散

六十二羌活湯

六十三升麻湯

六十四巴戟天湯

六十五犀角散

六十六人參散

六十七溫中法麴丸

六十八紫蘇湯

六十九牛膝酒

附風門雜方目 七方

七十和榮湯

七十一急風散

七十二獨聖散

七十三祛風丸

七十四四神丹

七十五犀角湯

七十六牛蒡子散

醫門法律卷之二

西昌喻
嘉言父著

黎川陳守誠伯常重梓

中風門論一篇

法四十一條
律六條

中風論

喻昌曰。中風一證。動關生死安危。病之大而且重。莫有過於此者。內經風痺痿厥四證。各有韻論。獨風論中。泛及雜風。至論中風。惟曰風中五藏六府之俞。亦爲藏府之風。各入其門戶所中。則爲偏風。不過兩述其名而已。後論五藏并胃府之風。亦但各述其狀而

已賴仲景金匱書表章先聖云。夫風之爲病。當半身不遂。或但臂不舉者。此爲痺。脉微而數。中風使然。又云。寸口脉浮而緊。緊則爲寒。浮則爲虛。寒虛相搏。邪在皮膚。浮者血虛。絡脉空虛。賊邪不瀉。或左或右。邪氣反緩。正氣卽急。正氣引邪。喎僻不遂。邪在於絡。肌膚不仁。邪在於經。卽重不勝。邪入於府。卽不識人。邪入於藏。舌卽難言。口流涎沫。又云。寸口脉遲而緩。遲則爲寒。緩則爲虛。榮緩則爲亡血。衛緩卽爲中風。邪氣中經。則身痒而癢。疹心氣不足。邪氣入中。則胸滿而短氣。以及五藏風脉死證。語語金鍼。大有端緒之

可求矣。仲景以後英賢輩出。方書充棟。何反漫無取裁。坐令中風一證。鮮畫一之法治之。百不一効。昌生也晚。敢辭不敏。逐條引伸。內經仲景聖法。爲治例而先立論以括其要焉。然世咸知仲景爲立方之祖。至中風證。仲景之方。首推侯氏黑散爲主方。後人罔解其意。謹并明之。夫入風之邪。皆名虛邪。人身經絡營衛素盛者。無從入之。入之者。因其虛而襲之耳。內經謂以身之虛而逢天之虛。兩虛相感。其氣至骨。入則傷五藏。工候禁之。不能傷也。又謂賊風數至。虛邪朝夕內至五藏骨髓。外傷空竅肌膚。靈樞亦謂聖人避

邪如避矢石。是則虛邪之來爲害最烈。惟良工知禁之聖哲知避之矣。然風爲陽邪。人身衛外之陽不固。陽邪乘陽。尤爲易入。卽如偏枯不仁。要皆陽氣虛餒。不能充灌所致。又如中風卒倒。其陽虛更審。設非陽虛其人。必輕矯便捷。何得卒倒耶。仲景之謂脉微而數微者。指陽之微也。數者指風之熾也。所出諸脉諸證。字字皆本陽虛爲言。然非仲景之言。而內經之言也。內經謂天明則日月不明。邪害空竅。可見風性善走空竅。陽虛則風居空竅。漸入府藏。此惟離照當空。羣邪始得垂散。若胸中之陽不治。風必不出矣。扁鵲

謂號太子尸厥之病曰上有絕陽之絡下有破陰之
紐見五絡之絡於頭者皆爲陽絡而邪阻絕於上其
陽之根於陰陰陽相紐之處而正復破散於下故爲
是病古人立言之精若此仲景以後醫脉斬焉中斷
後賢之特起者如劉河間則主火爲訓是火召風入
火爲本風爲標矣李東垣則主氣爲訓是氣召風入
氣爲本風爲標矣朱丹谿則主痰爲訓是痰召風入
痰爲本風爲標矣然一人之身每多兼三者而有之
曷不曰陽虛邪害空竅爲本而風從外入者必挾身
中素有之邪或火或氣或痰而爲標耶王安道謂審

其爲風則從內經。審其爲火爲氣爲痰。則從三子。徒較量於彼此之間。得非無權而執一耶。且從三子。固各有方論可守。從內經。果何着落耶。中風門中。大小續命湯。及六經加減法。雖曰治風。依然後人之法也。金匱取古今錄驗續命湯。治風痺之身無痛。而四肢不收者。仲景所重。原不在此。所重維何。則驅風之中。兼填充竅爲第一義也。空竅一實。庶風出而不復入。其病瘳矣。古方中有侯氏黑散。深得此意。仲景取爲主方。隨製數方。補其未備。後人目覩其方。心炫其指。詎知仲景所爲。心折者。原有所本。乃遵內經。久塞其

空是謂良工之語耶。觀方下云服六十日止藥積腹中不下矣。久塞其空。豈不彰明哉。後人以無師之智。燭亂成法。中風之初。治其表裏。風邪非不外出。而重門洞開。出而復入。乃至莫禦者多矣。又謂一氣微汗。一旬微利。要亦五十步之走耳。正如築堤禦水。一旬一氣。正程功課。効之日。豈有姑且開堤泄水。重加板築之理哉。是以後人委曲偏駁。不似先聖真切精粹。諸家中風方論。直是依樣葫蘆。不足觀矣。非然也。三人行必有我師。況綜列羣方。贊其所長。核其所短。俾學者一簡勘而心地朗然。坐進此道。用之如鍾離丹。

熟銅鐵皆金。其師資於前賢。豈不大耶。謹論。

中風之脉。各有所兼。兼則益造其偏。然必顯呈於脉。蓋新風挾舊邪。或外感。或內傷。其脉隨之忽變。兼寒則脉浮緊。兼風則脉浮緩。兼熱則脉浮數。兼痰則脉浮滑。兼氣則脉沉濇。兼火則脉盛大。兼陽虛則脉微。亦大而空。兼陰虛則脉數。亦細如絲。陰陽兩虛則微數。或微細。虛滑爲頭中痛。緩遲爲營衛衰。大抵陽浮而數。陰濡而弱。浮滑沉滑。微虛散數。皆爲中風。然虛浮遲緩。正氣不足。尚可補救。急大數疾邪不受制。必死無疑。若大數未至。急疾猶得。