

向來論治白喉從未有如此書之透澈者

大君子如肯重爲刊印分布城鄉家喻戶曉俾

免誤於醫藥全活必多功德無量

白喉治法忌表抉微 壽民敬題



洞白向風  
呈曉晴  
閑怡日  
師游心

耐修敬署



人君子傳流刻翻番德浩大

洞主仙師白喉治法忌表抉微

耐修子敬錄并序跋加注

余素未習醫。咽喉一症。尤屬茫然。今年正月。余三兒自至戚汪大令處染患白喉。延同鄉某甲醫診治。據曰。此喉痺也。切不可破。破則不治。方用牛蒡。桔梗。殭蠶。杏仁。荊芥。防風等藥。一劑而汗出。然鼻塞矣。再劑而熱退。然音瘡矣。又延診之。則曰。邪退其半矣。以前方略加增減。一劑而白塊自落矣。再劑而鼻流鮮血矣。又延診之。則曰。邪皆外出矣。又以原方去荊防杏仁。加射干。黃芩。一劑而喉外暴腫。再劑而喉內全爛。且頑痰上壅。骨節漲滿。神志煩悶。睡寤恍惚。始知藥誤。急改延某乙醫來視。曰。誤服表藥。受患

過深不可救矣。姑以龍虎二仙湯灌之。卒無效。未幾而汪之女及婢相繼患此鑒。於甲醫之失。不敢服藥。令老嫗挖去白塊。出涎血升許。尋愈。幾不解其何理。嗣於友人處。假得鄭梅澗先生重樓玉鑰一書。閱之。乃知白喉一症。只可滋陰。不可發表。甲醫所用之藥。全在禁忌之列。而鼻塞。音痙。與白塊自落。鼻孔流紅。皆爲誤表。不治之症。惟不可破一語。則與甲醫相合。更無解於汪氏女婢之因破而愈也。方思摘其大要。刊布流傳。免世滋誤。乃未一月。而汪君亦病此。仍不敢延甲醫。亦倩老嫗搗破。而病不減。另延某丙醫診治。其所用藥。與重樓玉鑰中所載養陰清肺一方。大同。

余外甥女適  
金氏者由汪  
處弔奠歸卽  
染此症亦爲  
甲醫以表散  
藥致斃

小異固未大效。又復倍用生地。惟尙不免有一二禁藥攏入服。更不效。病家以爲生地之誤。又另延一傖醫者。全用表散。連劑並進。而種種敗象。一時俱見。知爲內陷。仍歸咎於養陰。亦改延乙醫觀之。並未出前方相示。乙醫以爲症由風邪。失未表散。亦投蠶蟬勞勃等藥。竟不救。余時亦未見傖醫之方。近始索觀而知。當日但謂病有兩岐。藥難一致。前所欲摘要刊布者。至此遂不敢下筆矣。又一月而余妾亦病。始則骨節疼痛。渾身發熱。喉間乾痛。而無白點。乃立意延乙醫診視。以其向治喉症。類能分別透澈。必可辨悉病源。及診脈象。云是浮緊。恐係風邪。略應表散。然一劑而音瘡再

劑而氣逆似覺不合適有某丁醫過訪請其覆按瞿然曰此白纏喉也如何可表速服養陰清肺湯方可補救時熱尙未退探視喉間微有白象余以乙丁之言迥然相反茫無率從乃齋沐設壇敬請

洞主仙師判斷所語悉如丁言並示白喉斷無發表之論命於養陰清肺湯中加蠶食過桑葉孔多者三片青麟丸五分爲引一劑之後卽照原方不必加引至愈而止當卽遵服次日卽大解一次色赤黃並發斑疹遍體皆是此種斑疹乃白喉症所恒有係服藥見功浮邪外出乃是吉象切勿誤認尋常斑疹不敢滋陰改服表散以至大誤此時熱已全退而喉間白塊遍滿矣

余恪遵

仙諭始終守方。五日而瘳。長次兩兒。次第傳染。審其情狀。症亦相同。深信不疑。卽以養陰清肺湯投服。或便粘痰。或發斑疹。服三劑而熱清喉間均稍露白點。不移時而退盡。竟未大發。乃堅信養陰忌表四字爲治。白喉者歷劫不磨之論。乙醫爲余年交長。虛心而善悟。見此不覺五體投地。爰復迭次虔請。遂層質疑。得

嗣是一月以來凡親友患此症者。聞信卽以養陰方相告。皆二三劑卽瘳。已活數人矣。

頒箴論並命作表。以喚迷津。前後共三千餘言。一片婆心。流溢行間字裏。自此濟人有術。所活奚止恆河沙數哉。

仙師廟在奉天。前於戊子歲在奉降壇勸賑。凡助賑求方者。莫下藥到病除。神妙不可思議。偶立方論。洞澈源流。決非凡手所能夢見。此論一出。岐黃家當可奉爲金科玉律。不致再入歧途。爰敬錄之。並將張善吾所著捷要書中語之相合者。分注於下。刊印行世焉。

洞主仙師前論 答耐修問

白喉古無此症。故少專書。世稱難治。然非難也。未明其理耳。人但知肺之灼而不知由於胃之蒸。人卽知胃之熱。而不知由於腸之寒。腸寒則下焦凝滯。胃氣不能下行。而上灼於肺咽喉一綫之地。上當其衝。終日蒸騰。無有休息。不急治。

之與治之不當則腫且潰潰且閉矣。

捷要云。白喉初起。惡寒發熱。頭痛背脹。遍身骨節疼痛。喉內或極痛。或微痛。或不痛。而喉內微硬。有隨發而白隨見。

者。有至二三日而白始見者。或由白點白條白塊。甚至滿喉皆白者。

所治皆同

治之之法惟有以厚重之藥鎮其上層如以巨

甄蓋鼎使燄不上騰復以清涼之藥潤其次層如以濕綿禦礪使火不內射極

盛者再掃除其中宮以抽柴薪開通其下道以漏炸炭醫者之能事畢矣夫自

上至中至下本有可通之路而必開其旁門反使四塞左矣邪毒之內蘊火也

實煙也尋常表邪輕煙而已此則如蠻雲毒霧蔚蔚鬱鬱一經表散僅能紛竄於經絡之中而不能透出於皮毛之外愈入愈深有入無出迨自知其誤翻然

改計不先追其藥毒而徒盡其當然無益也解表藥之毒春用蠻食過桑葉孔

天氣亢旱非  
大雨不能回  
其燥更甚天  
潤若燔以風

人一理可以

多者三片。夏用荷花蒂連鬚者七個。秋用荸薺苗稍黃者九枝各寸許。冬用生青果核磨汁或打碎五枚不必拘定四時但有現成鮮者可用。卽用之加入養陰清肺湯中爲引一劑後照全方服不加引劑。捷要云。如有辨症未清。誤服升提開散辛溫之劑。視病之輕重。以生綠豆研細末。重者一茶碗。輕者一酒杯冷水調服。另煮大米粥一碗先服粥後服藥則誤服之劑卽能解除矣等語。如以上四引不現成。卽用此法亦效。此症起時發熱者多症之輕者脈不甚洪實初不見白醫者不察往往誤爲風邪用表藥而熱退方謂有效也。及白點既見而病已增重大半矣。捷要云。白喉初起惡寒發熱乃毒氣初作於內。至二三日喉內見白寒熱自除或者不悟以爲表藥有功而不知不服表藥其至改服養陰二劑而不見速效又復反覆改圖一誤再誤病其有不殆者乎故認症既的尤以守方爲第一義也。捷要云。如有內熱及發熱照方服去其熱自熱亦自退也。至改服養陰二劑而不見速效又復反覆改圖一誤再誤病其有不殆者乎故認症既的尤以守方爲第一義也。捷要云。如有內熱及發熱照方服去其熱自

凡病爲藥誤  
另延醫治如  
後醫有識必  
以正道補救  
救之而效則  
前醫猶引爲  
功救而不效  
則反被前醫  
歸咎或前醫  
未誤誤於後  
醫則後醫更  
不任過熟得  
熟失往往混  
淆可歎也  
余初亦疑爲  
滋陰所誤及

淨。愈發白愈守方。久久服之。自有效驗。切勿求速而表散。吾謂風邪之症。亦宜清解。亦不宜於表散。表之過當。不外

淨。愈發白愈守方。久久服之。自有效驗。切勿求速而表散。吾謂風邪之症。亦宜清解。亦不宜於表散。表之過當。不外  
出而內竄。勢易易也。且立意不用表藥。則中下之醫不能辨症。於初起者。亦不致大誤。而殺人。」玉鑰書中忌用諸藥。出於名醫手定。人嫌其選擇之過泥。吾

致大誤而殺人」玉鑰書中忌用諸藥。出於名醫手定。人嫌其選擇之過泥。吾

前醫猶引爲

前醫猶引爲功救而不效  
則反被前醫歸咎或前醫未誤誤於後醫則後醫更不任過熟得熟失往往混淆可歎也  
余初亦疑爲滋陰所誤及

猶謂其徵引之未全。細辛升麻桂枝蘇葉之不可用。固不待言。卽殭蠶蟬退馬勃等品。治喉家所奉爲至寶者。皆殺人之具也。各宜守之如厲禁。視之如酙毒。庶不誤矣。」查汪某之病。亦是白喉。藥不誤於前此之滋陰。而誤於後來之表散。况黃芩一味。涼入細竅。猶投炭於瓶。而嚴塞其口。火雖滅而煙留。再以厚重之藥並用。而鎮之愈塞愈緊。非特不能交濟其功。抑且相助爲虐。其毒至死而

不任過熟得  
熟失往往混

清可歎也

清可歎也

處索方閱汪之果有槍醫表散二文在丙之後乙之前且黃芩亦

槍所命投也

不能出者職是故也。至其女與婢之病亦均纏喉惟係輕者童體氣盛故以挖破而效然非通法不可爲訓若以治弱人則頃刻而靡矣。汪某之病胡獨不誤於此耶。」三郎所遇之醫學淺性泥更不足道當其來診之初白塊已遍滿但稍經涉獵者即可辨認况行道有年而猶妄用表散一再不已是何故也。至三日而毒竄已深雖有神仙亦不能救甚矣牛蒡射干等藥之爲禍烈也。」耐修經此數端聞吾之言大旨當可明曉其擇近時喉症書之近穩者細觀各方中之用藥刪其應忌之品不可容留一擣以可用者分爲正將猛將次將三表每表分作四層上層爲鎮藥如龍膽草石膏生地元參之類次層爲潤藥如瓜蔞

貝母丹皮天冬之類。又次層爲消藥。如厚樸神麌枳壳麥芽之類。下層爲導藥。如大黃元明粉車前澤瀉之類。約藥四五十種。按症輕重分別施治。亦已足矣。其中消導之藥非熱極便結不可輕用。但能鎮潤得宜。則中下自會通暢。不可不知。表後列忌用諸藥添入前人漏列者七八種。注明害處。俾盡人一目瞭然。胸有成竹。設遇醫者開方。觀其所用之藥。如有不列於藥隊者。以及妄用禁藥者。或病輕而遽用猛將者。皆不可服。更以服禁藥後所現不治症象臚列於後。庶可觸目驚心也。彙成見質於吾。尚有要言。

遵定藥將三表

係乞乙醫  
某君審正

三將之中。以正將爲定法。而以猛將馭其重。次將馭其輕。四層之中。又以  
鎮潤爲定法。而以消藥去其滯。導藥利其行。鎮潤之中。又以養陰清肺湯。  
爲定法。而以他藥濟病之偏頗。輔方之不足。審定主賓。因症施治。若綱在  
綱。有條不紊。至於禁忌之藥。萬不可以一試。即偶雜一二於良藥之中。猶  
致全羹俱壞。况專恃之以爲定法乎。其不現種種敗象。而逼悶以斃者鮮  
矣。法戒具備。行道者其詳而審焉。

白喉正將

此係大中至正之藥。極穩極效。惟中下層藥。非熱甚之症。大便閉結者。尙須慎用。

上層鎮藥

大生地

元參

煅石膏

麥冬

次層潤藥

天冬

當歸

白芍

丹皮

貝母

生甘草

薄荷

中層消藥

大木通

神麴

焦楂肉

陳皮

砂仁

下層導藥

郁李仁

知母

生土牛膝兜

澤瀉

青寧丸

養陰清肺湯

日服二劑。重者日服三劑。若病勢無增，卽白加甚，仍照方服。始終守定，不可移易。

大生地

壹兩

麥冬

陸錢  
去心

白芍

肆錢  
炒

薄荷

貳錢  
五分

元參

捌錢

丹皮

肆錢

貝母

肆錢  
去心

生甘草

貳錢

此方乃治白喉之聖藥。翼然八柱，顛撲不破。其中但有鎮潤而無消導。蓋所謂鎮潤得宜，下元自會通暢，無所用其消導也。分兩悉照原方，不可輕重。小兒減半。守方服去，自然全愈。切勿中改。

如喉間腫甚者，加煅石膏肆錢。○大便燥結，數日不通者，加青甯丸貳錢。元明粉貳錢。○胸下漲悶者，加神龜貳錢。○焦查貳錢。小便短赤者，加大木通壹錢。澤瀉貳錢。知母貳錢。○燥渴者，加天冬三錢。馬兜鈴三錢。○面赤身熱或舌苔黃色者，加銀花肆錢。連翹貳錢。