

醫
酉
然
三
脈
全
書

注解傷寒論序

夫前聖有作後必有繼而述之者則其教乃得著于世
矣醫之道源自炎黃以至神之妙始興經方繼而伊尹
以元聖之才撰成湯液俾黎庶之疾疢咸遂蠲除使萬
代之生靈普蒙拯濟後漢張仲景又廣湯液爲傷寒卒
病論十數卷然後醫方大備茲先聖後聖若合符節至
晉大醫令王叔和以仲景之書撰次成叙得爲完帙昔
人以仲景方一部爲衆方之祖蓋能繼述先聖之所作
迄今千有餘年不墜於地者又得王氏闡明之力也傷

寒論十卷其言精而奧其法簡而詳非寡聞淺見所能
殫究後雖有學者又各自名家未見發明僕忝醫業自
幼徂老耽味仲景之書五十餘年矣雖粗得其門而近
升乎堂然未入於室常爲之慊然昨者邂逅聊攝成公
議論該博術業精通而有家學注成傷寒十卷出以示
僕其三百九十七法之內分析異同彰明隱奧調陳脉
理區別陰陽使表裏以昭然俾汗下而灼見百一十二
方之後通明名號之由彰顯藥性之主十劑輕重之攸
分七精制用之斯見別氣味之所宜明補瀉之所適又

皆引內經旁牽衆說方法之辨莫不允當實前賢所未
言後學所未識是得仲景之深意者也昔所謂慊然者
今悉達其奧矣親覲其書誠難默默不揆荒蕪聊序其
畧時甲子中秋日洛陽嚴器之序

傷寒卒病論集

論曰余每覽越人入號之診望齊侯之色未嘗不慨然歎其才秀也怪當今居世之士曾不留神醫藥精究方術上以療君親之疾下以救貧賤之厄中以保身長全以養其生但競逐榮勢企踵權豪孜孜汲汲惟名利是務崇飾其末忽棄其本華其外而悴其內皮之不存毛將安附焉卒然遭邪風之氣嬰非常之疾患及禍至而方震慄降志屈節欽望巫祝告窮歸天束手受敗賁百年之壽命持至貴之重器委付凡醫恣其所措咄嗟嗚

呼厥身已斃神明消滅變爲異物幽潛重泉徒爲啼泣
痛夫舉世昏迷莫能覺悟不惜其命若是輕生彼何榮
勢之云哉而進不能愛人知人退不能愛身知己遇災
值禍身居厄地蒙蒙昧昧惓若遊魂哀乎趨世之士馳
競浮華不固根本忘軀徇物危若冰谷至於是也余宗
族素多向餘二百建安紀年以來猶未十稔其死亡者
三分有二傷寒十居其七感往昔之淪喪傷橫天之莫
救乃勤求古訓博采衆方撰用素問九卷八十一難陰
陽大論胎臚藥錄并平脉辨證爲傷寒雜病論合十六

卷雖未能盡愈諸病庶可以見病知源若能尋余所集
思過半矣夫天布五行以運萬類人稟五常以有五藏
經絡府俞陰陽會通玄冥幽微變化難極自非才高識
妙豈能探其理致哉上古有神農黃帝岐伯伯高雷公
少俞少師仲文中世有長桑扁鵲漢有公乘陽慶及倉
公下此以往未之聞也觀今之醫不念思求經旨以演
其所知各承家技終始順舊省疾問病務在口給相對
斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎趺陽三
部不參動數發息不滿五十短期未知決診九候曾無

髣髴明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別
生實爲難矣孔子云生而知之者上學則亞之多聞博
識知之次也余宿尙方術請事斯語

傷寒論藥方目錄

卷一

無方

卷二

方六道

桂枝湯

桂枝二越婢一湯

甘草乾薑湯

芍藥甘草湯

調胃承氣湯

四逆湯

卷三

方二十七道

葛根湯

葛根黃芩黃連湯

麻黃湯

大青龍湯

小青龙

乾薑附子湯

麻黃杏仁甘草石膏湯

桂枝甘草湯

茯苓桂枝甘草大棗湯

厚樸生薑半夏甘草人參湯

茯苓桂枝白朮甘草湯

芍藥甘草附子湯

茯苓四逆湯

五苓散

茯苓甘草湯

梔子豉湯

梔子厚樸湯

梔子乾薑湯

小柴胡湯

小建中湯

大柴胡湯

桃核承氣湯

柴胡加龍骨牡蠣湯

救逆湯

桂枝甘草龍骨牡蠣湯

抵當湯

抵當圓

卷四

方一十九道

大陷胃圓

大陷胃湯

小陷胃湯

文蛤散

白散

柴胡桂枝乾薑湯

半夏瀉心湯

十棗湯

大黃黃連瀉心湯

赤石脂禹餘糧湯

旋覆代赭石湯

桂枝人參湯

瓜蒂散

黃芩湯

黃連湯

桂枝附子湯

甘草附子湯

白虎湯

炙甘草湯

卷五

方十道

大承氣湯

小承氣湯

猪苓湯

蜜煎導方

猪膽汁方

茵陳蒿湯

吳茱萸湯

麻仁圓

梔子蘗皮湯

麻黃連軀赤小豆湯

卷六

方二十道

麻黃附子細辛湯

麻黃附子甘草湯

黃連阿膠湯

附子湯

桃花湯

猪膚湯

甘草湯

桔梗湯

苦酒湯

半夏散及湯

白通湯

白通加猪膽汁湯

眞武湯

通脈四逆湯

四逆散

烏梅圓

當歸四逆湯

麻黃升麻湯

乾薑黃芩黃連人參湯

白頭翁湯

卷七

方五道

理中圓

理中湯附

燒裨散

枳實梔子湯

牡蠣澤瀉散

竹葉石膏湯

卷八

無方

卷九

無方

卷十

無方

此下二十五方雖於隨證下有之緣多以加減爲文似未詳備故復載方在末卷

桂枝加葛根湯

桂枝加厚樸杏子湯

桂枝加附子湯

尤附湯方附

桂枝去芍藥湯

桂枝去芍藥加附子湯

桂枝麻黃各半湯

桂枝一麻黃一湯

白虎加人參湯

桂枝去桂加茯苓白朮湯

已上九方證
在第二卷

葛根加半夏湯

桂枝加芍藥生薑人參新加湯

梔子甘草豉湯

梔子生薑豉湯

柴胡加芒硝湯

桂枝加桂湯

已上六方證
在第三卷

柴胡桂枝湯

附子瀉心湯

生薑瀉心湯

甘草瀉心湯

黃芩加半夏生薑湯

已上五方證
在第四卷

桂枝加大黃湯

桂枝加芍藥湯

四逆加吳茱萸生薑湯

已上五方證
在第六卷

四逆加人參湯

四逆加豬膽汁湯方

已上五方證
在第七卷

已上十卷內計方一百一十二道

此經方劑並按古法錙銖分兩與今不同謂如呶咀者

卽今之剉如麻豆大是也云一升者卽今之大白盞也

云銖者六銖爲一分

卽二錢半也

二十四銖爲一兩也云三

兩者卽今之一兩云三兩卽今之六錢半也料例大者

只合三分之一足矣