

增廣本草綱目

錦章圖書局
印行

R281.3

12-3

本草綱目草部第十八卷上

草之七 蔓草類七十三種附一十九種

菟絲子

本經上品釋名菟縷別菟藟別菟蘆本菟丘廣赤綱別玉女雅爾唐蒙雅水菟草綱野狐絲綱金絲草綱

日按呂氏春秋云或謂菟絲無根也其根不屬地伏者是也抱朴子云菟絲之草下有伏菟之根無此

丹服則能變化則菟絲之名因此也○宏景曰菟絲下云菟絲初生之根與形似菟縷其根以和

未見豈別一類乎孫炎釋爾雅云唐也○宏景曰菟絲下云菟絲初生之根與形似菟縷其根以和

女羅毛菟云女蘿菟絲也而本草菟絲無女蘿之名惟松蘿一名女蘿菟絲也一物四名而本草唐蒙為一名詩云焉與

脫漏乎震亨曰菟絲未嘗與茯苓共類女蘿附松而生不相關涉皆承訛而言也時珍曰毛詩注女蘿

一物故也張揖廣雅云菟丘菟絲也女蘿松蘿也陸機詩疏言菟絲蔓草上黃赤如金松蘿蔓松上生

枝正青無雜蔓者皆得之詳見木部集解別錄曰菟絲子生朝鮮川澤田野蔓延草木上九月采實

景曰田野蔓落中甚多皆浮生藍經麻蒿上其實色黃而細者為赤網色淺而大者為菟藟功用並同宏

天明曰苗莖似黃絲無根根浮生藍經麻蒿上其實色黃而細者為赤網色淺而大者為菟藟功用並同宏

而生以前采之頃曰今近道亦有之以菟句者為勝夏生苗初如細絲遍地不能自起得他草梗則纏繞

微紅香亦襲人結實如豌豆而細色黃生於梗上尤佳惟懷孟林中多有之入藥更良

子偷治以黃精自然汁相對浸一宿至明用微火煎至乾入日中烘熟鐵杵一搗三三餘杵成粉用之

時珍曰凡用溫水淘去沙泥酒浸一宿至明用微火煎至乾入日中烘熟鐵杵一搗三三餘杵成粉用之

五口蒸曝四五次研作餅乾泥酒浸一宿至明用微火煎至乾入日中烘熟鐵杵一搗三三餘杵成粉用之

甘平無毒松脂為之使惡藿菌王治續絕傷補不足益氣力肥健人本養肌強陰堅筋骨主莖中寒精

自出溺有餘滲口苦燥渴寒血為積久服明目輕身延年別治男女虛冷添精益髓去腰疼膝冷消渴

熱中久服去面黧悅顏色權補五勞七傷治鬼交泄精尿血潤心肺大補肝臟風虛古發明子稟中和

凝正陽之氣一莖從樹感枝而成從中春上陽結實故偏補人衛氣助人筋脈領日抱朴子仙方單服

法取實一斗酒一斗浸曝乾再浸又曝令酒盡乃止搗篩每酒服二錢日二服此藥治腰膝去風兼能

明日久服令人光澤老變為附方舊六消渴不止菟絲子煎汁任意飲之陽氣虛損熟地黃等分菟絲子

酒糊丸梧子大每服五丸氣虛人參湯下氣逆沈香湯下○經驗方用菟絲子酒白濁遺精治思慮

浸十日水淘杜仲焙研蜜炙一兩以薯蕷末酒煮糊丸梧子大每空心酒下五十九丸白濁遺精治思慮

上海錦章書局石印

太過心腎虛損真陽不固漸有遺瀉小便白濁夢寐頻泄菟絲子五兩白茯苓三兩石蓮肉二兩為末酒糊丸梧子大每服三五丸空心鹽湯下和劑局方 小便赤濁心腎不足精少血燥口乾煩熱頭暈怔忡菟絲子腰膝疼痛或頑麻無力菟絲子洗一兩牛膝麥蘗冬等分為末蜜丸梧子大鹽湯每下七十丸 腰膝疼痛二兩同入銀器內酒浸一寸五分

暴為末將原酒煮糊丸梧子大每服肝傷目暗 菟絲子三兩酒浸三日暴乾為末雞子白和身面卒腫用菟

空酒服三二十丸經驗方 婦人橫生菟絲子末酒服二錢一加 眉鍊癰瘡菟絲子炒研油調敷道

絲子一升酒五升漬二宿每飲時後方 婦人橫生菟絲子末酒服二錢一加 眉鍊癰瘡菟絲子炒研油調敷道

赤痛菟絲子熬黃黑為末雞痔如蟲咬上方同

苗氣味甘平無毒玉冊云汁伏三 王治研汁塗面去面黥本經 接碎煎湯浴小兒療熱痲宏附方 舊二面瘡

粉刺菟絲子苗絞汁塗之 小兒頭瘡菟絲子苗絞湯頻洗 目中赤痛野狐絲草搗汁附錄 難火蘭拾遺藏器

無毒主冷氣風癰開胃下食去腹脹久服

明目生經 本經胡國狀似菟絲子而微長

五味子上品 釋名望諸 爾雅音 玄及錄 會及恭曰五味皮肉甘酸核中辛苦都有鹹味此則五 集解別錄曰

生齊山山谷及代郡八月采實陰乾宏景曰今第一出高麗多肉而酸甜次出青州黃州味過酸其核並

似豬腎又有建平者少肉核形不相似味苦亦良此藥多膏潤烈日暴之乃可搗篩恭曰蔓生莖赤色花黃白

子杏而大子作房如落葵大如菓子出蒲州今河東陝西州郡尤多杭越間亦有之春初生苗引赤蔓於高木

其長六七尺葉尖圓似杏葉三四月開黃白花類蓮花狀七月成實叢生莖端如豌豆許大生青熟紫

入藥蒸曝不去子今有數種大抵相近雷斅言小紅皮嫩泡者色黑入滋補藥必脩治 數凡用以銅刀劈

者為真也時珍曰五味今有南北之分南產者色紅北產者色黑入滋補藥必脩治 數凡用以銅刀劈

已至申御以漿浸一宿焙乾用時氣味酸溫無毒 好古曰味酸微苦鹹味厚氣輕陰中微陽入手太陰血

珍曰入補藥熟用入嗽藥生用主治益氣效逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精 養五臟除熱生

補肺甘入中宮益脾胃之才日 主治益氣效逆上氣勞傷羸瘦補不足強陰益男子精

陰中肌別錄 治中下氣止嘔逆補虛勞令人體悅澤甄權 明目暖水臟壯筋骨治風消食反胃霍亂轉筋痲

奔豚冷氣消水腫心腹氣脹止渴除煩熱解酒毒大生津止渴治瀉痢補元氣不足收耗散之氣 睦子

散大李治喘欬燥嗽壯水鎮陽古好發明 成無已曰肺欲收急食酸以收之以酸補之芍藥五味之酸以

氣逆則宜此與乾薑同治之又五味子收肺氣乃火熱必用之藥故治嗽以之為君但有外邪者不可

藥用恐閉其邪氣必先發散而後用之乃良有痰者以半夏為佐喘者阿膠為佐但分兩少不同耳宗

爽曰今華州以西至秦多產之方紅熟時彼人采得蒸爛研成汁熬成膏量酸甘入蜜煉勻待冷收
器中肺寒人作湯時飲之其功甚速本經言其性溫今食之多致虛熱小兒益甚藥性論謂
其除熱氣日華子謂其暖水臟除煩熱後學至此多惑今既用治肺虛寒則更不取其除熱之說震亨
曰五味大能收肺氣宜其有補腎之功收肺氣非除熱乎黃昏嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥宜五味五
所謂食之多致虛熱者蓋收補之藥也何嗽之有又黃昏嗽乃火氣浮入肺中不宜用涼藥宜五味五
倍子斂而降之思邈曰五細藝瓶中以百沸湯投之入少蜜封置火邊良久湯成任飲元素曰孫真人千金
月令言五月常服五味以補五臟之氣遇夏月少蜜封置火邊良久湯成任飲元素曰孫真人千金
黃蘗煎湯服之使人精神頓加兩足筋力涌出也蓋五味子之酸能嗽須分南北生津止渴潤
散之氣好古曰張仲景入味丸用此補腎亦兼述微象形也機曰五味子治喘嗽須分南北生津止渴潤
肺補腎勞嗽宜用北公義門在肺宜用南者○價微如玉女入水不濡入火不灼○附方十一久嗽肺脹
精其子有五味淮南公義門在肺宜用南者○價微如玉女入水不濡入火不灼○附方十一久嗽肺脹
五味子二兩栗殼白湯炒過半兩為末白鴿丸久嗽不止丹溪方用五味子五錢甘草一錢半五倍子風
彈子大每服一丸水煎服○衛生家寶方
兩真茶四錢曬研為末以甘草五錢煎膏丸痰嗽并喘五味子一斤為末酒服方寸匕日三服忌食
綠豆大每服三十九丸沸湯下數日即愈也
兩服病遂不發○普濟方
野虛遺精北五味子一斤洗淨水浸援去核再以水洗核取盡餘味通置砂鍋中布瀝過入好冬蜜二
斤炭火慢熬成膏瓶收五日出一兩炒赤為末醋五更腎泄凡人每至五更即瀉泄一二次經
腎虛白濁糊丸梧子大每醋湯下三十九丸一兩炒赤為末醋五更腎泄凡人每至五更即瀉泄一二次經
脾惡溼溼則濡而困因去核不能治水水泄下流則腎水不足用五味子以強腎水養五臟吳茱萸以除
脾溼則泄自止矣五味子四兩為末以口中玉泉和丸燭弦風眼洗之談野翁種子方赤遊風丹漸漸腫
方女人陰冷免矢大頻陰中取效近效方

子焙研熱酒頓服二錢
自消神效保幼大全

達藥音果○本校正自果部釋名覆盆別陵藥別陰藥別寒毒編割田藤音苞時珍曰達藥與覆盆同類
經上品

達藥上陵之閒藤葉繁衍達達藥果異於覆盆故曰達達藥解別錄曰達藥生荆山平澤及冤句宏景曰達藥
莫陵藥即藤也其實八月始熟俚人名割田藤

盆是實名李當之云是人所食莓子以津汁為味其核微細今藥中用覆盆小異未詳孰是恭曰覆盆
達藥乃一物異名本謂實非根也李云莓子者近之矣然生處不同沃地則子大而甘瘠地則子細而
酸此乃達藥之子也按切韻莓音茂其子覆盆也藥者藤也則達藥明是藤蔓矣陶言達藥乃覆盆之苗莖
覆盆乃達藥之子也按切韻莓音茂其子覆盆也藥者藤也則達藥明是藤蔓矣陶言達藥乃覆盆之苗莖
是子一物異名皆非矣須曰達藥是覆盆苗處食之五月采實其苗葉采不遇時江南謂之莓然其地所
黃如半彈丸大而下有蒂承之如神蒂小兒多食之五月采實其苗葉采不遇時江南謂之莓然其地所

草部達藥覆盆子

上海錦章書局石印

生差晚三月始有苗八九月花開十月實用則同土良曰今觀采取之家說蓬蘽似薑母子紅色而大其味酸甘葉似野薔薇有刺覆盆子小其苗各別諸家本草不識故皆說蓬蘽是覆盆子之根天明曰母子蓬蘽子也樹母是覆盆子也宗爽曰蓬蘽非覆盆也別是一種雖枯敗而枝梗不散今人不見用此藏器曰其類有三種惟四月熟狀如覆盆而味甘美者為是覆盆子餘不堪入藥機曰蓬蘽微人謂之寒莓沿整作叢蔓生莖小葉密多刺其實四五月熟何當差晚耶覆盆莖粗葉疎結實大而疎散不似寒莓莖細以此註覆盆誤矣江南覆盆亦四五月熟何當差晚耶覆盆莖粗葉疎結實大而疎散不似寒莓莖細葉密結實小而成一則夏熟一則秋熟豈得同哉時珍曰此類凡五種子嘗親采以爾雅所列者校之始得其實小而成朵一則夏熟一則秋熟豈得同哉時珍曰此類凡五種子嘗親采以爾雅所列者校而厚而有毛六七月開小白花就帶結實三四顆成簇生逐節生葉葉大如掌狀類小葉葉面青而扁冬月苗葉不凋者俗名割田蕉即本草所謂蓬蘽也此二者俱可入藥一種蔓小於蓬蘽一枝葉葉小而背皆青光薄而無毛開白花四五月實成子亦小於蓬蘽而疎稀生則青黃熟則赤黑葉面青者俗名割田蕉即本草所謂蓬蘽子爾雅所謂蓬蘽子亦小於蓬蘽而疎稀生則青黃熟則赤黑葉面青故郭璞註云蓬蘽即梅也子有毛覆盆而大白花四五月實熟其色紅如櫻桃者俗名割田蕉即本草所謂蓬蘽子爾雅所謂蓬蘽子亦小於蓬蘽而疎稀生則青黃熟則赤黑葉面青櫻桃葉而狹長四月開小白花結實一種就地生蔓長數寸開黃花結實如覆盆而鮮紅不可食者本草所謂懸鉤子者也詳見本條一種就地生蔓長數寸開黃花結實如覆盆而鮮紅不可食者本草所謂蛇莓也見本條如此辨析則蓬蘽覆盆白定矣李當之陳士良陳藏器寇宗奭汪機五說近是而欠明蛇莓宏景以蓬蘽為根覆盆為子馬志蘇頌以蓬蘽為苗覆盆為子蘇恭以為一物大明以樹生者為覆盆皆臆說不可據

氣味酸平無毒別錄曰鹹土良
主治安五臟益精氣長陰令人堅強志倍力有子久服輕身不老經本
療暴中風身熱大驚別錄
益顏色長髮耐寒溼恭
發明見覆盆
附方新
長髮不落蓬蘽子榨油日塗之聖

苗葉同覆
盆 同覆
方惠

覆盆子 別錄 校正 自果部 釋名 荳爾雅 蘇益 雅西國草 經畢楞伽經 大麥苳 音 插田蕉 音 烏蘼子 綱目 當

似覆盆之形故名之宗爽曰益腎臟縮小便服之當覆其濁器如此取名也時珍曰五月子熟**集解**別其色烏赤故俗名烏蘼大麥苳插田蕉亦曰栽秧蕉數種本草一名馬廐一名陸荆殊無義意錄曰五月采藏器曰佛說蘇密那花點燈正言此花也此花有三種以四月熟狀如覆盆味甘美者為是餘不堪入藥今人取芽苳常覆盆誤矣宗爽曰處處有之秦州永興華州尤多長條四五五月紅熟山中入及時采來賣其味酸甘外如荔枝大如櫻桃軟紅可愛失時則就枝生蛆食之多熟熟時五六分熟便可采烈日曝乾今人取汁作煎為果采時著水則不堪煎時珍曰蓬蘽子色皆烏赤故能補正誤盆江東蕪襄盆以四五月熟而色紅者乃插田蕉正與別錄五月采相合二蕉熟時色皆烏赤故能補正誤盆江東名懸鉤子大小形狀氣味功力同北土無懸鉤南地無覆盆是土地有前後生非兩種物也時珍曰脩南土覆盆極多懸鉤是樹生覆盆是藤生子狀雖同而覆盆色烏赤懸鉤色紅赤功亦不同今正之脩

治 說曰覆盆子五月采之烈日曬乾不爾易爛雷曰凡使用東流水淘去黃葉并皮蒂取子以酒拌氣蒸一宿以東流水淘兩遍又曬乾方用時珍曰采得搗作薄餅曬乾密貯臨時以酒拌蒸尤妙

味甘平無毒 辛微熱王治益氣輕身令髮不白別錄補虛續絕強陰健陽悅澤肌膚安和五臟溫中益力

療癆損風虛補肝明目並宜搗篩每旦水服三錢馬志男子腎精虛竭陰痿能令堅長女子食之有子權

食之令人好顏色榨汁塗髮不白藏器益腎臟縮小便取汁同少蜜煎為稀膏點服治肺氣虛寒宗發

時珍曰覆盆子蓮藥功用大抵相近雖是二物其實一類而二種也一旱附方新陽事不起覆盆子酒浸熟一晚熱兼用無妨其補益與桑椹同功若樹莓則不可混采者也

集簡方 且酒服三錢

葉氣味微酸鹹平無毒王治援絞取汁滴目中去膚赤出蟲如絲線藏器明目止淚收溼氣時珍發明須曰

元亮海上集驗方治目暗不見物冷淚浸淫不止及青盲天行目暗等疾取西國草一名畢楞伽一名覆盆子日曝乾搗極細以薄綿裹之用飲男乳汁浸如人行九里久用點目中即仰臥不過三四日

視物如少年禁酒麪油物時珍曰按洪邁夷堅志云潭州趙太尉母病爛弦疳眼二十年有老嫗云此中有蟲吾當除之入山取草蔓葉咀嚙留汁入筒中還以草紗蒙眼滴汁漬下弦轉瞬間蟲從紗上出

數日下弦乾復如法滴上弦又得蟲數十而愈附方新牙疼點眼有蟲隨影淚出成塊也無新葉乾者

後以治人多驗覆盆子葉也蓋治眼妙品附方新牙疼點眼有蟲隨影淚出成塊也無新葉乾者煎濃汁亦可即大臘瘡潰爛覆盆子葉為末用酸漿水洗後搽

根主治痘後目瞤取根洗搗澄粉日乾蜜和少許點於瞤丁上日二三自散百日內治之久即難療

時珍○活幼口議

懸鉤子拾遺移入此釋名沿鉤子日爾雅山莓爾雅木莓郭樹莓日華藏器曰莖上集解江淮林澤

間莖上有刺其子如梅子酸美人多食之機曰樹莓枝梗柔軟有刺頗類金櫻四五尺其莖白色有倒刺

宋之肇帶而中實味酸覆盆則蒂脫而中虛味甘為異時珍曰懸鉤樹生高四五尺其莖白色有倒刺

其葉有細齒青色無毛背後淡青頗似櫻桃葉而狹長又似地棠花葉四月開小白花結實色紅今人亦通呼為蕪子爾雅云葍山莓也郭璞注云今之本莓也實似蕪莓而大可食孟詵大明並以此為覆

氣味酸平無毒王治醒酒止渴除痰去酒毒藏器搗汁服解射工沙蟲毒時珍

葉主治燒研水服主喉中塞藏器

根皮氣味苦平無毒王治子死腹中不下破血婦人赤帶下久患赤白痢膿血腹痛殺蟲毒卒下血並濃

煮汁飲之藏器附方新血崩不止木莓根四兩酒一盞煎七分崩中痢下治婦人崩中及下痢日夜數十起

薇根補根較藥各一斛劉入釜中水淹上四五寸煮減三之一去欲死者以此入腹即活懸鉤根澤取汁煎至可丸梧子大每溫酒服十丸日三服千金翼

蛇莓別錄下品釋名蛇蕪音地蕪機近地而生故曰地莓瑞曰蕪老時熟紅于地其中空集解宏景曰

野多有之子赤色極似莓子而不堪啖亦無以此為藥者保昇曰所在有之生下溼地莖頭三葉如黃子但光潔而小微有皺紋食黃比蕪菜花差大春末夏初結紅子如荔枝色機曰蛇莓莖長不盈尺莖端

惟結實一顆小而光潔誤食脹人非若覆盆苗長大春末夏初結實數顆微有黑毛也時珍曰此物就地引細蔓節節生根每枝三葉葉有齒刻四五月開小黃花五出結實鮮紅狀似覆盆而面與蒂則不同也其根甚

細本草用汁當是取其莖葉并根也仇遠稗史詠作蛇繆草言有五葉七葉者又言俗傳食之能殺人亦

冷涎耳發

汁氣味甘酸大寒有毒主治胸腹大熱不止別錄傷寒大熱及溪毒射工毒甚良宏景通月經燒瘡腫傳蛇傷

明主孩子口噤以汁灌之孟詵傳湯火傷痛即止時珍附方舊二口中生瘡天行熱甚者蛇莓自然汁半傷寒

下腫生瘡以蛇莓汁服二合日三服仍水時方水中毒病蛇莓根搗末服之并導下部亦可飲汁一二升夏月

以器貯水浴身亦宜投少許附后

使君子宋開釋名留求子志曰俗傳潘州郭使君療小兒多是獨用此物後醫家因號為使君子也時珍

解志曰生交廣等州如后子稜深而兩頭尖似詞梨勒而輕頌曰今嶺南州郡皆有之生山野中及

亦兼用殷時珍曰原出海南交趾今閩之紹武蜀之眉州皆栽種之亦易生其藤如葛繞樹而上葉青如

五加葉五月開花一簇二十餘紅如輕盈如海棠其實長寸許五瓣合或氣味甘溫無毒主治小兒五

疳小兒便白濁殺蟲療瀉痢實健脾胃除虛熱治小兒百病瘡癰時珍曰凡殺蟲藥多是苦辛惟使

人小兒有蟲病但每月上旬侵晨空腹食使君子仁數枚或以煎湯嚥下次日蟲皆死而出也或云七

生七煨食亦良忌飲熱茶犯之即瀉此物味甘氣溫既能殺蟲又益脾胃所以能飲虛熱而止瀉痢為小

兒諸病要藥俗謂殺蟲至盡無以消食鄙俚之言也樹附方新小兒脾疳使君子飲每服一錢儒門事親

有蠱屋有蟻國有盜福耶禍耶倘養者先去三尸可類推矣附方六小兒脾疳飲每服一錢儒門事親

小兒痞塊腹大肌瘦而黃瀉成疳疾使君子仁三錢水蠶子仁五錢為末水丸龍眼大每小兒痢痛口流

便君子仁為末米飲五更 小兒虛腫 頭面陰囊俱浮用使君子一兩去殼蜜五錢 頭顱面瘡 使君子仁調服一錢 全幼心鑑 普濟方 蟲牙疼痛 使君子煎湯頻

許浸三五個臨臥時細嚼香 油送下久久自愈 木鼈子 宋開校正 移入本部 釋名 木蟹 蟹狀故以似名 集解 志曰出朗州及南中七八月采實 領曰今湖廣

有五極狀如山藥青色面光四月生黃花六月結實似枯樓而極大生青熟紅黃色肉上有軟刺每一 實有核三四十枚其狀扁而如鑿八九月采之嶺南人取嫩實及苗葉作茹蒸食 宗爽曰有軟刺每一

一枯但根不死春旋生苗葉如蒲萄其子一頭尖者為雄凡植時須雌雄相合麻纒定及其 生也則去雄者方結實時珍曰木鼈核形扁闊阿大如團碁子其仁青綠色相入藥去油者

仁氣味甘溫無毒 甘時珍曰苦微 王治 折傷消結腫惡瘡生肌止腰痛除粉刺野蠶婦人乳癰肛門腫痛

開醋磨消腫毒 大治疔積痞塊利大腸瀉痢痔瘡瘰癧 珍時 發明 按劉續雲雪錄云木鼈子有毒不

實得一方以木鼈子煮豬肉食之其幼子當夜長子明日死友人馬文誠方書亦載此方因著此為戒

時珍曰南人取其苗及嫩實食之無恙則其毒未應至此或者與豬肉不相得或犯他物而然不可盡

告附方 舊一新 酒疸脾黃 利效 劉長春濟急方 腳氣腫痛 木鼈子油盡為度每兩邊越半兩

愈末熟酒服二錢令醉得汗 淫瘡脚腫 膜行履難者用藥四錢在中經紙包煨熟空心米飲送下服後便

兩脚加妙 楊拱醫方摘要 二 陰疝偏墜 痛甚者木鼈子一個磨醋調黃藥 久瘧有母 木鼈子穿山甲

服三錢空心溫酒 腹中痞塊 木鼈子仁五兩用積豬腰子二付批開入內簽定煨熟同搗爛 小兒疳

疾 木鼈子仁使君下一等分搗泥米飲仁芥子大疳病目瞭 末米糊丸龍眼仁二錢胡黃連一錢為

食之為妙 倒睫拳毛 包因風入脾經致使風癢不住手擦日久赤爛拳毛上下大服蟬蛻藥為妙 孫天仁集

效 肺虛久嗽 木鼈子款冬花各一兩為末每用木鼈子二錢焚之吸烟良久吐涎以茶潤喉 小兒鹹弊 子三四

個磨水飲以雪糕壓下即吐 水瀉不止 膏納臍中貼之外以膏藥護住 吳曼扶壽椿方 痢疾禁口

木鼈子六個研泥分作二時再換半個燒餅一個切作兩半只用半餅作一窠納藥方 腸風瀉血 木鼈子

乘熱覆在病人臍上一時再換半個燒餅一個切作兩半只用半餅作一窠納藥方 邪真入經驗方 內 腸風瀉血 木鼈子

酒空心服之為末每服一錢煨慈白 肛門痔瘡 孫用秘寶方用木鼈仁三枚砂盆搗如泥入湖沸湯方 用木鼈仁帶潤者雌雄各五個乳細作七丸盤覆淫處勿忍乾每以一九唾化開貼痔上其痛瘰癧經 卽止一夜一丸自消也 江夏鐵佛寺蔡和尚病此痛不可忍有傳此而愈用治數人皆有效 瘰癧經

年木龍仁二個去油研以雞子白和入瓶內小兒丹瘤木龍子仁研如泥醋調傳之外科精義耳卒熱腫仁一兩

赤小豆大黃各半兩為末每以風牙腫痛搽之木龍子仁磨醋

番木龍目釋名馬錢子目苦實把豆目火失刻把都時珍曰狀似馬之集解西土州諸處皆有之蔓生

夏開黃花七八月結實如枯樓生青熟赤亦如木龍其核小於木龍而色白彼人言治一百二十種病每證各有湯引或云以豆磨制過用之良或云能毒狗至死

仁氣味苦寒無毒主治傷寒熱病咽喉痹痛消痞塊並含之嚙汁或磨水噉時附方新喉痹作痛木

龍青木香山豆根等分為羅喉風腫番木龍仁一個木香三分同磨水調熊膽三分癰瘡入目苦實把

馬錢子半箇輕粉水花銀硃各五分次臚田香枯藁少許患處取效唐瑤經驗方癰瘡入目苦實把

馬兜鈴實宋開校正草併入唐本釋名都淋藤後獨行根唐本雲南根綱三百兩銀藥附木而上葉

脫時其實尚垂狀如馬頂之鈴故得名也時珍曰其根吐利人微有香氣故有獨集解志曰獨行根生

平澤叢林中皆有之山南名為土青木香一名兜鈴根蔓生葉似薔薇而圓且細花青白色其子大如

桃李而長十月以後枯則頭開四系若囊其中實薄扁似榆莢其根扁而長尺許作葛根氣亦似漢防

己二月八月采根額曰馬兜鈴今關中河東河北江淮瀟湘州郡皆有之春生苗作蔓繞樹而生葉如

山積葉而厚大背白六月開黃紫花頗類枸杞花七月結實如大棗狀似鈴作四五瓣其根名雲南根

微似木香大如小指赤黃色七八月采實暴乾實脩治東屋角畔待乾劈開去革膜取淨子焙用氣味苦寒無毒厚氣薄陰中微陽入手太陰經主治

肺熱欬嗽痰結喘促血痔瘻瘡實肺氣上急坐息不得效逆連連不止權清肺氣補肺去肺中淫熱素

發明時珍曰馬兜鈴體輕而虛熱則懸而四開有肺之象故能入肺氣寒味苦微辛寒能清肺熱苦辛

膠糯米則正補肺之藥也湯劑中用多推矣附方舊三水腫腹大喘急馬兜鈴煎湯肺氣喘急馬兜

故崔氏方用以吐蠱其不能補肺中用多推矣附方舊三水腫腹大喘急馬兜鈴煎湯肺氣喘急馬兜

為末每服一錢水一盞煎六分溫呷或噙之簡要濟眾一切心痛不拘大小男女大馬兜鈴一個燈

方解蛇蠱毒飲食中得之咽中如有物噤不下吐不出心下熱痔瘻腫痛以馬兜鈴於瓶中燒烟

獨行根氣味辛苦冷有毒不可多服吐利不止主治鬼疰積聚諸毒熱腫蛇毒水磨為泥封之日三

四次立遼水煮一二兩取汁服吐蠱毒又搗末水調塗疔腫大效唐本治血氣明利大腸治頭風瘡瘻

瘡時珍出精義附方新舊一五種蠱毒肘後方云席辨刺史言嶺南人入多於食中毒人漸不能食胸背漸脹

十日慎食毒物不遑更服土人呼為三百兩銀藥又支太醫云兜中草蠱毒此術在西夷之西欲死

者用兜鈴苗一兩為末水煎頓服當吐盡出未盡再服或為末水調服亦驗三棱川烏頭炒過三疔腫復發鈴根

一錢即消化蠱出神效聖惠方腸風漏血馬兜鈴藤穀精草荆三棱川烏頭炒過三疔腫復發鈴根

搗爛用蜘蛛網裹傳肘後方惡蛇所傷青木香半兩煎湯飲之袖珍方

檀藤子宋開校正自木部釋名象豆實開檀子華拾遺時珍曰其子集解藏器曰按廣州記云檀藤子

通草藤其實三年方熟角如弓袋子若雞卵其外紫黑色其殼用貯丹藥經年不壞取其仁入藥炙用時珍曰子紫黑色微光大一二寸圓而扁人多剔去肉作藥瓢垂于腰間也

仁氣味濇甘平無毒主治五痔蠱毒飛尸喉痹以仁為粉微熬水服一二匕亦和大豆澡面去黔黯藏器

治小兒脫肛血痢瀉血並燒灰服或以一枚割瓢熬研空腹熱酒服二錢不過三服必效開寶諸藥毒

時珍附方新舊一喉痹腫痛檀藤子燒研酒服五痔下血檀藤子燒存性米飲服腸風下血華陀中藏

草木狀附方新舊一喉痹腫痛檀藤子燒研酒服五痔下血檀藤子燒存性米飲服腸風下血華陀中藏

子二個不蛀卓莢子四十九個燒存性為末每服二錢溫酒下少頃再飲酒一盞趁口吸極效聖附

惠方用檀藤子三枚厚重者淫紙七重包煨熟去殼取肉為末每服一錢食前黃芪湯下日一服

錄合子草拾遺藏器曰子及葉有小毒主蠱毒及蛇咬搗傳

預知子宋開釋名聖知子華聖先子華盍合子華仙沼子則問其有聲當預知之故有諸名時珍曰仙沼

疑是仙集解志曰預知子有皮殼其實如卓莢子頌曰舊不著所出州土今惟蜀黔壁諸州皆有之

東之訛集解蔓生依大木上葉緣有三角面深背淺七月八月有實作房生青熟深紅色每房有子五

七枚如卓莢子斑褐色乾光潤如飛蛾今蜀人極貴重之云亦難得采

無時其根冬月采之陰乾治蠱其功勝于子也山民目為聖無憂

子仁氣味苦寒無毒仁者可帶主治殺蠱療蠱治諸毒去皮研服有效開寶治一切風補五勞七傷其

功不可備述治疔瘡瘰癧消宿食止煩悶利小便催生中惡失音髮落天行溫疾塗一切蛇蟲蠶咬治

一切病每日吞二七粒不過三十粒永遼明附方新預知子丸治心氣不足精神恍惚語言錯妄公憚

多異夢寐即驚魘或發狂眩暴不知人並宜服此預知子去皮白茯苓枸杞子石菖蒲茯神和劑局方

參地骨皮遠志山藥黃精蒸熟朱砂水飛等分為末煉蜜丸莢子大每服一丸人參湯下

上海錦章書局印

耳卒聾閉八九月取石榴開一孔留蓋入米醋滿中蓋定麪裹糖火中煨熟取出入少癰風有蟲眉落

預知子膏用預知子雄黃各二兩為末以乳香三兩同水一斗銀鍋煮至五升聖惠方

○根氣味苦冷無毒主治解蠱毒石白搗篩每用三錢溫水服立已蘇頌

牽牛子別錄下品釋名黑丑綱目草金鈴炮炙盆甌草綱目狗耳草救荒宏景曰此藥始出田野人牽牛謝藥故以

蓋以丑屬牛也金鈴象子形盆甌狗耳象葉形段成式酉集解宏景曰近人隱其名為黑丑白者為白丑

陽雜俎云盆甌草蔓如著積結實後斷之狀如益甌是矣集解宏景曰牽牛子實黑色形如棗子核黃

花似旋花作碧色不黃亦不似藕豆綱目處處有之二月種子三月生苗作藤蔓繞籬高者或二三

丈其葉青有三尖角七月生花微紅帶碧色似鼓子花而大八月結實外有白皮裏作縷每莢內有子

四五枚大如蕎麥有三稜有黑白二種九月後收之宗奭曰花朵如鼓子花但碧色日出開日西萎其

核如木猴梨子而色黑謂之黑蕎麥二種黑者處處有白皮裏作縷每莢內有子四五枚大如蕎麥

斷之有白汁葉有三尖如楓葉花不作瓣如旋花而大其實有蒂裏之生青枯白其核與棠棣子核一

樣但色深黑兩白者人多種之其蔓微紅無手有柔刺斷之有濃汁葉團有斜尖竝如山藥莖葉其花

色稍粗人亦采嫩實蜜煎為果食呼為天茄因其蒂似茄也

子修治綱目凡采得子曬乾水淘去浮者再曬拌酒蒸從已至未曬乾收之臨用氣味苦寒有毒權曰

小毒說曰多食稍冷日今多只碾取頭末去皮麤不用亦有半生半熟用者

人元氣天明曰味簽得青木香乾薑良主治下氣療腳滿水腫除風毒利小便別錄治疰癰氣塊利大小

便除虛腫落胎甄權取腰痛下冷膿瀉蠱毒藥并一切氣壅滯明和山茱萸服去水病除氣分溼熱三

焦壅結李杲逐痰消飲通大腸氣祕風祕殺蟲達命門珍發明宗奭曰牽牛丸服治大腸風祕壅結不可

藥引則入氣以大黃引則入血利大腸下水積色俱實者瀉氣分溼熱上攻喘滿破血中之氣震亨曰牽牛以氣

牛屬火善走黑者屬水白者屬金若病下水積色俱實者瀉氣分溼熱上攻喘滿破血中之氣震亨曰牽牛以氣

探戒果曰牽牛非神農藥也名醫續注云味苦寒能除溼氣利小便便祕者不可輕用驅逐致虛先哲

矣何也凡用牽牛少則動大便多則泄下如水乃瀉氣之藥其味辛祥久悍猛烈雄壯此說氣味主治俱誤

哉夫溼者水之別稱有形者也若肺先受溼溼氣不得施化致大小便不通則宜用之蓋牽牛感南方

熱火之化所生火能平金而泄肺溼去則氣得周流所謂五臟有邪更相平也今不問有溼無溼但傷

食或有熱證俱用牽牛趙化之藥豈不誤哉況牽牛止能泄氣氣中且牽牛辛烈不能比血中之溼熱溼從下

受之下焦主血血中之溼宜苦寒之味反以辛藥泄之傷人氣氣且牽牛辛烈不能比血中之溼熱溼從下

其傷人必矣經云辛泄氣辛走氣辛泄肺氣病者無多食辛況飲食失節勞役所傷是胃氣不心行地黃

之苦寒涼血益血少加紅花之辛溫以泄血絡桃仁之辛溫除燥潤腸仍不可專用須子補中益氣泄

陰火之藥內加而用之何則上焦元氣已自虛弱若反用牽牛大辛熱氣味俱陽之藥以泄水泄元氣

利其小便渴其津液是謂重虛重則必死輕則天人故張文謄云牽牛不可耽嗜脫人元氣見人有酒
食病痞者多服牽牛丸散取快一時藥過仍病隨服隨效後復病以致久服脫人元氣猶不知悔也

張仲景治七種淫熱小便不利無一藥犯牽牛者仲景豈不知牽牛能泄利小便乎為淫熱之根在
下焦是血分中氣病不可用辛甘之藥泄上焦牽牛亦同時珍曰牽牛自宋以後北人常服用取快及劉守真

虛虛母絕人生此之謂也幸其目擊其事故著此說極力闢之然東漢時此藥未入本草故仲景
張子出又倡為通用下藥李明之目擊其事故著此說極力闢之然東漢時此藥未入本草故仲景

不知假使知之必有用法不應捐棄況仲景未用之藥亦多矣執此而論蓋矯枉過正矣牽牛治水氣
在脾喘滿腫脹下焦鬱遏腰背脹腫及大腸風氣祕結卓有殊功但病在血分及脾胃虛弱而產者

則不可取快一時及常服暗傷元氣也一宗室夫人年幾六十餘年苦腸結旬日一脾胃虛弱而產者
養血濁燥藥則泥膈不快服暗傷元氣也一宗室夫人年幾六十餘年苦腸結旬日一脾胃虛弱而產者

鬱血吐酸痰留滯消黃徒入血分不能通氣俱為痰阻故無效也乃用牽牛末早茶膏飲不能下滋腸腑非
血燥比也潤劑留滯消黃徒入血分不能通氣俱為痰阻故無效也乃用牽牛末早茶膏飲不能下滋腸腑非

通利自是但覺腸結多熱色病下極脹痛且復精爽不通蓋坐臥不能走氣分呻吟者三焦晝夜醫用通利藥不效
遣人叩子思此乃淫熱之邪在精道壅脹路病在二陰之間故前阻小便後阻大便病不在大腸

勝脫也乃用揀實荷香穿山甲諸藥入牽牛加倍水煎服一服而減三服而平牽牛能達右腎命門走
精隧人所不知惟東垣李明之知之故明之治下焦陽虛天眞丹用牽牛以鹽水炒黑入佐沈香杜仲

破故紙官桂諸藥深得補瀉兼施之妙方見醫學發明又東垣治脾太過身浮腫喘不得臥腹如
鼓海金沙散亦以牽牛為君則東垣附方舊八新搜風通滯風氣所攻臟腑積滯用牽牛子以童尿浸

未盡牽牛不用但施之得道耳附方舊八新搜風通滯風氣所攻臟腑積滯用牽牛子以童尿浸
令乾每日鹽湯下三十粒極能搜風亦三焦壅塞胸膈不快頭昏目眩涕唾痰涎精神不爽利膈丸生

消虛腫久服令人體清瘦斗門方一切積氣宿食不消黑牽牛子四兩半生半炒不蛀半日生絹袋盛掛風處
薑自然汁煮糊丸梧子大每服二一

丸丸普濟方順男婦五積五積積氣成聚用黑牽牛一斤生搗末入兩餘滓以新瓦炒香再搗取四兩
氣丸普濟方順男婦五積五積積氣成聚用黑牽牛一斤生搗末入兩餘滓以新瓦炒香再搗取四兩

三十九丸當下積聚之物尋常行胸膈食積每服二三十丸巴豆霜隨所傷湯下僞門事親氣築奔衝忍牛
氣每服十丸甚妙博濟方二錢半追蟲取積下亦消水腫腎氣作痛錢用豬腰子切縫入茴香百粒

為丸每服一錢紫蘇湯下普濟方二錢半追蟲取積下亦消水腫腎氣作痛錢用豬腰子切縫入茴香百粒
川椒五十粒抄牽牛末入內紮定紙包煨熟空傷寒結胸心腹硬痛用牽牛頭末一錢白

心食之酒下取出惡物效楊仁齋直指方大腸風祕結瀉牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁
以茶服牽牛子半生半熟等分每服二錢薑湯下未通再大腸風祕結瀉牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁

大每湯服三十方加生大黃等分每服二錢薑湯下未通再大腸風祕結瀉牽牛子微炒搗頭末一兩桃仁
丸冠氏衍義水蠱脹滿餅臥時焙熟食之以茶下降氣散用黑牽牛頭末四陰水陽水三兩大黃末

川泛溢非孟杓可取必以神禹決水之法治之故名禹功散用黑牽牛頭末四陰水陽水三兩大黃末
兩茴香一兩炒為末每服一二錢以生薑自然汁調下當轉下氣也僞門事親

草部牽牛子旋花

上海錦章書局石印

本

草部牽牛子旋花

上海錦章書局石印

三兩陳米飯錫糕一兩為末柳丸梧子大每水腫尿瀉幸牛末每服方寸匕以淫氣中滿足脛微腫小

服五十九薑湯下欲利服百丸醫方捷徑水氣浮腫氣促坐臥不得用牽牛子二兩微炒搗末

欬嗽黑牽牛末一兩厚朴制半兩為末每服二錢普濟方水氣浮腫以烏牛屎浸一宿平旦入葱白二兩微炒搗末

從小便中心分二服水脾淫腫滿方見海風毒腳氣薑湯下取小便利乃止亦可吞之其子黑色正丸生

子核方小兒腫病大小便不利黑牽牛白牽牛各二兩炒取頭末并華水小兒腹脹水氣流腫膀胱實

肝研一錢青皮湯和丸綠豆大每服二十丸蘿蔔子煎湯下聖濟總錄小兒腹脹水氣流腫膀胱實

木香減半丸服鄭氏心下小兒方疳氣浮腫常服自消黑牽牛白牽牛各半生半炒取末陳皮青皮等分

疳氣耳聾疳氣攻耳聾陰腫牽牛末一錢豬腰子半個去膜小兒雀目肝一片同麪作角子二個

炙熟食米飲風熱赤眼丸慈牽牛末以慈白煮研丸綠豆大每服五面上風刺黑牽牛酒浸三宿為末先

下普濟方風熱赤眼丸慈牽牛末以慈白煮研丸綠豆大每服五面上風刺黑牽牛酒浸三宿為末先

玄方摘面上粉刺脂藥中如米粉黑牽牛末對入面面上雀斑夜傳日洗摘玄方馬脾風病小兒急驚風

氣急腎縮鼻張悶亂欬嗽煩渴痰潮聲嘎俗名馬脾風不急治死在旦夕白牽牛半生半炒黑牽牛半

生半炒大黃煨檳榔各取末一錢每用五分蜜湯調下痰急加輕粉一字名白牽牛半生半炒黑牽牛半

小兒夜啼黑牽牛末一錢水調傳臨月滑胎牽牛子一兩白榆皮煎湯下少許研末覺胎黃奪命散全幼心鑑

生半炒為末每服二錢薑湯下腸風瀉血牽牛五兩牙早三兩水浸三日去早以酒一升煮乾焙研末

減後日服五丸痔漏有蟲黑牽牛各一兩炒為末以豬肉四兩切碎炒熟蘸末食盡以白米飯服

飲下藥時先日勿夜飲次早空心將豬肉四兩炙切片煎末細細嚼漏瘡水溢乃腎虛也牽牛末二錢半入

食取心下膿血為效量人加減用忌酒色油膩三日儒門事親漏瘡水溢乃腎虛也牽牛末二錢半入

更溫服以大便出膿血為妙淫熱頭痛黑牽牛七粒砂仁一粒研末并華水調氣滯腰痛牽牛一兩次日多

赤安水上自然一牛生一牛熟不得撥動取末一兩入硫黃末二錢半同研勻分作三分每分用白麩

一服痛即止許學士本事方

旋花本經上品釋名旋菑蘇筋根本續筋根圖鼓子花經圖純腸草經圖美草別天劍草目網纏枝牡丹恭曰旋花即

其根似筋故一名筋根納曰旋菑當作菑旋音福鐵用根入藥別有旋覆音瓊伏用花入藥今云旋菑

謀矣類曰別錄言其根主續筋故南人呼為續筋根一名純腸草象形也余夷曰世俗謂之鼓子花言

其花形肖也時珍曰其花不作瓣狀如軍中所吹鼓子故有旋花鼓子之名一種千葉香色似粉紅牡丹俗呼為總枝牡丹

澤皆有蔓生葉似薯蕷而狹長花紅根無毛節蒸熟堪啖味甘美名筋根二月采根日乾蒸花也所在川

今河北汴西開陝田野中甚多最難鋤艾治之又生四五月開花其根寸截置土溝澆涉旬苗生葉保

昇說是矣時珍曰旋花田野蔓生逐節延蔓葉如菠菜葉而小至秋開花如白牽牛子花粉紅色

亦有千葉者其根色白大如筋不結子○項曰點南施州有一種旋花粗莖大葉無花若亦似高良薑腹

也一物正誤中冷痛煮服甚效作丸散服辟穀止飢近有山從江南還用此術與人斷穀皆得百日不

飢不瘦但志淺嗜深不能久服爾其葉似蔓花赤色味辛狀如荳蔻此旋花即其花也今山東甚多又

註旋覆花也陶說乃山薑爾山薑味辛都非此類又因旋覆花名金沸遂作此氣味花甘根辛溫無毒

旋覆花也陶說乃山薑爾山薑味辛都非此類又因旋覆花名金沸遂作此氣味花甘根辛溫無毒

花別名皆誤矣又云從北國來者根似芎藭與高良薑全無彷彿亦誤也

日花根莖葉並甘主治面好黑色媚好益氣根主腹中寒熱邪氣本利小便久服不飢輕身續筋骨合

滑微苦能制雄黃

金瘡錄搗汁服主丹毒熱補勞損益精氣時珍曰凡藤蔓之屬象人之筋所以多治筋病旋

京師還見北土車夫每載之云暮歸煎湯附方新舊一被所斷筋旋葛根搗汁瀝瘡中仍以滓傅之日三

飲可補損傷則益氣續筋之說尤可徵矣

奴有效者王祕精益髓花三兩五月五日采之雞頭子仁一百顆並為末以金櫻子二百枚去皮水

煎外臺祕要服之至百日永不泄如要泄以冷水調車前末半合服之忌葵菜薩謙齋酒下竹三十九

服之至百日永不泄如要泄以冷水調車前末半合服之忌葵菜薩謙齋酒下竹三十九

紫葳本經移入此部釋名凌香蘇陵莒經本女葳甄華本武威吳瞿陵普吳鬼目謂赤豔曰紫葳

而此高數丈故曰凌霄正誤宏景曰是瞿麥根方用之不應乃在太行山志曰紫葳瞿麥皆本經藥必當

既垂生處亦不相關爾雅云若一名陵莒郭璞注云一名陵時又名凌霄此為真也項曰孔穎達詩疏

亦云若一名陵時今本草無陵時之名惟鼠尾草有之豈所傳不同抑陶蘇之誤耶時珍曰按吳氏本

草紫葳一名瞿陵陶宏景誤作瞿麥字爾集解別錄曰紫葳生西海川谷及山陽蔡曰此凌霄花也

尾紫白陵翹無誤矣並正之連莖葉用詩云有若之華其黃矣爾雅云陵莒花也

華葉白華茂山中亦有白花者項曰今處處皆有生女科藥用時珍曰凌霄野生蔓纔數尺得木而上

延至巔其花黃赤夏中乃盛今醫家多采花乾之有女科藥用時珍曰凌霄野生蔓纔數尺得木而上

即高數丈年久者藤大如杯春初生枝一枝數葉尖長有齒深青色自夏至秋開花一枝十餘朵大如

牽牛花而頭開五瓣赭黃色有細點秋深更赤八月結莢如豆莢長三寸許其子輕薄如榆仁馬兜鈴

根狀秋後采之陰乾

根氣味酸微寒無毒時珍曰神農雷公岐伯辛扁鵲苦鹹黃帝甘無毒權曰畏鹵主治婦人產乳餘疾

花同根氣味酸微寒無毒時珍曰神農雷公岐伯辛扁鵲苦鹹黃帝甘無毒權曰畏鹵主治婦人產乳餘疾

本草綱目卷之二十二 草部 紫葳 營實摘錄

上海錦章書局印

崩中癥瘕血閉寒熱羸瘦養胎經本產後奔血不定淋瀝主熱風風痼大小便不利腸中結實甄權酒臚熱

毒風刺風婦人血膈遊風崩中帶下明大

莖葉氣味苦平無毒主治瘰癧益氣別錄熱風身癢遊風風瘰癧血帶下花及根功同明大治喉痹熱痛涼

血生肌時珍發明時珍血分能去血中伏火故主產後諸疾及血熱生風之證也附方舊一新婦人血崩

麥香花為末每酒服二錢後服四物湯丹溪纂要糞後下血飲香花普濟方消渴飲水煎一蓋分二兩搗碎水一蓋半嬰兒不乳

以乳送下便可乳熱者可服寒者勿服昔有人休官後雲遊湖湘脩合此方救危甚多普濟方

久近風癩去再噴花或根葉為末每服三錢溫酒下服畢解髮不住手梳口噉冷水溫則吐通身風癢

錢花為末酒服一醫學正傳大風癩疾酒下先以藥湯浴過服此出臭汗為效儒門事親各七蟬蛻五品各九個作

服鼻上酒敷王穆百一選方用花山厄子等分為末每茶服二錢日二服數日除根臨川曾子仁

走皮趨瘡悲煩滿頂浸淫淫爛延及兩耳癢而出水發歇不定田野名婦人陰瘡或紫藏為末用鯉魚腦

耳卒聾閉凌膏葉并取自然女經不行前溫酒下徐氏胎產方食

營實薔薇經上品本釋名薔薇別錄山棘別牛棘別牛勒別刺花綱目時珍曰此草蔓柔靡依牆援而生故

生如營星然故謂之營實集解別錄曰營實生零陵川谷及蜀郡八月九月采陰乾宏景曰營實即

所在有之蔓生莖間多刺其花有百葉出六或赤或白子若杜棠子時珍曰薔薇野生林壑間春

抽嫩蘂小兒招去皮刺成簇生青熟紅其核有白毛如金櫻子核八月采之根采四五月開花四出黃心

粗葉大延長數丈花亦厚大有白黃紅紫數色花最大者名佛見笑小者名木香皆香豔可人不入藥

用南番有薔薇露云是此花之露水香穠異常

營實氣味酸溫無毒別錄日主治癰疽惡瘡結肉跌筋敗瘡熱氣陰蝕不瘳利關節本經久服輕身益氣

錄別治上焦有熱好暝時珍附方新眼熱昏暗營實枸杞子地黃子各二兩為聖惠方

根氣味苦瀋冷無毒主治止洩痢腹痛五臟客熱除邪逆氣疽癰諸惡瘡金瘡傷撻生肉復肌別治熱

毒風除邪氣止赤白痢腸風瀉血通結血治牙齒痛小兒疳蟲肚痛癰疽疥癬明頭瘡白禿除風熱

溼熱縮小便止消渴時珍曰營實薔薇根能入陽明經除風熱溼熱生肌殺蟲故**附方**新舊七消

渴尿多薔薇根一把水煎**小便失禁**薔薇根煮汁飲之或為末酒服**少尿尿淋**薔薇根五錢煎酒**小兒疳**

痢頻數用生薔薇根洗切煎濃**口咽痛癢**語聲不出薔薇根皮射干一兩甘草炙**口舌糜爛**薔薇根打去土

煮濃汁溫含冷吐冬用根皮夏用枝葉口瘡日久**小兒月蝕**薔薇根四兩地榆二錢為末先煎腫節毒

延及胸中生瘡三年已上不瘡者皆效千金方**小兒月蝕**薔薇根四兩地榆二錢為末先煎腫節毒

更熨之千金方**筋骨疼痛**因患楊梅瘡輕粉毒藥成者野薔薇根白皮洗三斤水酒十斤煮一

木瓜當歸茯苓各二錢以**金瘡腫痛**薔薇根燒灰每白湯服方**箭刺入肉**膿囊不出以薔薇根末搽之

外臺骨哽不出薔薇根末水服方**葉王治下疳瘡焙研洗傳之黃花者更良**攝生方

月季花綱目**釋名月月紅**下見勝春**瘦客****鬪雪紅****集解**時珍曰處處人家多栽插之亦薔薇類也青莖長

放不結氣味甘溫無毒**王治活血清腫傳毒**時珍**附方**新瘰癧未破三錢碎剉入大鰲魚腹中就以魚腸

封固酒水各一盞煮熟食之即愈魚須安黃水內遊珍

死者方效此是家傳方活人多矣談堃翁試驗方

栝樓中經**校正**併入圖經**釋名果贏**瓜蔓**天瓜**錄別**黃瓜**錄別**地樓**錄別**澤姑**錄別**根名白藥**經圖**天花粉**經圖

雪時珍曰贏與蒺同許慎云木上曰果地下曰蒺此物蔓生附木故得兼名詩云果贏之實亦施于宇

雌雄可也其根作粉潔白如雪故謂之**雪**後人又轉為栝樓愈轉愈失其真矣古果贏之實亦施于宇

川土瓜而葉有叉入土六七尺大二三圓者服食亦用之實入摩膏用茶日成宏景曰出近道藤生狀

所在有之三四月生苗引藤蔓葉如甜瓜正圓者有粉夏月搗者有筋無粉不堪用其葉實圓長青時如瓜

下大如拳生青至九月熟赤黃其根有結實者有粉夏月搗者有筋無粉不堪用其葉實圓長青時如瓜

黃時如熟柿山家小兒亦食之內有扁子大如絲瓜子殼色褐仁色綠多脂作青氣炒乾搗爛水熬取

實脩治 數日凡使皮子莖根其效各別其括圓黃皮厚蒂小樓則形長赤皮蒂粗陰人服樓陽人服枯
世乃分子 氣味苦寒無毒 時珍曰味甘不苦 王治胸痹悅澤人面 別錄潤肺燥降火治嗽滌痰結利咽喉止消

渴利大腸消癰腫瘡毒 珍時 子炒用補虛勞口乾潤心肺治吐血腸風瀉血赤白痢手面皴明 發明 震亨

樓實治胸痹者以其性味甘潤甘能補肺潤能降氣胸中有痰者乃肺受火逼失其降下之令今得甘
緩潤下之助則痰自降宜其為治嗽之要藥也且又能洗滌胸膈中垢膩鬱熱為治消渴之神藥時珍

焦之火使痰氣下降也成無已不知此意乃云苦寒以瀉熱蓋不嘗其味其甘寒不犯胃氣能降上
舊十二 痰效不止 瓜蒌仁一兩文蛤七分為末以薑汁乾欬無痰 熱瓜蒌搗爛絞汁入蜜等分加白礬

新八 痰效不止 登濃脚丸彈子大噉之○摘玄方 乾欬無痰 熱瓜蒌搗爛絞汁入蜜等分加白礬
欬嗽有痰 熟瓜蒌十個明礬二兩搗和餅陰乾研末糊要 痰喘氣急 蘇軾二個明礬一棗大同燒存性研

方 熱欬不止 子用濃茶湯以盥盛于飯上鍾大熟瓜蒌一個去皮將熟入茶蜜湯洗去 肺熱痰欬 胸膈塞滿用
湯泡七次焙研各一兩薑汁打麪糊丸梧子大 肺痿欬血 個焙杏仁去皮尖炒二十一為末每用一

拾以豬肺一片切薄摻下入內炙 酒痰欬嗽 用此救肺瓜蒌仁青黛等分研心法 飲酒發熱 研膏日
熱冷嚼嚥之日二服 聖濟錄 酒痰欬嗽 蜜丸茨子大每嚥一丸 丹溪心法 飲酒發熱 研膏日

食數匙一男子年二十病 飲酒痰癖 兩脇脹滿時復嘔吐腹中如木聲枯樓實去殼焙一 小兒痰喘 欬
此服之而愈 摘玄方 飲酒痰癖 兩脇脹滿時復嘔吐腹中如木聲枯樓實去殼焙一 小兒痰喘 欬

再煎熟不瘥瓜蒌實一枚去子為末以寒食麪劉和作餅子炙黃 婦人夜熱 痰嗽月經不調形瘦者尿尿
隔熟久不瘥瓜蒌實一枚去子為末以寒食麪劉和作餅子炙黃 婦人夜熱 痰嗽月經不調形瘦者尿尿

嚥化之兩五錢為末蜜調 胸痹痰嗽 和殼研末麪糊丸梧子大每米飲下二三十九丸日二服 杜王方 胸
中痹痛 身背喘息欬唾短氣寸脈沈遲關上緊數用大栝樓實一枚切薄白 清痰利膈 治欬嗽用肥大

焙半夏四十九個湯洗十次搥焙三分為末用洗栝樓實并麪 中風喝斜 用瓜蒌絞汁和棗麥麪作餅
同熬成膏和丸梧子大每薑湯下三五十丸良 楊文蔚方 中風喝斜 用瓜蒌絞汁和棗麥麪作餅

聖 聖熱病頭痛 發熱進退用大栝樓一枚取瓢細割置薤盃中 時疾發黃 狂悶煩熱不識人者大瓜蒌
惠 惠熱病頭痛 發熱進退用大栝樓一枚取瓢細割置薤盃中 時疾發黃 狂悶煩熱不識人者大瓜蒌

浸洵取汁入蜜半合朴消八分盡 小兒黃疸 眼黃脾熱用青瓜蒌焙研每服一錢水半盞煎七分 酒黃
分再服便瘥 蘇頌圖經本草 小兒黃疸 眼黃脾熱用青瓜蒌焙研每服一錢水半盞煎七分 酒黃

疳疾 方同 小便不通 腹脹用瓜蒌焙研每服二錢熱酒下頻服以通為度紹興 消渴煩亂 酒黃 洗去
皮子取瓢煎成膏入白礬末一兩為 燥渴腸秘 熟九月十月熱誠蘇實取瓢拌乾葛粉銀石器中慢火炒

丸梧子大每米飲下十九丸 聖惠方 燥渴腸秘 熟九月十月熱誠蘇實取瓢拌乾葛粉銀石器中慢火炒

丸梧子大每米飲下十九丸 聖惠方 燥渴腸秘 熟九月十月熱誠蘇實取瓢拌乾葛粉銀石器中慢火炒

丸梧子大每米飲下十九丸 聖惠方 燥渴腸秘 熟九月十月熱誠蘇實取瓢拌乾葛粉銀石器中慢火炒

丸梧子大每米飲下十九丸 聖惠方 燥渴腸秘 熟九月十月熱誠蘇實取瓢拌乾葛粉銀石器中慢火炒

丸梧子大每米飲下十九丸 聖惠方 燥渴腸秘 熟九月十月熱誠蘇實取瓢拌乾葛粉銀石器中慢火炒

丸梧子大每米飲下十九丸 聖惠方 燥渴腸秘 熟九月十月熱誠蘇實取瓢拌乾葛粉銀石器中慢火炒