

聖宗說約卷之二

古吳自丁漢蔣示吉仲芳民纂述

錫山禪
醉道人計廉能元讓甫孫

弟時行季芳氏

訂

堦葉舒嵩明韓氏

中風

人覺大指次指麻木
肌肉微掣卽爲中風

不仁或

肌肉微掣卽爲中風先兆

西北地寒風浩蕩或中膈兮或中臟或中脘

變難名狀卒倒入地不知人痰塞喉間命欲喪東南地濕類中

外症

風症候相同治須當辨中風邪着四肢惡寒拘急脉浮遲中臟

唇緩帶九竅鼻塞便閉不語時若中血脈口眼歪又有中經亦

要知六經無症溺調和口不能言肢不持古人曾作真風治三

家妙論亦須思東垣大率主氣虛河間腎虛兼火治丹溪主濕

內生痰總是類中分明註治之先用開關法皂牙皂去皮細切辛半

藜各二俱為末再加麝香吹鼻中有嚏則生無難活醒後投之

三合湯茯苓皮草夏甘半應相當星南瓜當梗黃白歸枯白芩連木竹瀝薑汁共一

湯左癱屬血右屬氣血虛加芍白芎川生地四物恐泥痰瘀血桃仁

紅花瘀血症小便利大氣虛人前參芪也同劑盜汗遺尿亦如之

小便不利不可利姜蚕全蝎閉塞加鈎藤善治牙關閉肥人烏

小以引經烏頭附子氣實入參亦要忌右寸有力去參忌用

盛自汗身體痛防風羌活并薄桂頭目不利或頭疼背正蔓荆

辛芥穗無汗身疼加芷羌芎防自活川芎倉米秦芎配心血虧欠神恍惚

疾神遠志菖蒲入或心動搖驚悸者酸棗竹茹辰砂益風痰熾

盛須膽星防枳牙皇瓜蔓仁食傷麴芽山查寔便秘還須三化

行大便結用三化湯厚朴大黃枳
槿羌活等分每服一兩微利之

示吉日東南類中風者多故從火痰氣而治實有神驗若果

係風邪外中六經形症具者原宜先服小續命湯解表便秘

者三化湯通滯之後方用本湯調理更為切當至于治口眼

歪斜方法固多不如瀉夾車地倉二穴歪左針右歪右針左
病可立愈

傷風

頭痛發熱鼻不通惡風自汗號傷風脉來浮緩兼無力參蘇飲

服自然鬆人參紫蘇及枳椇桔梗乾葛前胡同陳皮茯苓甘草半

夏木香少許木姜攻

已下加減

咳嗽

去參

瓜母加桑杏

去皮炙打碎

內有痰熱

黃芩進痰唾如膠金沸草胸滿

痰多薑貝順冬月自汗桂枝添

若還無汗麻黃令傷食厚朴麴

麥芽中酒白蔻烏梅倍頭疼羌

葶不可無氣喘杏蘇亦莫剩

示言曰人之易于傷風者其故有二一因元氣虛之氣不衛
外風乘虛入治宜參芪益氣而佐以散邪一因素有鬱熱在
內毛竅常開邪風易入治宜芩連清火而佐以疎風此皆氣
虛鬱熱為本風為標也治本則標自愈

中寒

中寒傷寒殊非一

傷寒在後

傷則漸深中直入初起怖冷四肢寒

無熱不渴身戰慄脉來無力又沉遲加味理中湯有益參朮甘

草并乾薑加桂陳皮功妙極寒甚附子及吳萸

鹽炒附子便煮

茯苓半

夏吐有力生薑煎就須冷服

伏其所主先其所因也

無脉者

此一麝香

吃泄瀉不止加黃麻升姜汁三匙嘔吐入舌捲囊縮指申青脉絕

蒸臍不可忽

蒸臍法○用麝香半夏炙末一匙填臍中後用生薑片貼于臍上放大艾火于姜片灸二七壯灸關元氣海各二七壯熱通于中逼寒出外手足溫煖則生 一用硫黃麝香末填臍中放葱餅于臍上以熨斗盛火于葱餅上熨之如餅爛再換一枚葱餅用葱頭一握切去葉留白根約寸許連縛四五餅應用

暑病

暑天病熱各暑症腹痛吐瀉冒暑病頭痛身熱燥不寧

刺傷暑惡寒熱自汗出不止咳嗽倦怠為中暑脉虛身熱動而

得之病尿陽加味香薷湯可止香薷麥味茯苓陳朴豆米次

第尊黃連燈心姜棗服氣虛參朮其芪靈寒熱柴芩為要藥嘔

加藿半法為精瀉合澤猪真妙訓去麥渴用知粉藥如神綿綿

腹痛傷冰冷乾姜滑石法從心去連小水不利或短赤澤瀉山

枝并滑石檳榔加羌號暑風胸滿塞兵消食積自汗不止用參

芪水瀉木通澤有益頭痛川芎并石羔痰悶瓜萸及枳寔已上

治若居涼館喜風涼頭疼惡寒頭項強身形拘急熱無汗靜而

得之陰寒傷

此固暑
衄病

宜服羌活并蒼朮厚朴乾薑

及藿香紫蘇

等分薑三片水煎熱服號升陽

湯

兼食神麴滑石

妙內傷冰

用炮姜

示吉日夏至一陰生人內寒而外熱若過食冰冷及連薑益
元寒涼之劑遂至寒積于中而成內傷寒症凡吐瀉而腹痛
無休歇脉來遲緩者是也治宜理中湯合平胃散溫之寒甚
加附子如悞投香薷飲則允矣

注夏

溫熱蒸人夏曰長氣虛體弱熱因傷胸中氣促四

肢倦心煩食

少不如常好卧口乾或泄瀉治用注者益氣湯黃芪升麻與蒼

木各一

人白皮神

參木陳

曲澤瀉

黃柏酒

麥冬青皮及當歸乾葛三分

各三

分

味九粒

甘草水煎引姜棗盜汗還加浮小麥便赤滑石并山枝

渴甚天花烏梅食

粉

仁

頭痛川芎石羔好嗽加羔杏升蒼出木

香砂仁胸不寬瀉加肉寇茯苓的

歸

去麥

石

仁

去

濕

東南之地恒多濕居民感受病非一或行涉水雨露蒸或過飲

令因而得小便短赤身體重骨肉酸麻行不疾漸加浮腫及身

黃燥土參濕湯可識茯苓香附半陳皮厚朴澤猪蒼白本引用

夏

湯

苓

香

附

半

陳

砂仁并姜棗臨服半匙鹽可八外濕寒熱身腫痛羌防朮通加
有益內濕胸滿兼嘔吐喘脹腹膨用枳實黃連山查炒卜子溺
閉太通車前力濕熱發黃仗茵陳山枝車前兼滑石

示吉曰治濕大法在表在上者開鬼門用麻黃防風輩微汗
是也在裏在下者潔淨府用五苓輩利小便是也丹溪云濕
得燥則豁然而服用蒼米是也濕從風散用羌獨沽類是也
濕久則生熱用黃連山枝是也從此而變通之亮能活人但
麻黃止可用二三分蓋汗多恐生變症耳

火

相火命門君火心二火一水不相均推腎屬水經所謂五臟氣水不勝二火

升皆是火氣有餘便是人妄動須知藥至陰經所謂一水不勝五火也古人調治非

一法一一從頭說與君心穴亢極陽強病人壯氣寔鹹令進癩

狂便閉用硝黃木火大承氣湯朴硝大黃大便如常芩連應黃連解毒湯黃

芩黃連黃栢山枝鳥梅水煎服治大實火可瀉從上方隨經調

治須臾定飲食勞倦身發熱元氣不足內傷症補中益氣味甘

溫陽虛之火功偏勝補中益氣湯人參黃芪當歸白朮陳皮甘草升麻柴胡生薑大棗水煎服相火

熾盛以乘陰朝京慕熱血虛成陰中之火甘寒降知柏四物法

通靈四物湯當歸生地芍藥川芎腎水受傷陰虛病面紅耳熱

加黃栢知母二味監酒炒

浮火盛左尺洪數無根火相竈六味治如神

六味地黃丸地黃山藥茯苓肉桂等

丹皮澤瀉蜜丸淡鹽湯送下加黃胃虛過食生冷傷抑道陽氣

脾中央火鬱之症升散之升陽散火最爲良

升陽散火湯治五心煩熱胃脘時疼

四肢乏以肌熱筋痠或骨髓中熱用升麻葛根羌獨活白芍人

參各五分炙甘草生甘草柴胡各三分黃風二分半水煎服忌

寒涼物去獨活及生命門火衰陽脫病面赤煩燥虛火盛足冷

甘草加葱即火鬱湯

脉沉陰極燥回陽救急醫中聖

回陽救急湯見傷寒科

脉數無力屬心腎內傷發熱乃陽虛脉大無力脾肺分氣從左

起肝之火陰火還從臍下生腳下熱來侵腹者斯人虛極藥難

下熱從腳起先用附子未津調貼腳心中

二湯泉穴引火不行後服四物降火之劑

示吉按積熱論曰治火之法始而涼和次而寒取寒取不愈則因熱而從之從之不愈則技窮矣是徒知治熱以寒而不知熱之不衰由乎真水之不足也當壯水之主以制陽光經曰寒之而熱者取之陰陰腎水也求其屬也此獨爲積熱者說愚意治火除火壯氣寔者便秘者火微者從正治外俱當遵此爲則蓋火非水不降未有腎水足而心火熾者也益坎勝離湯是爲火症之總司湯見勞瘵

內傷

飲食勞倦是內傷或因飢飽過行房風寒傷人名外感辨明調

治病無妨人迎緊盛手背熱寒熱邪作無間歇惡寒無汗鼻不

通此是外感君須別內傷之症氣口其手心有熱微惡風寒熱

問作不知味更兼氣弱語言慵內傷惡寒得煖解外感近火寒

仍攻外感內傷相挾者脉症並見須辨通內傷不足急補之外

感有餘瀉不同或先補養或先散先後之間無苟從治內傷注補中

益氣用黃久當白麻胡草皮芪參歸朮升柴甘與陳引加姜棗水煎服氣和微汗量

為精救腎水虧酒炒栢入心養血紅升三分升麻柴胡白汗去夜

間不睡加棗仁炒為未亦川芎蔓荊頭疼用口乾乾葛藥為靈

顛頂痛時辛藁本升柴胡怔仲驚悸甚者再加遠志茯神神食加麴芽

香根槿瀉添澤瀉芍藥苓黃連枳實除胸悶有痰前半伏為君

防已木瓜除脚弱龍骨牡蠣煅房水治遺精防羌芷芎身熱用兼風

寒頭疼者加虛火知母栢黃玄參大炎上者用黃芩黃連清內熱菊花熟地

醫眼疼

傷食

後天之本屬脾胃納化飲食滋榮衛脾胃主納飲食不下為胃病脾主化飲食不消為脾病

養生妙法節飲食脾胃受傷飲食倍症胸腹飽悶并作酸噯氣惡

食腹痛累或吐瀉時下洩屁種種皆因傷食例甚則發熱與頭

疼惟身不痛傷寒異有傷食類傷寒條在傷寒利左關脈平和右關紫香砂平

胃功有濟蒼朮陳皮厚樸甘草平胃散只香附砂仁香理氣川芎

枳櫟并藿香水姜前服食須忌消肉查菓消麵卜消糯米食酒

藥麴飯食神麴反麥芽生冷瓜菓姜青逐鬼皮索粉傷時加杏

仁西瓜多吃食鹽促魚傷橄欖椒紫蘇稱草將來消牛肉麝香

能消蔬菓積葛梅白蔻酒傷入枳壳桔梗除胸滿挾氣烏兵寒

姜益傷飲須合四苓湯飲茶湯凉水之類四苓嘔吐臨服加姜

汁白木茯苓治脾虛泄瀉車前蔻白木已上消上部有脉下無

脉其人當吐不吐卒指物探吐是良方否則瓜蒂散有力瓜蒂

豆為未温水調食積鬱火成濕熱苦連天黃不可缺再入白米

下錢吐之