

衛生鴻寶 卷五

女科口訣

經孕 宜坤至寶丹

治經帶崩淋 胎產百病

秘旨烏骨雞丸

治月事不調 勞崩帶諸症

八珍養血丸

治經帶崩淋 乾血等症

益

母膏

治經帶胎產諸病

蕎脂丸

調經止痛

丹參散

治經脉不調崩

帶

桃耳煎

治乾血勞

膠紅飲

治倒經

血山崩方

止逆飲

治逆經

柏綿飲

治赤白帶

血餘散

治血淋

通

經丸

治經斷發腫 血分水

加味白薇丸

治血厥

濟仁固

精丸

男服 有子

濟仁調經丸

女服 有子

胎前 千金保孕九

治胎動小產

苦柚飲

治惡阻

止漏

絕神丹

治胎漏

紫蘇飲

治子懸子癰子胎上

全生白朮

散

治子腫

桂姜飲

治胎上逼心

苓麻飲

治妊娠轉胞

梔

子葱豉湯

治妊娠熱病附傷寒

護胎法

治妊娠時氣

祛邪

化滯煎

治痢

雞蛋粥

治妊娠中惡

仙傳保產無憂

散

安胎催生

達生散

瘦胎易產

臨產

佛手散

催生主方

開骨散

治交骨不開下死胎

仙傳四

急保生

治難產

加味八珍湯

治難產

通津救

命至靈丹

治乾漿

仙傳保產回生丹

治難產及產後諸症

觀音普濟丹

治難產及產後諸症

神應丹

治盤腸產

琥珀黑

龍丹

治死胎已衣不下及產後諸症

消衣神應方

治胞衣不下

塗

臍法

治子死腹中

產後

生化湯

治產後諸疾

虛暈急救法

血暈急救

法

失笑散

治瘀血脹胞

烏金散

治產後敗血

二味參

蘇飲

治瘀血入肺
附三冲

養陰惜紅煎

治鼻衄

猪腰粥

勞治尊

乳疾

通脉湯

治乳少

神效瓜蒌散

治乳癰乳岩

香附

餅

治乳癰

塞鼻法

治乳閉乳岩

土不留行煎

治乳脹

紫草膏

治如乳

定岩散

治乳

鹿角散

治乳

蚌殼散

治乳

雜症

石菖蒲湯

治花

雄黃丸

治鬼

石瘕方

陳皮葵根湯

治腸

海浮湯

治腸

收腸法

治子

收

硫黃湯

治玉門

參朮膏

治胞

除蝕法

治

門生蟲。附

隱疾方

治翻

腸交方

附遺尿

陰毛生風

卷五

二利

卷五

衛生鴻寶

卷五

女科

經孕

經不調
血勞

痛經
赤白帶下

崩漏
血淋

倒經
經斷

逆經
發腫

乾血

嗣育

宜坤至寶丹

治婦人經脈不調帶下崩
淋虛勞胎前產後百病

嫩黃芪

蜜炙
三兩

白朮

陳壁
土炒

棗仁

炒香

歸身

酒炒

香附

杵米
酒製

川

斷

酒炒

條芩

酒炒

甘栢

杞

血餘

煉不
見火

阿膠

蛤粉
炒

杜仲

鹽水炒
各二兩

茯苓

乳製

白芍

酒炒

丹參

酒炒
各兩半

北五味

焙六錢

甘草

蜜炙

朱砂

飛為衣
各一兩

大生地

酒煨
四兩

各為細末。秤准分兩。和勻。煉蜜丸。每重三錢。

按症照引調服。

一凡久不坐孕。經脉不調。腹疼痠脹。或赤淋白帶。腰痛胃疼。夜熱。心煩。食

少。蓮子湯。日服一丸。諸病皆愈。即能受孕。一孕婦

每月服十餘丸。胎安身健。若胎氣失調。惡心嘔吐。虛

煩阻食。浮腫氣急。腰腹痠痛。胎漏下血。或傷胎見紅。

蓮子湯服一丸。甚者人參湯服數丸。一臨產疼陣

作時。白湯服一丸。胎自順下。如有橫逆異產。湯和童

便服數丸。母子保全。或難產者。冬葵子三錢。煎湯調

服。立產。一產後下血過多。湯和童便服。惡露不行。

腹痛塊瘀。山查三錢。紅花一錢。煎湯調服。或寒熱往

來。有外感者。荆芥穗一錢。煎湯服。兼虛汗者。人參湯

服。虛煩狂躁。腹滿氣急。俱白湯服。一無論老少婦

女。血崩尿血。或因血虛。周身筋骨疼痛者。

白湯服。鮑問梅手抄。廣東蠟丸方刊本。

秘旨烏骨雞丸

治婦人鬱結不舒。蒸熱咳嗽。月事不調。或久閉。或倒經。產後羸勞。及崩淋不止。

赤白帶下、白淫、諸症、兼療男子
斷喪太早、勞嗽吐血、成虛損者。

絲毛烏骨雞

男用一隻

雌女用雄、溺倒、泡去毛、竹刀剖腸
出、肝內金、去腸穢、仍入腹內。

熟地

四兩、如血

二、北五味、碎一兩、二味入雞腹內、陳酒童便、各
兩、北五味、二碗、砂鍋內水、煮旋添、至糜爛汁盡。

綿芪

去皮、蜜水拌炙。

於朮

飯上蒸九

白茯苓

去皮

歸身

酒洗

白芍

酒炒、各二兩、五味為粗末、同雞肉搗

爛、焙乾、骨用酥炙、共為粗末、入下項藥。

人參

三兩、虛甚倍加、無力者黨參代。

川芎

一兩、童便浸晒。

丹參

二兩、酒浸晒。

三味研末、入前藥中。

用乾山藥

末六兩、

打糊丸。

晒乾瓶貯、清晨

沸湯下三錢、臥時醇酒下二錢。

大便實者、蜜丸亦可。

助、鼈甲三兩、銀柴胡、地骨皮各兩半、骨蒸寒熱、加炙七

一兩、崩漏下血、倍熟地、加阿膠二兩、倒經血溢、

加麥冬二兩。○鬱結痞悶。加童便製香附米一兩。沉香五錢。○赤白帶下。加草薢四兩。製香附各二兩。蘄艾一兩。○白淫。倍參芪苓朮。○張路玉曰。此方藥味平。常而調經最驗。蓋難屬巽。補肝尤妙。在烏骨。益腎變巽。歸坎。甲癸同。源。兼滋衝任也。

八珍養血丸

治月候不調。赤白帶下。皮寒骨熱。肢體倦怠。並一切崩淋乾血等症。

炙芪

生地

白朮

丹參

當歸

阿膠

茯神

茯苓

白芍

遠志

川芎

炙草

為末。杜仲。

十兩

熬膏。和煉蜜丸。每服四錢。淡酒下。

重症

有早三錢。姜湯下。晚二錢。淡酒下。○乾血癆由先天不足。七情所傷者。用全當歸五錢。水酒各半煎。分早晚服。兼進養血丸。可漸愈。慎勿輕用。通經逐瘀。如桃仁代類之類。恐致崩下。暈脫也。○彙精

益母膏

一名返魂丹。治胎前產後諸病。及月經不調。赤白帶下。

益母草

一名茺蔚。方便

對節生葉。四五月開。紫花者是。白花者非。

連根葉子

五六月采。洗淨。陰乾。忌鉄器。石臼內

搗砂鍋內煮濃汁。漉去渣。

文武火熬成膏。

如黑磁瓶貯。糖色。

每服二三匙。

胎動腹痛。下血。當歸湯下。橫生逆產。胎衣不下。炒薑湯下。產後血暈中風。

血積脹痛。鼻衄舌黑。童便和酒服。產後瀉血。棗湯下。痢疾。米湯下。崩漏。糯米湯下。赤白帶。阿膠陳艾

湯下。凡產後童便調服一二匙。能調經。絡破。血痛。或治血湯藥中加一匙。尤妙。或碾細末。煉蜜丸。彈

子大。每用一九。俛純字曰。益母草。通經逐滯。消汗。腫乳癰。產後諸疾。因血熱血滯。氣脉不和者。用之。相

宜。若胎前血虛。形怯。血脫崩漏者。未可概與也。

蕎脂丸

調經止痛

蕎麥

五升。去粗皮。取淨。能逐瘀滯。補血任脉。

畫邊臘脂

二兩。係蘇木、茜草、紅花、佐烏梅煎染而成。取其
溫潤之氣。威而不猛。恐行血過峻。加酸味制之。將

臘脂煎濃汁。搗麥麵為丸。梧子大。每服三錢。空心開

水下。忌猪肝、羊血、糟醋。○毛達可曰：婦人行經作痛。
難。以受孕。子投以培、養、衝、任、通、絡、逐、瘀、之品。痛

止。經調。俱得。生。育。○林章甫
曰：消。息。血。中。之。氣。此。方。甚。精。

丹參散

治經脉不調。或
紫。腹。痛。崩。帶。

丹參

十斤。酒洗。醋
浸一宿。晒乾。

為末。每

服二錢。早滾湯下。晚好酒下。

久服。調經養血。子。宮。溫
暖。多。生。男。子。○薛立齋

曰：丹參一味。功。同。四。物。能。破。宿。血。補。新。血。安。生
胎。下。死。胎。止。崩。帶。產。後。惡。露。不。下。經。脉。不。調。

桃耳煎

治婦女
乾。血。勞。

大木耳

水泡。脹。去。蒂。
晒乾。為末。

胡桃肉

去皮
搗各

二錢

黃酒煮服

過半炷香時。渾身汗出。
是其驗也。○奇方類編

膠紅飲

治婦人晚年驟然血海大崩不止。名倒經。

阿膠

米粉炒成珠

當歸

各一

兩

茜紅花

錢四

冬葵子

錢五

天泉水煎服

崩止。用六君子

加歸為調理。毛達可曰。葉天士云。初崩宜塞。久崩宜通。子每治老婦倒經。多種應。後見少婦大崩。屢服補劑不止。取此方投之。立效。

血山崩方

鹿角膠

錢三

晚間用酒浸。次早重湯烱化。

服下。或下午再加一服。更妙。屢驗。

久服。不特斷根。血氣更旺。於昔。墨

寶齋集

驗方

止逆飲

治逆經。久閉。血從口鼻出。

陳墨

水磨一杯服。即止。

次用當歸

紅花。各二錢。水煎服。或服韭菜汁。甚效。○文堂集驗方

柏棉飲 治赤白帶

棉花子 半斤燒存性淨一兩

柏子仁 一兩燒存性淨三錢

為末。空心淡酒調服三錢。

醫林繩墨此畢尚書玄和鍾齡曰帶下有五色之分不必分屬五臟總不外脾虛有濕而已用五味異攻散加扁豆苡仁山藥澤瀉等無不愈有熱加黃柏蓮心青加柴胡山梔黃加石斛荷葉陳米赤加丹參當歸白倍加苡仁黑加杜仲川斷

血餘散

治血淋

髮灰 二兩

藕汁調服。痛脹甚者。三日即愈。

愈。

種福堂精選方。集驗方。金針菜。每日淡煮數兩食之。濟世養生集。浮小麥。童便炒研。砂糖調服。

通經丸

治婦人經斷發腫

歸尾

赤芍

生地

川芎

牛

膝

五靈脂

各一兩

紅花

桃仁

各五錢

香附

製

蘇木

各二錢

琥珀

七錢半

煎酒和

砂糖

熬化為丸

梧

子大每服三錢酒下

體虛者理中湯下。血寒加肉桂五錢。心悟經水先斷後發腫

者名曰血分。此九主之。若先發水腫後經斷者名曰

求分。用五皮飲送下此九更有受孕後胎永腫滿者

亦用五皮飲加苓朮脾虛不能制

水六君子湯主之忌服安胎補劑

加

味白薇丸

治婦人多崩漏之疾忽爾厥逆移時方醒名曰血厥

白薇

赤芍

沙參

各三兩

歸身

四兩

川芎

甘草

炙各一兩

黃芪

蜜

丹皮

各二兩

為末

水法丸

菜豆大

每服二三錢

早晚沸湯下

忌菜菔蒜猪羊糟酒。湛清堂集血

癩。但目閉身僵口不能言外無形症身不冷無痰沫

此方多服養血可不復發如煎服六錢為一劑。同

壽錄婦人血風攻腦倒地不省人事

蒼耳草取心陰乾為末每服一錢

衛生鳴寶

女科經孕

五

五

濟仁固精丸

男服。此合六味地黄丸。五子衍宗丸。二方增減。

大熟地

砂仁炒

九晒八兩砂

枸杞子

去梗蒂

黃肉

去核酒蒸肝

仁需用二兩

用。菟絲子

揀淨杵爛酒蒸

懷山藥

乳蒸各四兩

茯苓

乳蒸清水

飛去浮在上西筋膜澄粉

粉丹皮

酒蒸各二兩

北五味

酒蒸肺有熱者少用

覆盆子

用草本酒蒸

車前子

各一兩

取淨末

煉蜜丸

梧子大。每早開水下四錢。

凡男孺左尺無力或脉數有熱此水虛也。加鮮釵斛

六兩熬膏。

右尺無力或脉遲厥冷。此火虛也。加肉桂附子各一兩。二尺無力精薄不能射遠。此水大

俱虛也。加魚鱉鹿角膠各二兩。鹿茸更妙。綿芪一斤。熬膏為丸。若其人相火熾盛。內熱遺精。尿血者。須

服。知柏補陰之品。火靜熱清。亦可有子。一切。斂精。壯陽之藥。均非所宜。

子。一切。斂精。壯陽之藥。均非所宜。

濟仁調經丸

女服亦名坤厚資生丸。此本益母勝金丹。稍加減之。

大熟地

酒砂仁

九蒸九晒

當歸

酒蒸

芫蔚子

酒蒸

於木

陳土炒各四兩

香附

枳米姜汁鹽水各炒一半

白芍

酒蒸丹參

酒蒸各三兩

川芎

酒蒸二兩

阿膠

黃一兩蒲炒珠

益母草

鮮者數斤熬膏

煉蜜丸。每早開水

下三四錢

經水先期色紫脉數血熱也。加生地條芩丹皮。經來過期色淡脉遲血寒也。加桂

心炮姜紫石英。行經腹痛拒按者。加陳皮延胡。腹有痞塊。飲食滿悶者。加莪朮。食少氣虛面少血

色。四肢無力。減香附。加參芪。遠志。茯神。更有肝氣鬱結。脇脹。胃脘痛。癥瘕。腹疼。經阻。頭暈。失服。和脾。養胃

之品。他症一去再服此丸。益母勝金丹。有牛膝酒炒。杜仲鹽水炒。無阿膠。血熱。加丹皮。生地各二兩。血

寒。加肉桂一兩。

周呂荃廣達生編嗣息之艱命也。而積德可。以回天。然亦有男女不善調攝者。男子之要在固精。女子之要在調經。固精宜寡慾。調經先養性。今錄齊仁二方於右。張景岳曰。種子之方。本無定軌。因人而藥。各有所宜。故凡寒者宜溫。熱者宜涼。滑者宜澀。虛者宜補。去其所偏。則陰陽和而生化著矣。