

00027

齊陽綱目



濟陽綱目目錄

卷十三

呃逆

辨呃逆即噦病一

論呃逆皆由病後胃虛所生二

論呃逆本於胃虛氣逆及陰虛火上三

論呃逆有虛有實四

論呃逆雜治法五

診法六

濟陽綱目 卷十三 目錄

脉法七

治胃虛呃逆方一

橘皮竹茹湯一

橘皮半夏生姜湯三

十味小柴胡湯一名人參白朮湯五 寶鑑炙甘草湯六

治胃寒呃逆方二

加味理中湯七

參附湯九

嚴氏柿蒂湯十一

倍陳湯二

六君子湯四

溫中散一名丁香柿蒂散八

丁香柿蒂散十

柿錢散十二

丁香散十三

丁香散十三

增半湯十五

橘皮乾姜湯十七

羌活附子散十九

草豆蔻散二十一

小青龍湯二十三

丁香散二十五

桂苓白朮散二十七

雄黃酒二十九

濟陽綱目 卷十三 目錄

治氣滯呃逆方三

小半夏茯苓湯三十一

香薷散三十三

一方三十五

治痰火呃逆方四

蒼連二陳湯三十六

加味小柴胡湯三十八

一方四十

治陰火呃逆方五

丁香柿蒂竹茹湯十四

半夏生姜湯十六

茯苓半夏湯十八

葶藶散二十

陳皮湯二十二

本事方二十四

三香散二十六

呃逆丸二十八

硫黃煎法三十

二

木香調氣散三十二

陳皮湯三十四

黃柏竹茹湯三十七

一方三十九

一方

一方


大補陰丸 四十一

大補丸 四十二

附灸法 六

灸呃逆法 四十三

又法 四十四



濟陽綱目

卷十三 目錄

主

濟陽綱目卷十三

涇陽張楠蔭齋註梓

臨潼武叔卿先生編輯

涇陽姚恩錫三續梓

呃逆

○辨呃逆卽噦病

呃於革切氣逆上衝作聲也

準繩曰呃逆卽內經所謂噦也或曰成無已許學士

固以噦爲呃逆然東垣海藏又以噦爲乾嘔陳無擇

又以噦名欬逆諸論不同今予獨取成許二家之說

濟陽綱目

卷十三

呃逆

一

何也曰噦義具在內經顧諸家不察耳按靈樞雜病

篇末云噦以草刺鼻嚏嚏而已無息而疾迎引之立

已閉口鼻之氣使之無息乃逆大驚之亦可已詳此

經文三注正乃治呃逆之法按呃逆用紙撚刺鼻便

嚏嚏則呃逆立止或閉口鼻氣使之無息亦立已或

作冤盜賊大驚駭之亦已此予所以取成許二家之

論噦爲呃逆爲得經旨也若以噦爲乾嘔設使乾嘔

之人或使之嚏或使之無息或使之大驚其乾嘔能

立已乎噦非乾嘔也明矣若以噦名欬逆按內經生

氣通天論曰秋傷於濕上逆而欬陰陽應象論曰秋傷於濕冬生欬嗽則欬逆爲欬嗽無疑以春夏冬三時比例自見孫真人千金曰欬逆者嗽也本自明白後人不知何以將欬逆誤作呃逆失之違矣

○論呃逆皆由病後胃虛所生二

三因云呃逆之病古人以爲噦耳多因吐利之後胃中虛寒遂成此疾亦有胃中虛膈上熱噦至八九聲相連收氣不回者大抵傷寒以病後老人虛人及婦人產後多有此證者皆病深之候也亦有噦而心下

濟陽綱目

卷三

呃逆

二

痞悸者有痰水所爲別無惡候者是

○論呃逆本於胃虛氣逆及陰虛火上三

趙以德曰成無已云噦者俗謂之欬逆呃呃然有聲然引欬逆是噦非也內經以噦與欬逆爲兩證噦是胃病欬逆是肺病謂胃氣逆爲噦註云胃爲水穀之海腎與爲關關閉不利則氣逆而上胃以包容水穀性喜受寒寒穀相搏故爲噦也又謂陽明之復欬噦太陽之復嘔出清水及爲噦噦少陰之復噦噦靈樞亦謂穀入於胃胃氣上注於肺今有故寒氣與新穀

氣俱還入於胃新故相亂真邪相攻氣逆相逆復出於胃故爲噦補手太陰瀉足少陰張仲景言噦者皆在陽明證中謂治家下之太早則噦而陽明病不能食攻其熱必噦皆因下後胃氣虛而噦者也至有風熱內壅氣不能通有潮熱時時噦者與小柴胡湯和解之噦而腹滿視前後知何部不利利之者此皆可治之證至若病極譫語甚者至噦又不尿腹滿如噦者皆不治丹溪先生亦謂呃逆氣逆也氣自臍下直衝上出於口而作聲之名也內經謂諸逆衝上皆屬

濟陽綱目

卷三

呃逆

三

於火東垣謂是陰火上衝而吸之氣不得入胃脉反逆由陰中伏陽而作也從四時用藥法治古方悉以胃弱言之而不及火且以丁香柿蒂竹茹陳皮等劑治之未審孰爲降火孰爲補虛人之陰氣依胃爲養胃土傷損則木氣侮之此土敗木賊也陰爲火所乘不得內守木挾相火乘之故直衝清道而上言胃弱者陰弱也虛之甚也病人見此似爲危證然亦有實者不可不知嗟乎聖人之言胃氣逆爲噦者非由一因而逆緣王太僕用靈樞之意竟作腎寒逆上之病

註之。由是後代方論。或用熱劑治寒。或用辛溫散氣。安知脾與胃一陰一陽也。二者不和。亦逆腎肝在下相凌。亦逆。且腎之逆。未可便謂之寒也。左腎主水性本潤下。烏能自逆。必右腎相火炎上。挾其衝逆。須觀所挾多寡。分正治反治以療之。肝木之風。從少陽相火衝克者。亦必治火。皆當如先生所言者。以治若別有其故而噉者。又必如仲景法。隨其攸利而治之。

○論呃逆有虛有實 四

劉宗厚曰。呃逆一證。古方悉作胃寒所致。俱用丁香

濟陽綱目

卷十三 呃逆

四

柿蒂姜附等藥。然此證有虛有實。有火有痰。有水氣。不可專作寒論。蓋傷寒發汗。吐下之後。與渴利日久。及大病後。婦人產後。有此者。皆脾胃氣血大虛之故也。若平人。食入太速。而氣噎。或飲水喜笑錯喉。而氣搶。或因痰水停膈。心下。或因暴怒。氣逆痰厥。或傷寒熱病失下。而有此者。則皆屬實也。夫水性潤下。火性炎上。今其氣自下衝上。非火而何。大抵治法。虛則補之。虛中須分寒熱。如因汗吐下後。誤服寒涼過多。當以溫補之。如脾胃陰虛。火逆上衝。當以平補之。挾熱

者涼而補之。若夫實者。如傷寒失下。地道不通。因而呃逆。當以寒下之。如痰飲停蓄。或暴怒氣逆痰厥。此等必形氣俱實。別無惡候。皆隨其邪之所在。而瀉之。洩之。清之。利之也。世醫凡遇此疾。首以丁香柿蒂為言。殊不知此藥。不能補虛。不能降火。不能清氣。利痰。惟有溫煖助火而已。豈宜總治此疾乎。

○論呃逆雜治法 五

準繩云。胃傷陰虛。木挾相火。直衝清道而上者。宜參

朮湯下。大補陰丸。吐利後。胃虛寒者。理中湯加附

濟陽綱目

卷十三 呃逆

五

子丁香柿蒂。吐利後。胃虛熱者。橘皮竹茹湯。三因方云。凡吐利後。多作噉。此由胃中虛。膈上熱。故噉。或至八九聲相連。收氣不固。至於驚人者。若傷寒人病得此甚惡。內經所謂壞病者是也。丹溪治趙立道年近五十。質弱多怒。暑月。因飢後大怒。得滯下病。口渴。自以冷水調生蜜飲之。痢漸緩。五七日後。診脈稍大。不數。遂令止。蜜水。且以參朮調益元散與之。痢亦漸收。七八日後。覺倦甚。發呃。知其因下久而陰虛也。令守前藥。然利尚未止。又以煉蜜與之。果皆尤藥。

之未當。欲用姜附。曰。補藥無速效。附子非補陰者。服之必死。衆曰。冷水飲多。得無寒乎。曰。炎暑如此。飲涼非與。勿多疑。待以日數。藥力到。當自止。又四日而呃止。滯下亦安。又治陳擇仁年近七十。素厚味。有久嗽病。新秋患滯下。食大減。至五七日後呃作。脉皆大略。衆以爲難。丹溪曰。形瘦者尙可爲。以參朮湯。下大補丸。七日而安。婁全善治其兄。九月得滯下。每夜五十餘行。嘔逆。食不下。五六日後。加呃逆。與丁香一粒。喻之立止。但少時又至。遂用黃連瀉心湯。加竹茹。

濟陽綱目

卷五

呃逆

六

卽減再用木香和中丸。加丁香服之。十日而愈。右例有實積者又治一女。子年踰笄。性躁味厚。炎月因大怒而呃作。作則舉身跳動。脉不可診。神昏不知人問之。乃知暴病。視其形氣俱實。遂以人參蘆二兩煎湯飲一碗。大吐頑痰數碗。大汗昏睡。一日而安。人參入手太陰。補陰中之陽者也。蘆則反是。大瀉太陰之陽。女子暴怒氣上。肝主怒。肺主氣。經曰。怒則氣逆。因怒逆。肝木乘火侮肺。故呃大作。而神昏。參蘆善吐痰。盡則氣降。而火衰。金氣復位。胃氣得和而解。右宜例痰鬱者宜之

濟陽綱目

卷五

呃逆

七

三因云。噦而心下堅痞眩悸者。膈間有痰水。所爲虛不禁吐者。宜二陳湯導痰湯。加姜汁竹瀝。亦有汚血而噦者。丹溪治超越陳氏。用桃仁承氣湯是也。虛不禁下者。於畜血門求輕劑用之。仲景云。噦逆者。陳皮竹茹湯主之。又云。乾嘔噦。若手足厥者。陳皮湯主之。本事方用枳壳五錢。朮香二錢半。細末。每服一錢。白湯調下。孫兆方用陳皮二兩。去白水煎。通口服。或加枳壳一兩。此皆破氣之劑。氣逆者宜之。唯陳皮竹茹湯。氣逆而虛者宜之。水寒相搏者。小青龍

湯寒甚加附子尖炒。潔古柿錢散賢鑑丁香柿蒂散尤活附子湯皆熱劑唯寒呃宜之。戴復菴以熱呃唯傷寒有之其他病發呃者皆屬寒用半夏一兩生姜一兩半水一碗煎半碗熱服或用丁香十粒柿蒂十個切碎白水一盞半煎或理中湯加枳壳茯苓各半錢半夏一錢不效更加丁香十粒亦有無病偶然致呃此緣氣逆而生重者或經一二日宜小半夏茯苓湯加枳實半夏湯或煎湯泡蘿蔔子研取汁調木香調氣散熱服逆氣用之最佳若胃中寒甚呃逆

濟陽綱目

卷十三

呃逆

八

不已或復加以嘔吐輕劑不能取效宜丁香煮散及以附子梗米湯增炒川椒丁香每服各二三十粒。李氏曰呃逆分不足有餘不足因內傷脾胃及大病後胃弱多面青肢冷便溏有餘因外感胃燥及大怒大飽多面紅肢熱便閉有餘可治不足者危。不足者火炎陰虛火乃元氣之賊人之陰氣依胃氣而養胃土受傷則木氣侵之陰火所乘不得內守木挾相火直衝清道而上乃虛之極也。膏粱濕熱者十味小柴胡湯吞單黃栢丸或調益元散胃火善食者小

半夏湯加山梔黃芩吐之火盛者益元散加黃連黃栢自利更加參朮白芍藥陳皮。久病滯下及婦人產後從臍下逆上夜分轉甚者皆屬陰虛四物湯加知栢陳皮竹茹。貧苦大勞火動濁升清陷者補中益氣湯或合生脉散加黃栢附子少許挾房勞者環王膏腎氣不歸元者九味安腎丸。久病寒搏火極是危證脉數爲火刑金必死凡傷寒吐下及雜病久每呃逆者皆火欬上行爲胃中寒邪所遏故搏而有聲俱宜丁香柿蒂散菴活附子湯理中湯倍參火者

濟陽綱目

卷十三

呃逆

九

三香散或木瓜根煎湯呷之中虛昏瞶脉結者炙甘草湯救之。有餘者飽食填塞胸中氣失升降二陳湯加枳壳砂仁。痰閉於上火動於下無別證忽然發呃從胸中起者芩連二陳湯或只用陳皮半夏姜煎服或人參煎湯吐之停痰或因怒鬱痰熱者亦宜蓋參蘆瀉肺肺衰氣降而火土復位矣。七情氣鬱者木香勻氣散用蘿蔔煎湯下。蘇子降氣湯。陽證失下地道不通因而潮熱發呃宜寒藥下之。大柴胡湯陽極脉微將脫者宜涼膈散解毒湯養陰退陽不

可大下。汗吐下後，胃熱未除。小柴胡湯加橘皮竹

茹。或橘皮竹茹湯單瀉心湯。平人食物太速，飲水

入肺，喜笑太多，亦屬有餘。食呃笑呃，以紙撚鼻嚏或

久閉氣可止。水呃，小陷胸湯。小青龍湯去麻黃清

之利之而已。凡汗吐下，服京藥過多者，當溫補脾

胃，陰火上衝者，當平補。挾熱者，宜京補局方率用丁

附溫煖助火損不足而益有餘，宜乎呃逆之必死也。

○診法 六

噦聲頻密相連者為實，可治。若半時噦一聲者為虛。

濟陽綱目

卷十三 呃逆

十

難治，多死在旦夕。或云病久脾胃衰敗而發呃逆，額上出汗連聲不絕者最為惡候，不治也。

治之

○脉法 七

心脉小甚為噦，肺脉散者不治。

脉浮而緩者易治，弦急而按之不鼓者難治。脉結

或促或微皆可治，脉代者危。右關脉弦者木乘土

位難治。肺脉散者是心火刑於肺也，不治。

○治胃虛呃逆方 一

橘皮竹茹湯

治吐利後胃虛膈熱而呃逆

者並治傷寒餘熱未解

陳皮四錢

竹茹

人參各二錢

甘草炙一錢

右判一服，加生姜三片，大棗一枚，水煎服。

倍陳湯 二

治胃虛呃逆有效

陳皮四錢

人參二錢

甘草四分

右判水煎服

橘皮半夏生姜湯 三

治氣虛有痰發呃

陳皮去

半夏湯泡

乾生薑

人參各一錢

木通七分

濟陽綱目

卷十三 呃逆

十一

右判水煎溫服

六君子湯 四

治痰挾氣虛發呃

人參

白朮

茯苓

陳皮

半夏各一錢

甘草炙五分

右判作一服，加生薑三片，大棗一枚，新汲水煎

服。一方加竹茹名參朮竹茹湯

十味小柴胡湯

一名人參白朮湯

五

治氣虛不足呃逆

逆

人參 黃芩

柴胡

乾姜

山梔各七分

白朮

防風 半夏 甘草各五分 五味子九粒

右咬咀作一服加生姜三片水煎服

寶鑑灸甘草湯六

治許伯威中氣本弱病傷

寒八九日醫見其熱甚以京藥下之又食梨三枚冷傷脾胃四肢冷時發昏憤其脉動而中止有時自還乃結脉也心亦悸動呃逆不絕色變青黃精神減少目不欲開蹠臥惡人語以此藥治之

甘草炙 生姜 桂枝 人參 生地黃半枚

阿膠 麥門冬 麻子仁 大棗各等分

濟陽綱目 卷十三 呃逆

上

右剉水煎服 成無已云補可以去弱人參大棗之甘以補不足之氣桂枝生薑之辛以益正氣五藏痿弱榮衛涸竭濕劑所以潤之麻仁阿膠麥門冬地黃之甘潤經益血復脉通心也加人參桂枝急扶正氣生地黃減半恐損陽氣剉一兩服之其證減半再服而安

○治胃寒呃逆方二

加味理中湯七

治吐利後胃中虛寒呃逆

人參 白朮 乾姜炮 甘草 附子 丁香

柿蒂

右剉水煎服

溫中散一名丁香柿蒂散 八

治吐利及病後胃中虛

寒呃逆至七八聲相連收氣不回者難治

丁香 柿蒂 人參 茯苓 橘皮 良姜

半夏各一兩 生姜半兩 甘草炙七分

右剉每服三錢水煎乘熱頓服或用此藥調

蘇合香丸服亦妙

參附湯九

治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆

濟陽綱目 卷十三 呃逆

十三

冷大便秘利或臍腹疼痛呃逆不食或汗多發瘧等證

人參一兩 附子炮五錢

右加姜棗水煎徐徐服 主人參加黃芪名芪

附湯

丁香柿蒂散十 治諸種呃噦嘔逆痰涎

丁香 柿蒂 青皮 陳皮各一兩

右爲粗末每服三錢水一盞半煎七分溫服不

拘時

嚴氏柿蒂湯 十一 治胃膈痞悶、呃逆不止

柿蒂 錢五 丁香 錢三

右作一服，加生姜五片，水煎食遠熱服。

柿錢散 十二 治呃逆

柿錢 丁香 人參 各等分

右爲細末，水煎食後服。

丁香散 十三 治呃逆噎汗

丁香 柿蒂 各一錢 良姜 甘草 各五分

右爲末，每服二錢，用熱湯點服，不拘時。

濟陽綱目 卷十三 呃逆 古

丁香柿蒂竹茹湯 十四 治大病後中焦氣塞下

焦呃逆

丁香 粒三 柿蒂 竹茹 各三錢 陳皮 錢一

右剉水煎服。

增半湯 十五 治胃虛中寒，停痰留飲，嘔吐呃逆

半夏 湯泡炒 三錢 藿香 錢二 人參 丁香皮 各半錢

右剉，加生姜七片，水煎服。

半夏生姜湯 十六 治呃逆欲死

半夏 湯泡 六錢 生姜 錢五

右剉作一服，水煎去粗服，不拘時。

橘皮乾姜湯 十七 治噦

人參 橘皮 桂心 乾姜 通草 甘草 各一兩

右咬咀，每服四錢，水煎服。

茯苓半夏湯 十八 治水寒停胃嘔呃

茯苓 半夏 厚朴 姜汁 陳皮 柿蒂 各一錢

藿香 分八 茴香 分七 乾姜 官桂 丁香 各分

砂仁 分五 沉香 木香 甘草 各三分

右剉，一劑加生姜三片，水煎服。

濟陽綱目 卷十三 呃逆 圭

羌活附子散 十九 治吐利後胃寒呃逆

羌活 附子 炮 茴香 炒 各五錢 乾姜 炮

木香 各一兩

右咬咀，每服二錢，加鹽半箇，鹽少許，水煎服。

一方去木香，用丁香三因方，二香並用。

華澄茄散 二十 治噦氣呃逆，亦治傷寒呃逆，日

夜不定

華澄茄 良姜 各等分

右爲末，每服二錢，水煎沸投醋半盞，呷之。

草豆蔻散 二十一 治寒氣攻胃呃噦

草豆蔻 皮去 益智仁 各一兩 乾柿蒂 二兩

右咬咀每服三錢加生薑三片水煎熱服

陳皮湯 二十二

陳皮 四兩 生薑 半斤

右以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈

小青龍湯 二十三 治水寒相搏發呃

麻黃 芍藥 乾姜 炙甘草 細辛

桂枝 各三兩 五味子 半兩 半夏 湯洗各半升

濟陽綱目 卷十三 呃逆 七

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內

諸藥煮取三升去粗溫服一升

本事方 二十四 治陰毒呃逆

川烏頭 乾姜 炮 附子 炮 肉桂 芍藥

甘草 炙 半夏 吳茱萸 陳皮 大黃 各等分

右爲細末每服一錢姜五片煎去濁粗熱服

此三陰經藥也

丁香散 二十五 治心煩呃噦

丁香 白豆蔻 各半兩 伏龍肝 一兩

右爲末煎桃仁吳茱萸湯調下一錢

三香散 二十六 治胃冷呃逆經久不利

沉香 紫蘇 白豆蔻 各等分

右爲細末每服五七分柿蒂煎湯調下

桂苓白朮丸 二十七 治呃逆止咳嗽散痞滿通壅

塞開堅結痛悶進飲食調和五藏

辣桂 乾姜 各二錢半 茯苓 半夏 湯泡各一兩

白朮 陳皮 各半兩 澤瀉 各半兩

右爲細末麵糊丸如小豆大每服二三十九生

濟陽綱目 卷十三 呃逆 七

姜湯下日三服病在上食後服病在下食前服

病在中不拘時一方加黃藥黃連各半兩水

丸服

呃逆丸 二十八

花椒微炒出汗去目爲末醋糊丸如桐子大每服

十五丸醋湯下

雄黃酒 二十九

雄黃一錢酒一盞煎七分急令患人嗅其熱氣即

止

硫黃 鱉法 三十 治呃逆服藥無效者

硫黃 乳香 各一錢半

右用酒一盞煎七分急令患者熱氣即止

○治氣滯呃逆方三

小半夏茯苓湯 三十一 治別無他證偶爾致呃此

緣氣逆所生

半夏 茯苓 生姜 加枳殼

右剉水煎服

木香調氣散 三十二 治中焦呃逆

濟陽綱目 卷十三 大

木香 檀香 白豆蔻仁 丁香 各三錢 砂仁 四錢

藿香 甘草 各五錢

右爲末每服二錢鹽湯調下

香殼散 三十三

枳殼 五錢 木香 二錢半

右爲細末每服一錢白湯調下未可再與

陳皮湯 三十四 治諸呃噦

陳皮二兩湯浸去白剉以水一升煎五合通口服

頃刻更加枳殼一兩去穢炒同煎之

一方 三十五 治久患呃噦連一二十聲者

取生姜汁半合蜜一匙煎令熱溫服如此三分立效

○治痰火呃逆方四

苔連二陳湯 三十六 治痰閉於上火動於下忽然

發呃從胸中起者

陳皮 半夏 茯苓 甘草 黃芩 黃連

右加生姜水煎服

黃連竹茹湯 三十七 治胃中痰火發呃

濟陽綱目 卷十三 呃逆 尤

黃連 竹茹 麥門冬 山梔 半夏 各一錢 蘇子 八分 砂仁 沉香 木香

苗香 各五分 甘草 二分

右剉一刺加生姜一片烏梅一箇水煎磨

香調服

加味小柴胡湯 三十八 治身熱煩渴發呃

柴胡 黃芩 山梔 柿蒂 陳皮 砂仁

半夏 姜汁 竹茹 各一錢 藿香 八分 苗香 五分

沉香 木香 甘草 各三分

右剉一劑加生姜一片烏梅一箇水煎服
一方三十九 治痰呃

陳皮去白 半夏湯泡各二分

右剉加生姜煎服

一方四十 治陰火呃逆

黃連 黃柏 滑石

右剉水煎服 益元散亦可用

○治陰火呃逆方五

大補陰丸四十一 降陰火益腎水

濟陽綱目卷十一 呃逆 手

黃蘗鹽酒拌新瓦上炒稀色 知母去皮酒拌濕各四兩

熟地黃酒洗焙乾 敗龜板酥炙黃各六兩

右爲細末猪脊髓加煉蜜爲丸如桐子大每服

五十丸空心姜鹽湯下

大補丸四十二 治腎經火燥下焦濕

黃蘗酒炒稀色

右爲末水丸隨證用藥送下

○附灸法六

灸呃逆法四十三

乳根二穴直乳下一寸六分婦人在乳房下起肉處陷中灸七壯卽止其效如神 一云婦人屈乳頭向下盡處骨間是穴丈夫及乳小者以一指爲準男左女右與乳正直下一指陷中動脈處是穴艾炷如小豆大許灸三壯 一法男左女右乳下黑盡處一韭葉許灸三壯甚者二七壯 又法四十四

氣海一穴直臍下一寸半灸三七壯立止 一法於臍下闊元穴灸七壯立愈

濟陽綱目卷十一 呃逆 至

濟陽綱目目錄

卷十四

噫氣

論噫爲火土氣鬱一

論噫氣雜治法二

脉法三

治方

加味二陳湯一

星半湯二

枳殼散三

加味六君子湯四

濟陽綱目

卷十四目錄

十一

勻氣湯五

加減理中湯六

破鬱湯七

丹溪方八

濟陽綱目卷十四

涇陽張楠陰齋註梓

臨潼武叔卿先生編輯

涇陽姚恩錫三續梓

噫氣

○論噫爲火土氣鬱一

準繩云內經所謂噫卽今所謂噯氣也。宣明五氣論曰。心爲噫。痺論曰。心痺者。脈不通。煩則心下鼓。暴上氣而喘。噤乾善噫。至真大要論曰。太陽司天。少陰之

濟陽綱目

卷十四噫氣

一

復。皆爲噦噫。刺禁論。刺中心一日死。其動爲噦。陰陽別論。二陽一陰發病。主驚駭。背痛。善噫。善欠。名曰風厥。脉解。太陰所謂上走心爲噫者。陰盛而上走於陽明。陽明絡屬心。故曰上走心爲噫也。此乃噫從心出者也。至真要大論曰。厥陰在泉。腹脹善噫。得後與氣則快然如衰。玉版論。太陰終者。善噫。靈樞云。足太陰是動。病腹脹善噫。又云。寒氣客於胃。厥逆從下上散復出於胃。故爲噫。仲景謂上焦受中焦氣。求和不能消。是故能噫。衛出上焦。又云。上焦不歸者。噫而酢酸。不至

也。上焦之氣不至其部則由是觀之。噫者是火土之物不能傳化故噫而吞酸。氣鬱而不得發故噫而出。王註解心爲噫之義。象火炎上。煙隨焰出。如痰閉膈間。中氣不得伸而噯者。亦土氣內鬱也。

○論噫氣雜治法二

仲景云痞而噫。旋覆代赭湯主之。本事方心下蓄積痞悶。或作痛。多噫。敗卵氣。枳壳散主之。丹溪云胃中有實火。膈上有稠痰。故成噯氣。用二陳湯加香附。梔子仁。黃連。蘇子。前胡。青黛。瓜蒌。或丸。或湯。服之。

濟陽綱目

卷十四 噫氣

二

又云噫氣吞酸。此係食鬱有熱。火氣衝上。用黃芩爲君。南星半夏陳皮爲佐。熱多加青黛。李氏曰氣盛實噯。食罷噯轉腐氣甚。則物亦噯轉。多傷食濕熱所致。二陳湯加蒼朮神麴麥芽姜炒黃連。或保和丸。不因飲食常噯者。虛也。蓋胃有濁氣。膈有濕痰。俱能發噯。六君子湯加沉香爲君。厚朴蘇子爲臣。吳茱萸爲使。以者。勻氣丸。或蘇合香丸。甚者。靈砂以鎮墜之。葉氏曰亦有食穢下咽。未及運化。胃氣抑而作噯。一兩聲者。此氣升也。不須治。

○服法三

寸口脈弱而緩弱者。陽氣不足。緩者胃氣有餘。噫而吞酸。食卒不下。氣填於膈上。寸脈緊寒之實也。寒在上焦。胸中必滿而噫。跌陽脈微而瀉。微無胃氣。瀉卽傷脾。寒在膈而反下之。寒積不消。胃微脾傷。穀氣不行。食已自噫。寒在胸膈上。虛下實。穀氣不通。爲閉塞之病。跌陽脈微瀉。及寸脈緊而噫者。皆屬寒。太陰終者。腹脹閉噫氣嘔逆。

○治方

濟陽綱目

卷十四 噫氣

三

加味二陳湯

隨證加用、

半夏 陳皮 白茯苓 甘草 炙各一錢

右加生姜煎服。痰加南星香附。火加軟石膏。梔子。宿食加山楂枳實蒼朮。姜炒黃連。

星半湯二

治噫氣。胃中有火有痰。

南星 半夏 軟石膏 香附 各等分

右剉加生姜水煎服。或姜汁浸蒸餅作丸亦可。

一方加炒梔子。或單用石膏醋糊丸服。

枳殼散三

治心下蓄積。痞悶。或作痛。多噫。敗

卵氣

枳殼 白木各半 香附一兩 檳榔二錢

右爲細末，每服二錢，米飲調下，日三服，不拘時。

加味六君子湯四 治胃有濁氣，腸有濕痰，不

因飲食時常虛噯。

人參 白朮 茯苓 甘草 半夏 陳皮

沉香 厚朴 紫蘇子 吳茱萸

右剉，水煎服。

勻氣丸五 治氣虛濁升多噯。

濟陽綱目卷十四 噯氣

草豆蔻 橘皮 沉香 人參各五錢 益智仁

檀香 大腹子各一兩

右爲末，飯丸如桐子大，每服八十九粒，姜湯下。

加減理中湯五 治胃寒噯氣

白朮 陳皮 乾姜炮 甘草炙 木香 茴香

益智 香附 厚朴

右剉，加生姜煎服。

破鬱丹六 治婦人噯氣胸緊，連十餘聲不盡。

噯出氣，心頭畧寬，不噯卽紫。

香附米煮 梔子仁炒各四兩 黃連美汁炒二兩

枳實炒 檳榔 青皮去穢 莪朮 瓜蒌仁

蘇子各一兩

右爲末，水丸如桐子大，每服三十丸，食後滾水

送下。

丹溪方七 治宣州人與前方證，皆除氣上築。

心膈噯氣稍寬，脈之右關弱短，左關左尺長洪大。

而數，此肝有熱，宜瀉肝補脾。

白朮二錢半 青皮一錢 木通五錢 甘草二分

濟陽綱目卷十四 噯氣

右水煎下，保和丸十五粒，抑青丸二十粒。

濟陽綱目目錄

卷十五

吐酸

論吐酸屬熱一

論雜病吐酸與病機外邪不同二

辨素問東垣論酸不同三

論吐酸雜治法四

脉法五

治濕熱作酸方一

濟陽綱目 卷十五 目錄

清鬱二陳湯一

清胃湯二

蒼連湯三

加減平胃散四

萊連九一名咽五

回令九一名佐六

參藟九七

治食積作酸方二

加味平胃散八

八味平胃散九

麴朮九十

丹溪方十一

治痰火作酸方三

加味二陳湯十二

清痰九十三

黃連清化九十四

火鬱越鞠九十五

一方十六

治停飲作酸方四

神朮九十七

乾姜九十八

治寒鬱作酸方五

加減安胃湯十九

加味二陳湯二十

治氣鬱作酸方六

透膈湯二十一

橘皮一物湯二十二

一方二十三

平肝順氣保中九二十四

濟陽綱目 卷十五 目錄

治虛火作酸方七

加味四物湯二十五