



辨喉疳喉菌論

喉疳喉間上腭有青白紅點平坦者是也或亦有喉間作痛而潰爛者此由腎虛火旺沸騰上部而發治之須用六味丸加減若山梔黃芩元參升參女貞知母龜板之屬隨宜用之吹藥冰青散中加五倍子白芷牛黃珍珠黃連等物又有肺經熱毒積聚而發者其證生於咽喉之下肺管之上看之不見吹藥不到飲食妨礙此名過橋疳潰爛作痛往往久而不愈此或係天行疫毒或係梅毒遺毒俱宜服化毒丹銀花

解毒湯或涼隔散吹藥與上同

喉菌狀如浮萍畧

高而厚紫色生於喉旁因憂鬱氣滯血熱而生婦人
多患之輕則半月二十日重者月餘要在治之得法
患者守戒忌口方能痊愈加味逍遙散主之

辨喉痺喉癰論

夫喉痺者咽喉腫痛無形

腫而無形者爲喉痺腫而有形卽爲蛾爲癰

或

腫一邊或腫兩邊妨於飲食阻於呼吸故名痺也經

曰一陰一陽結謂之喉痺一陰少陰君火也一陽少

陽相火也二脉俱絡咽喉或其人平素陰虧君相無制亢甚逆於喉中而結或外爲風溫所襲助其火邪致循肺絡入喉而結其風熱喉痺內外皆腫痰涎壅塞喉間治法先去其痰腫甚者用刀點之出血瀉火以水礪散吹之內服羚羊角散或黃連解毒湯可愈

至虛火上攻而爲痺者宜服六味地黃湯知栢八味
丸大補陰丸之屬以滋陰壯水爲主又有腎水衰竭
龍火不藏上越於喉中而成痺者以腎脉循喉嚨故
火亢亦有此證其人必時時欬嗽咽燥口渴手足心
熱脉細數若但壯其水而龍火不肯潛藏須用導火
歸源之法從下而引之方能退伏若桂附八味丸是
也餘如阿膠麥冬龜版燕窩女貞貝母元參之類清
燥救肺亦可隨時酌用 喉癰之生也始時必有陰
虛欬嗽後遂喉中作癢而痛嚥唾隨覺乾燥必再加

嚙嚙而後快久則成形或如哥窩紋樣又如秋葉背
後紅絲又或紅點密密如蚊蚤咬迹之狀良以真陰
虧損腎火上冲肺金受燥營血枯槁而結治法與喉
痺大畧相等此證若久不愈則咽喉必至失音而成
損怯不可救矣治以清燥救肺湯或大補陰丸或知
栢八味丸

有之藥用牛黃厚朴湯乃二陳湯去陳皮甘草加
厚朴紫蘇生薑也專治痰火七情之氣鬱滯不散結
成痰涎或如核在咽喉不下或中脘痞滿氣不

辨梅核氣喉痞論

梅核氣者乃痰氣結於喉中如塊噉之不下吐之不出金匱云婦人咽中有如炙癰半夏厚朴湯主之炙癰者乾肉也此病不因腸胃故不礙飲食二便不因表邪故無骨疼寒熱乃爲積寒所傷不與血和血中之氣溢而浮於咽中得水濕之氣凝結難移男子亦間有之藥用半夏厚朴湯乃二陳湯去陳皮甘草加厚朴紫蘇生薑也專治婦人七情之氣鬱滯不散結成痰涎或如梅核在咽咯噉不下或中脘痞滿氣不

舒暢或痰飲中滯嘔逆惡心並可取效蓋半夏消痰
降逆厚朴散結生薑茯苓宣至高之滯而下其濕蘇
葉味辛氣香色紫性溫能入陰和血則氣與血和不
復上浮也 喉痞者謂有言而無聲由風火侵肺悞
服寒涼生冷音雌者輕虛癆肺損音啞者難治又病
人瘥後氣短及聲不出者皆肺氣不行宜服降氣湯
多加前胡臨服加薑汁以佐之又婦人有子瘥病經
云婦人重身九月而瘥者胞之絡脉絕也無治當十
月復謂胎至九月兒體已長胞宮之絡脉繫於腎經

者阻絕不通故間有是證蓋腎經之脉上繫舌本脉
道阻絕則不能言至十月分娩後而自能言不必加
治治之當補心腎

原寒頭脹清江丸熱咽喉結痺腫腐通體痲疹隱
斯時即宜疎表如小兒解肌湯升麻葛根湯內加消
食等藥喉內用珠黃散吹之至三四日溫邪化火熱
盛痧透者解肌湯內加犀角羚羊石斛花粉如大便
乾結燥實者涼膈散亦可如協熱便泄舌苔白膩者
葛根苓連湯至五六日熱甚神識時迷咽喉腐爛鼻

辨爛喉丹痧順逆論

夫爛喉丹痧者係天行疫厲之毒故長幼傳染者多
外從口鼻而入內從肺胃而發其始起也脉緊弦數
惡寒頭脹膚紅肌熱咽喉結痺腫腐遍體癰疹隱隱
斯時卽宜疎表如牛蒡解肌湯升麻葛根湯內加消
食等藥喉內用珠黃散吹之至三四日溫邪化火熱
盛痧透者解肌湯內加犀角羚羊石斛花粉如大便
乾結燥實者涼膈散亦可如協熱便泄舌苔白膩者
葛根苓連湯至五六日熱甚神識時迷咽喉腐爛鼻

塞不通時流濁涕此以火盛上逆循經入絡內逼心
胞用犀角地黃湯或玉女煎內加胆星石菖西黃藥
珠或紫雪丹至七日後熱退遍體焦紫痧癍如赭壳
脫皮而愈 如起時一二日後脉細弦勁身雖紅赤
瘰不外透神識昏蒙語言錯亂氣逆喘急者此疫毒
內閉卽爲險逆證可用鮮生地四兩搗汁和金汁梨
汁蔗漿再用鮮蘆根煎湯磨犀角汁冲和送化紫雪
丹或珠黃散惟芳香開逐庶可冀其僥倖於萬一耳

附王步三先生爛喉丹痧論

夫爛喉丹痧之證方書未載其名上稽往古金匱有陽毒之文叔和著溫毒之說其證形與今之名丹痧爛喉者極合本論以升麻龍甲湯黃連解毒湯主治是論邪入陰陽二經治法大例原未教人穿鑿執方學者以意會之可也今考斯證每發於雜氣邪陽之令來勢卒暴莫制如迅雷風烈令人色沮見者莫不萎腰咋舌却走不遑與費氏所論痘證中邪火毒伏之例如脉伏厥冷汗淋便洩噦逆躁煩諸惡欵相同

甚有一門傳染不數日間相繼云亡者嗚呼其慘酷
何至今爲烈耶程郊倩云古人出痘少溫毒始盛今
人出痘多溫毒亦少時下種痘之術盛行或邪毒未
洩所致歟抑亦氣運自然之會歟吳醫彙講中李祖
二君論證論治甚詳所謂驟寒則火鬱而內潰過散
則火燄而腐增洵屬至理名言確乎不拔然亦不外
繆氏筆記中肺胃爲本先散後清之旨云爾推此論
治邪氣在衛麻杏甘膏勢所必投毒火侵營犀角地
黃亦所當取卽如眉壽葉氏宗喻老芳香宣竅解毒

之議治用紫雪丹其法亦不可缺顧臨證權宜要在
生心化裁之妙耳然歟否歟自有能辨之者管見一
斑俟高明教政倘更示以指南不致蒼生貽誤幸
甚幸甚

中風脈弦硬者似于瘧狀用生芩荆芥薄荷夏枯
草丹皮山梔或小蘇胡湯如得汗邪微則腫脹自平
或至三五日後脹痛更甚身熱不和風溫化火必挾
肝邪上升脹痛時加針刺內成膿矣用羚羊角丹皮
山梔鉤勾夏枯草大龍胆瀉肝湯俟膿泄邪微自焚

