

四卷三氣門方目

附錄

一括蔓根桂枝湯 有論

二葛根湯 有論

三大承氣湯 有論
已上三方俱金匱

四麻黃加獨活防風湯

五神朮湯

六白朮湯

七白朮加藥法

八桂枝葛根湯

九桂枝加川芎防風湯

十柴胡加防風湯

十一防風當歸湯

十二八物白朮散

十三桂枝加芍藥防風防已湯

十四附子散

十五桂心白朮湯

十六附子防風散

已上十二方俱
海藏治痺病方

十七羌羊角散

十八麥門冬散

十九石膏散

二十牛黃散

二十一愈風湯

海藏

二十二人參瀉肺湯

二十三天門散

二十四半夏

二十五赤茯苓湯

二十六龍腦

蘇氏蘇丸

二十七利膈

散

二十八地黃

煎

二十九碧雪

三十消毒犀角飲

三十一四物二連湯

三十二四順清涼飲子

三十三牛黃膏

已上治熱病方

三十四麻黃白朮湯

有論

三十五桂枝附子湯

三十六白朮附子湯

三十七甘草附子湯

三十八麻黃杏子薏苡甘草湯

三十九防已黃芪湯

有論

已上六方俱金匱

四十和劑五積散

四十一活人敗毒散

四十二清熱滲濕湯

四十三二朮四苓湯

四十四桂苓甘露飲

四十五羌活勝濕湯

四十六續隨子丸

四十七除濕湯

四十八白朮酒

已上治濕病方

四十九白虎加人參湯

五十瓜蒂湯

二方合論
二方金匱

五十一清暑

益元湯

五十二人參益氣湯

二方俱東垣

五十三生脈散

五十四竹葉石膏湯

五十五黃芪人參湯

五十六香薷飲

五十七五物香薷飲

五十八黃連香薷飲

五十九十味香薷飲

六十桂苓甘露飲

宣明

六十一桂苓甘露飲

子和

六十二桂苓丸

六十三五苓散

六十四辰五苓散

六十五益元散

六十六通苓散

六十七三黃石膏湯

六十八白虎加蒼朮湯

六十九六和湯

七十却暑散

七十一消暑丸

七十二枇杷葉散

七十三潑火散

七十四香薷丸

七十五酒煮黃連丸

七十六水葫蘆丸

七十七縮脾飲

七十八大順散

七十九冷香飲子

八十大黃龍丸 已上治暑病

秋燥門方目

一滋燥養榮湯

二大補地黃丸

三潤腸丸 東垣

四導滯通幽丸 東垣

五清涼飲子

六大秦芫湯

七元戎四物湯

八大補丸 丹溪

九六味地黃丸

十局方當歸補血湯

十一神功丸

子和

十二楊氏秦芫扶羸湯

十三杏仁煎丸

東武

十四杏仁膏

十五阿膠散

十六皺肺丸

十七自製清燥救肺湯

醫門法律卷之四

西昌喻昌嘉言父著

黎川陳守誠伯常重梓

熱濕暑三氣門

法二十五條
律十一條

論三篇

六氣春主厥陰風木秋主陽明燥金冬主太陽寒水

各行其政惟春分以後秋分以前少陽相火少陰

君火太陰濕土三氣合行其事是故天本熱也而

益以日之暑日本烈也而載以地之濕三氣交動

時分時合其分也以風動於中勝濕解蒸不覺其

苦其合也天之熱氣下地之濕氣上人在氣交之

中受其炎蒸無隙可避多有體倦神昏肌膚沸起
胸膈痞出頭面癰生者矣甚則消渴癰疽吐瀉瘧
痢又無所不病矣其不能澹泊滋味屏逐聲色者
且以濕熱預傷金水二臟爲秋冬發病之根故病
之繁而且苛者莫如夏月爲最夫天氣無形之熱
與地氣有形之濕交合而大生廣生之機益彰然
殺機每伏於生機之內所稱移星易宿龍蛇起陸
者卽於夏月見之人身亦然內經運氣主病凡屬
少陰君火卽與太陰濕土一類同推不分彼此而
太陰司天濕淫所勝平以苦熱佐以酸辛以苦燥

之以淡泄之。治濕之法則然矣。干文卽出治熱之法云。濕上甚而熱。治以苦溫。佐以甘辛。以汗爲故而止。可見濕淫而至於上甚卽爲熱淫。其人之汗必爲濕熱所鬱而不能外泄。故不更治其濕。但令汗出。如其故常。斯熱從汗散。其上甚之濕卽隨之俱散耳。觀於內經。濕熱二氣合推。卽以得汗互解。妙義彰彰矣。

仲景以瘧病、濕病、暍病其爲太陽經外感之候者。合而名篇。蓋瘧爲熱病之最惡者。而要皆爲濕熱之所釀。正從三氣交動中會其微旨也。然三氣雜病。

非傷寒之比者曷可枚舉但有一端爲時令所乘
卽當推三氣主病何有何無孰淺孰深以求確然
之治如當風冒濕飲醇啖燔精津素虧熱毒內蘊
濕邪久着之體發爲瘡瘍瘡痢黃痺腫滿消渴痿
厥之病既有濕熱多寡之不同又有氣血虛實之
各異向非深入軒岐仲景堂奧而取途於諸家之
狹隘所稱活人手眼果安在哉故會三氣交病之
義以審脉辨證用方其於濕熱之孰多孰少治療
之從上從下補救之先陰先陽纖悉畢貫矣不遵
聖法而欲免過差其可得乎

金匱論瘧病於風木主事之時。蚤已申不可汗下之
戒云。夫風病下之則瘧復發。汗必拘急。見風與熱
合而生病。風則內應肝而主筋。熱則內應心而主
脉。妄下損陰則筋失養而成瘧。妄汗損陽則脉失
養而拘急矣。至濕暍所釀之瘧。其不可汗下之意
則爲少。變維時陽氣在外。旣屢以發汗爲戒。及遇
無汗之剛瘧。又不得不用葛根湯取其微汗。至於
下法。全不示戒。且云可與大承氣湯。其意甚微。見
身內之陰爲外熱所耗。容有不得不下之證。但十
中不得一二。終非可訓之定法。畧舉其端。聽用者

之裁酌耳。然亦見風寒之邪中人不可妄用苦寒，濕熱之邪中人不可妄用辛溫矣。

論金匱治瘧用括蕒根桂枝湯方。

本文云：太陽病其證備，身體強，几几然，脈反沉遲，此爲瘧。括蕒根桂枝湯主之。傷寒方中治項背几几用桂枝加葛根湯矣。此因時令不同，故方亦少變。彼之汗出惡風，其邪在表，而此之太陽證固不具備。其邪之亦在於表可知也。但以脈之沉遲，知其不在表之邪，爲內濕所持而不解，卽係濕熱二邪交合，不當從風寒之表法起見，故不用葛根之發。