

醫統正脈全書

六四

丹溪心法卷四

元 丹溪朱震亨著

痿五十六

痿証斷不可作風治而用風藥 有濕熱 濕痰氣虛

血虛 瘀血 濕熱東垣健步丸加燥濕降陰火蒼

朮黃芩黃柏牛膝之類 濕痰二陳湯加蒼朮白朮黃

芩黃柏竹瀝姜汁 氣虛四君子湯加黃芩黃柏蒼朮

之類 血虛四物湯加黃柏蒼朮煎送補陰丸 亦有

食積死血妨碍不得下降者大率屬熱用參朮四物湯

黃柏之類

附錄謹按五痿等証特立篇目所論至詳後代諸方獨於此証蓋多缺畧攷其由皆因混入中風條內故也丹溪先生痛千古之弊憫世之罹此疾者多誤于庸醫之手有志之士必當究其心焉夫陳無擇謂痿因內藏不足所致誠得之矣然痿之所不足乃陰血也而方悉是補陽補氣之劑寧免實實虛虛之患乎且無擇以三因立方可謂諸方之冠其餘此証尤且未明況求於他者乎

附方 健步丸 東垣方

防已

酒洗 一兩

羌活

柴胡

滑石

炒

甘草

炙

瓜蒌根

酒洗以上 各半兩

澤瀉

防風

各三錢

苦參

酒洗

川烏

各一錢

肉桂

五分

右爲末酒糊爲丸梧桐子大每服七十九葱白煎愈

風湯下

見中風類

補陰丸

見諸虛類

清燥湯

治濕熱成痿以燥金受濕熱之邪是絕寒水

生化之源源絕則腎虧痿厥之病大作腰已下痿軟

癱瘓不能動

黃芪

一錢五分

蒼朮

一錢

白朮

橘皮

澤瀉

各半錢

人參

白茯苓

升麻

各三分

麥門冬

歸身

生苧

曲末

猪苓

各二分

酒柏

柴胡

黃連

各一分

五味子

九箇

甘草

炙二分

右每服半兩水煎空心服

厥五十七

附手足十指麻木

厥逆也手足因氣血逆而冷也因氣虛為主有因

血虛 氣虛脉細 血虛脉大 熱厥脉數 外感脉

沉實 有痰脉弦 因痰者用白朮竹瀝 氣虛四君

子 血虛四物 熱厥用承氣 外感用雙解散加姜

汁酒 有陰厥陽厥陰衰於下則熱陽衰於下則寒

手足麻者屬氣虛 手足木者有濕痰死血 十指麻

木是胃中有濕痰死血

附錄厥者甚也短也逆也手足逆冷也其証不一散

之方書者甚多今姑撮大槩且如寒熱厥逆者則爲

陰陽二厥也陽厥者是熱深則厥蓋陽極則發厥也

不可作陰証而用熱藥治之精魂絕而死矣急宜大
小承氣湯隨其輕重治之所謂陰厥者始得之身冷
脉沉四肢逆足踈卧唇口青或自利不渴小便色白
此其候也治之以四逆理中之輩仍速灸關元百壯
又尸厥飛尸卒厥此卽中惡之候因冒犯不正之
氣忽然手足逆冷肌膚粟起頭面青黑精神不守或
錯言妄語牙緊口噤或昏不知人頭旋暈倒此是卒
厥客忤飛尸鬼擊吊死問喪入廟登塚多有此病以
蘇合丸灌之候稍甦以調氣散和平胃散服名調氣

平胃散 痰厥者乃寒痰迷悶四肢逆冷宜姜附湯

溫通之必以生附代熟附 虻厥者乃胃寒所生經

曰虻者長蟲也胃中冷卽吐虻蟲宜理中湯加炒川
椒五粒檳榔半錢吞烏梅丸効虻見椒則頭伏故也

氣厥者與中風相似何以別之風中身溫氣中身
冷以八味順氣散或調氣散如有痰以四七湯導痰
湯服之

附方 八味順氣散 見中風類

調氣散

百豆蔻

丁香

檀香

木香

各二錢

藿香

甘草

炙各八錢

砂仁

四錢

右爲末每服二錢入塩少許沸湯點服

平胃散

蒼朮

泔浸五斤

厚朴

姜制炒

陳皮

各三斤

甘草

炒三十兩

右爲末每服五錢姜三片棗一箇煎服入塩一捻沸

湯點服亦得

四七湯

厚朴

二兩

茯苓

四兩

半夏

五兩

紫蘇

二兩

右每服四錢水一鍾姜七片棗一箇煎服

承氣湯

見痢類

四逆湯

理中湯

姜附湯

並見中寒類

烏梅丸

見心痛類

導痰湯

見痰類

痊五十八

痊切不可作風治兼用風藥

大率與癰病相似比癰

爲甚爲虛宜帶補

多是氣虛有火兼痰宜用人參竹

瀝之類

附錄古方風痙曰痙也經云諸痙項強皆屬於濕土是太陽傷濕也又云諸暴強直皆屬於風是陽明內鬱而陰行於外又曰陽痙曰剛無汗陰痙曰柔有汗亢則害承乃制故濕過極反兼風化制之然兼化者虛象實非風也

附方

葛根湯 治痙病無汗而小便少反惡寒者名剛痙

葛根

四錢

麻黃

二錢

桂枝

二錢

芍藥

二錢

甘草

三錢
炙

右呔咀水二鍾生姜三片棗一枚煎服覆取微汗

桂枝加葛根湯 治瘧病有汗不惡寒者服之此名柔

瘧

葛根

四錢

生姜

三錢

桂枝

芍藥

甘草

各二錢

右作一服水二鍾棗一箇煎服 一瘧皆可用小續

命湯加減服若胃滿口噤咬齒脚攣卧不着床者以

大承氣湯下之無疑矣

小續命湯

見中風類

大承氣湯

見痢類

癰五十九

驚與痰宜吐 大率行痰爲主用黃連南星瓜蔓半夏
尋火尋痰分多分治之無不愈者 分痰與熱 有熱
者以涼藥清其心 有痰者必用吐藥吐後用東垣安
神丸 大法宜吐吐後用平肝之劑青黛柴胡川芎之
類龍會丸正宜服之 且如癰因驚而得驚則神不守
舍舍空而痰聚也

戴云癰者俗曰猪癰風者是也

附錄癇症有五馬牛雞豬羊且如馬癇張口搖頭馬
鳴牛癇目正直視腹脹雞癇搖頭反折喜驚羊癇喜
揚目吐舌豬癇喜吐沫以其病狀偶類之耳無非痰
涎壅塞迷悶孔竅發則頭旋顛倒手足搐搦口眼相
引胷背強直叫吼吐沫食頃乃甦宜星香散加全蝎
三箇

附方

續命湯 主癇發頓悶無知口吐沫出四體角弓反張
目反上口噤不得言

竹瀝一升二合

生芡汁一升

龍齒末

生姜

防風

麻黃去節各四兩

防已

附子炮各二兩

石膏

桂二兩

石十味水一斗煮取三升分三服有氣加紫蘇陳皮

各五錢

小兒癰千金有風食驚三種本事方又有陰陽癰慢

脾風三証慢脾即食癰宜醒脾丸人參散

古方三癰丸 治小兒百二十種驚癰

荊芥穗

二兩

白礬

一兩半生半枯

右爲末麪糊爲丸黍米大硃砂爲衣姜湯下二十九
如慢驚用來復丹急驚三癇丸食癇醒脾丸可也

本事人參散

治慢脾風神昏痰盛

人參

半兩

圓白大南星

一兩切片以生姜汁并漿水各半蔭滿煮帶性晒

右爲末每服一錢水一盞姜二片冬瓜仁搗細少許
同煎取半盞作兩三次灌下

寧神丹

清熱養氣血不時潮作者可服

天麻

人參

陳皮

白朮

歸身

茯神

荊芥

殭蠶炒

獨活

遠志

犀角

麥門冬去心

酸棗仁

辰砂

另研各半兩

半夏

南星

石膏

各一兩

甘草

炙

白附子

川芎

鬱金

牛黃

各三錢

珍珠

三錢

生芩

黃連

各半兩

金箔

三十片

右爲末酒糊丸空心服五十丸白湯下

東垣安神丸

黃連

一錢五分酒洗

硃砂

一錢水飛

酒生芩

酒歸身

炙甘草

各五分