

一九八二年历书



技术出版社

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

积极发展多种

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

决不放弃粮食生产，积极开展多种经营，这就是我们的方针。

搞好多种经营是发展商品经济的关键环节。务必使同志们懂得，没有充分发展的社会主义的商品生产，我国的农业不但不能实现现代化，就是摆脱困境也是不可能的。

三中全会以来，一些科学家和技术人员对发展农业，调整布局，提出了许多有益的意见。如：要放眼全部国土的利用；要有大农业与大粮食的观点；粮食要着重抓总产而不能只看种植面积；改变耕作制要考虑自然条件和经济条件，因地制宜，重视经济效益；在南方已经证明不适合种双季稻的地区适当缩双季稻；在华北、东北注意改单一粮食连作制为多作物轮作制；要提倡科学种田，提高单位面积产量；

。

开展多种经营，要发挥集体和个人两个积极性。生产队要根据当地自然资源、劳动力资源的状况和生产习惯，推行在统一经营的前提下，按专业承包、联产计酬的生产责任制，组织各种形式的专业队、专业组、专业户、专业工。同时要通过订立合同和其它形式，积极鼓励和支持社员个人或合伙经营服务业、手工业、养殖业、运销业等。凡是适宜社员个人经营的项目，尽量由农户自己去搞，生产队加以组织和扶助。

不搞包产到户的地方，可以因地制宜，适当扩大自留地、饲料地。两者面积的最高限度可达生产队耕地总面积的15%，各地的具体比例，由各省、市、自治区党委和政府根据当地情况和社员群众的意见，分别确定，不要一刀切。除农忙季节外，应允许一些半劳力和辅助劳力不出集体工，以便专心从事力所能及的家庭副业（即允许存在群众所说的“自留人”）。责成农委会同有关部门制订专门经济法规，以保证国家对社会主义辅助经济和个体经济的积极扶持有章可循。

农民在~~发展多种经营~~其它各项生产中，由于技术水平高低和付出劳动多少不同而~~出~~收入土~~地~~差

别，因差别而出现竞争，是合理的。不应当把这种现象看成是资本主义的两极分化，更不应当由此导致打击、限制多种经营的错误做法。

多种经营，综合发展，应当作为我国繁荣农村经济的一项战略性措施。落实这项措施，牵连的方面很多，比如商品粮供应的平衡问题，国家、集体、个人三方面利益的统筹兼顾问题等。因此，必须坚定而又审慎地、积极而又稳步地前进。关键问题之一，是把生产队的自主权、农民的主动性和国家经济计划的要求协调起来。中央、国务院建议逐步推广经济合同制，条件具备的地方可以先行试点。粮食征购任务和经济作物的收购任务，由国家收购部门同生产队订立合同，确定双方应承担的义务。生产队保证完成合同规定的交售任务，对作物种植面积有权自行灵活安排，剩余的产品，有权自行处理。

开展多种经营，要组织各种形式的经济联合，切实解决产供销和技术指导等方面的问题。农业、工业、商业供销、交通运输、财政金融、科学技术各部门，都要把这项工作作为重要任务。要使各行各业的同志、首先是各级干部了解：如果我们不首先关心和切实解

决八亿农民的温饱和富裕问题，只是考虑向他们多购取城市需要的各种农副产品，而忘记千方百计帮助农民多生产这些产品，杀鸡取卵，竭泽而渔，那就根本谈不上整个现代化建设事业的发展。

改善农村集体经济的管理方法，调整农业内部的生产结构，建立农工商综合经营的农业经济体制，都是我国经济建设中具有战略意义的问题，都是摆在全党面前的新课题。我们必须重新学习。在国民经济调整时期，从中央、国务院到地方各级党委、政府，除紧紧抓好当前的各项工作外，还应亲自动手，组织干部和技术人员，对农村经济进行系统周密的调查和试点，研究新情况，发现新问题，取得新知识，提出新建议，积累新经验，使我国农村社会主义事业更有活力，更加蓬勃地向前发展，逐步走出一条适合国情的发展农业的路子。

——摘自中共中央和国务院1981年3月30日转发国家农委《关于积极发展农村多种经营的报告》



怎样防治油菜菌核病

油菜菌核病是我省油菜的主要病害。一般在盛花期始发，落花后盛发，主要危害茎秆。病斑开始呈褐色水渍状，后转为灰白色，潮湿时病部呈软腐现象，表面生有绵毛状白霉，干燥后病部破裂，茎内因腐烂而空心，并有黑色鼠粪状的菌核。受菌核病危害的油菜，植株逐渐枯萎，千粒重降低，出油率减少，严重影响产量和品质。防治油菜菌核病，除实行轮作、搞好种子处理外，注意加强田间管理和施药防治。开春以后，搞好清沟排渍，合理施肥，防止倒伏，保持田间通风透光。子囊盘发生初期（2月下旬至3月上旬）要勤中耕、浅中耕，以切断子囊盘。菌核病扩展期，及时打掉老、黄、病叶，防止病菌从叶柄及掉落在叶柄上的花瓣侵入蔓延。药剂防治，主要可用40%纹枯利可湿性粉1,000倍液，或50%多菌灵可湿性粉500倍液，或65%代森锌可湿性粉400—600倍液，也可用1:10—15的硫磺石灰粉（每亩硫磺2斤）进行防治。

怎样使母鸡多产蛋

母鸡产蛋量随年龄的增长而减少，一般第一年产蛋最多，第二年次之，第三年最少。产蛋鸡一般只利用一年，个别高产的鸡可利用两年。按季节分，春季气候暖和，日照逐渐加长，是鸡产蛋最旺盛的季节，也是孵化、育雏和培育新鸡群的最好季节。这时加强对产蛋鸡的饲养，可以收到“事半功倍”的效果。鸡的日粮中要特别注意提高蛋白质、维生素和微量元素的含量。在春季要多喂含蛋白质高的精饲料，要特别注意喂动物性的饲料，如猪胞衣、猪肺、鱼粉、蚕蛹、蚯蚓、蛋壳等是喂产蛋鸡的最好饲料。如能适当增加这类饲料，产蛋量可以成倍增加。

1982年 农历辛酉年

1月大 十二月大

1日	星期五	初七	元旦
2日	星期六	初八	乙酉
3日	星期日	初九	丙戌
4日	星期一	初十	丁亥
5日	星期二	十一	戊子
6日	星期三	十二	小寒
7日	星期四	十三	庚寅
8日	星期五	十四	辛卯
9日	星期六	十五	三九
10日	星期日	十六	癸巳
11日	星期一	十七	甲午
12日	星期二	十八	乙未
13日	星期三	十九	丙申
14日	星期四	二十	丁酉
15日	星期五	廿一	戊戌

记

事

夏季高温、多雨、潮湿，鸡的食欲减退，产蛋量开始下降，要注意防暑降温，保持环境干燥卫生，以维持蛋鸡的高产。

秋季天高气爽，日照时间缩短，先年的产蛋鸡有的开始换羽毛停产，当年的新母鸡开始产蛋，要注意提高鸡饲料中的蛋白质水平，并适当增加光照，有利于缩短老母鸡的换羽期和促使新母鸡提前产蛋。

冬季气候寒冷，日照时间更短，除了增加饲料营养外，饲养管理的重点是搞好防寒保暖，注意增加人工光照，使鸡群冬季不停产，维持较高的产蛋水平。

1982年		农历壬戌年	
1月大		十二月大	
16日	星期六	廿二	己亥
17日	星期日	廿三	庚子
18日	星期一	廿四	四九
19日	星期二	廿五	壬寅
20日	星期三	廿六	大寒
21日	星期四	廿七	甲辰
22日	星期五	廿八	乙巳
23日	星期六	廿九	丙午
24日	星期日	三十	丁未
25日	星期一	正月	春节
26日	星期二	初二	己酉
27日	星期三	初三	五九
28日	星期四	初四	辛亥
29日	星期五	初五	壬子
30日	星期六	初六	癸丑
31日	星期日	初七	甲寅

记

事

长毛幼兔过“三关”

常宁县园艺场养兔土专家郭铁生负责饲养的幼兔，成活率逐年增高，1980年达到97.7%。他在实践中总结出饲养幼兔过“三关”的经验。

一过哺乳期的母兔防病关：幼兔哺乳期，如果母兔患乳房炎，对幼兔会造成致命的危害，因此根治母兔乳房炎是提高幼兔成活率的第一关。办法是，加强母兔的孕期管理，确保有足够的初乳；产仔后，头五天用中草药蒲公英合剂擦洗乳房消炎；减少哺乳次数，坚持每天只哺乳一次，但必须喂饱。

二过断奶期幼兔饲养

1982年 农历壬戌年
2月平 正月大

1日	星期一	初八	乙卯
2日	星期二	初九	丙辰
3日	星期三	初十	丁巳
4日	星期四	十一	立春
5日	星期五	十二	六九
6日	星期六	十三	庚申
7日	星期日	十四	辛酉
8日	星期一	十五	壬戌
9日	星期二	十六	癸亥
10日	星期三	十七	甲子
11日	星期四	十八	乙丑
12日	星期五	十九	丙寅
13日	星期六	二十	丁卯
14日	星期日	廿一	七九

记

事

关：幼兔断奶后，必须选择合理的饲料配方，采用容易消化的配合饲料。一般以青料为主，加处理精料（稀饭拌麦麸、米糠，外加少量矿物质粉及微量元素等）饲喂，效果较好。在饲喂方法上要坚持勤添少给的原则，每日喂五次。

三过传染病的防治关：常见的幼兔传染病有“球虫病”、“伪结核病”等。当幼兔发病后，首先必须采取隔离措施，再分别确诊治疗。

——摘自1981年5月21日

《湖南科技报》

1982年 农历壬戌年			
2月平 正月大			
15日	星期一	廿二	己巳
16日	星期二	廿三	庚午
17日	星期三	廿四	辛未
18日	星期四	廿五	壬申
19日	星期五	廿六	雨水
20日	星期六	廿七	甲戌
21日	星期日	廿八	乙亥
22日	星期一	廿九	丙子
23日	星期二	三十	八九
24日	星期三	二月	戊寅
25日	星期四	初二	己卯
26日	星期五	初三	庚辰
27日	星期六	初四	辛巳
28日	星期日	初五	壬午

记

事

南瓜人工授粉效果好

南瓜是雌雄同株异花。虽然雄花数目比雌花多几倍到十几倍，但往往因不利气候影响，妨碍昆虫传粉，使雌花不能受精或受精不良而脱落。采取人工授粉，能有效地促进雌花受精，提高产量。

南瓜人工授粉的方法简单。在授粉的前一天，先将可授粉的雌花用瓜叶覆盖，以防雨水侵入，次日清晨8时左右摘取雄花罩在雌花上，两三天后揭去雄花即可。大面积授粉，也可以在雌花开放期，当天清晨先采集雄花上的花粉，然后用小棉团沾上花粉，涂擦在雌花柱头上。

1982年 农历壬戌年

3月大 二月小

1日	星期一	初六	癸未
2日	星期二	初七	甲申
3日	星期三	初八	乙酉
4日	星期四	初九	九九
5日	星期五	初十	丁亥
6日	星期六	十一	惊蛰
7日	星期日	十二	己丑
8日	星期一	十三	庚寅
9日	星期二	十四	辛卯
10日	星期三	十五	壬辰
11日	星期四	十六	癸巳
12日	星期五	十七	甲午
13日	星期六	十八	乙未
14日	星期日	十九	丙申
15日	星期一	二十	丁酉

记

事

芙蓉鲤

芙蓉鲤是以散鳞镜鲤为母本，兴国红鲤为父本杂交而成的。它具有食性广，耐粗饲，抗病力强，体短肉厚等特点，是一种优良的养殖鱼种。在相同的饲养条件下，芙蓉鲤生长比散鳞镜鲤快40%左右，比兴国红鲤快50%左右，比野鲤快1倍以上。芙蓉鲤在适宜条件下饲养5个月，平均每条鱼重1.5—2斤。一般鱼种池每亩套养20—30尾，亩产40—50斤；成鱼池混养，在中等饵料肥条件下，每亩放养20尾左右，亩产30—40斤。

芙蓉鲤制种方法简便，容易大批量生产鱼苗，便于推广。如与丰鲤同时推广，可合理利用亲鱼。

1982年		农历壬戌年	
3月大		二月小	
16日	星期二	廿一	戊戌
17日	星期三	廿二	己亥
18日	星期四	廿三	庚子
19日	星期五	廿四	辛丑
20日	星期六	廿五	壬寅
21日	星期日	廿六	癸卯
22日	星期一	廿七	甲辰
23日	星期二	廿八	乙巳
24日	星期三	廿九	丙午
25日	星期四	三月	丁未
26日	星期五	初二	戊申
27日	星期六	初三	己酉
28日	星期日	初四	庚戌
29日	星期一	初五	辛亥
30日	星期二	初六	壬子
31日	星期三	初七	癸丑