

2006

■ 巫向前 主编

ZHUGUAN HUSHI ZHICHENG KAOSHI QIANGHUA XUNLIAN TIJI

主管护师职称考试 强化训练题集



第二军医大学出版社

主管护师职称考试强化训练题集

主 编：巫向前

编 委：(按姓氏笔划排列)

石钟美	张美琴	张静芬	陈 颖
陈林海	林怡倩	凌文惠	戴鸿英

第二军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

主管护师职称考试强化训练题集/巫向前主编. —上海:第二军医大学出版社, 2006. 2

ISBN 7-81060-579-8

I. 主… II. 巫… III. 护理学-资格考试-习题 IV. R 47-44

中国版本图书馆数据核字(2005)第 159470 号

责任编辑:王 勇

主管护师职称考试强化训练题集

主编 巫向前

第二军医大学出版社出版发行

上海市翔殷路 800 号 邮政编码:200433

发行科电话/传真:021-65493093

全国各地新华书店经销

句容市排印厂印刷

开本:787×1092 1/16 印张:29.75 字数:1090 千字

2006 年 2 月第 1 版 2006 年 2 月第 1 次印刷

ISBN 7-81060-579-8/R·440

定价:60.00 元

前 言

《主管护师职称考试强化训练题集》是根据卫生部考试中心编写的考试大纲和考试指南,由上海交通大学技术学院具有丰富教学经验的教授、副教授和讲师,结合近年来的相关考试题型和内容而编写的。旨在帮助护士在执业考试和初、中级职称晋升考试中取得好成绩。

本习题集适用于主管护师备考使用;包含内科护理学、外科护理学、妇产科护理学、儿科护理学、护理健康教育、社区护理、医院感染护理七个部分。

根据考试题型,本书将试题归纳为A型、B型、X型题三大类。A型题为最佳选择题,每题只有一个标准答案;B型题即配伍题,指若干组考题共同使用五个备选答案,从中选择一个最佳答案;X型题即多重选择题,每道试题有多个答案。本书每篇末备有参考答案,以便学员检验复习情况。

鉴于参编人员的水平和对考纲、教材的理解能力,本书试题虽经多年的累积、推敲和精选,但不当之处在所难免,恳请读者、专家批评、指正,以便再版时更正。

编 者
2005 年 11 月

目 录

第一篇 内科护理学	1
第一章 绪论	1
第二章 呼吸系统疾病病人的护理	2
第三章 循环系统疾病病人的护理	13
第四章 消化系统疾病病人的护理	23
第五章 泌尿系统疾病病人的护理	34
第六章 血液及造血系统疾病病人的护理	41
第七章 内分泌代谢性疾病病人的护理	48
第八章 风湿性疾病病人的护理	54
第九章 理化因素所致疾病病人的护理	58
第十章 传染病病人的护理	62
第十一章 神经系统疾病病人的护理	75
第二篇 外科护理学	82
第一章 绪论	82
第二章 外科病人水、电解质和酸碱平衡失调的护理	83
第三章 外科病人的营养支持及护理	87
第四章 外科休克病人的护理	88
第五章 外科感染病人的护理	90
第六章 外科疼痛病人的护理	93
第七章 外科重症病人的监护	94
第八章 麻醉	95
第九章 复苏	97
第十章 外科围手术期的护理	99
第十一章 手术室工作	102
第十二章 损伤病人的观察护理	103
第十三章 肿瘤病人的护理	108
第十四章 甲状腺疾病病人的护理	111
第十五章 乳腺疾病病人的护理	113
第十六章 腹部损伤病人的护理	116
第十七章 急性腹膜炎病人的护理	117
第十八章 胃、十二指肠疾病病人的护理	118
第十九章 急性阑尾炎病人的护理	120
第二十章 腹外疝病人的护理	121
第二十一章 肠疾病病人的护理	122
第二十二章 直肠、肛管疾病病人的护理	124

第二十三章	细菌性肝脓肿病人的护理	128
第二十四章	原发性肝癌病人的护理	129
第二十五章	门静脉高压病人的护理	131
第二十六章	胆道疾病病人的护理	133
第二十七章	胰腺疾病病人的护理	135
第二十八章	外周血管病病人的护理	138
第二十九章	颅内高压病人的护理	140
第三十章	颅脑损伤病人的护理	142
第三十一章	颅内肿瘤病人的护理	144
第三十二章	脑血管疾病病人的护理	145
第三十三章	脑部特殊检查治疗的护理	146
第三十四章	胸部损伤病人的护理	147
第三十五章	肺癌病人的护理	150
第三十六章	食管癌病人的护理	152
第三十七章	心脏外科病人的护理	154
第三十八章	泌尿系损伤病人的护理	158
第三十九章	肾及输尿管结石病人的护理	160
第四十章	肾结核病人的护理	162
第四十一章	前列腺增生症病人的护理	163
第四十二章	泌尿生殖系统肿瘤病人的护理	164
第四十三章	肾上腺疾病病人的护理	166
第四十四章	肾移植病人的护理	167
第四十五章	牵引病人的护理	168
第四十六章	石膏固定病人的护理	169
第四十七章	骨科病人的功能锻炼	170
第四十八章	常见四肢骨折病人的护理	171
第四十九章	脊椎损伤病人的护理	174
第五十章	腰腿痛病人的护理	175
第五十一章	颈椎病病人的护理	177
第五十二章	化脓性骨与关节感染病人的护理	179
第五十三章	骨与关节结核病人的护理	182
第五十四章	骨肿瘤病人的护理	185
第三篇	妇产科护理学	187
第一章	绪论	187
第二章	女性生殖系统解剖	188
第三章	女性生殖系统生理	192
第四章	妊娠生理	196
第五章	妊娠期妇女的监护和护理	202
第六章	分娩期妇女的护理	206
第七章	产褥期妇女的护理	211
第八章	高危妊娠母儿的护理	215

第九章 妊娠期并发症孕妇的护理	219
第十章 妊娠合并症孕产妇的护理	230
第十一章 异常分娩产妇的护理	236
第十二章 分娩期并发症产妇的护理	240
第十三章 产后并发症产妇的护理	245
第十四章 妇产科病历及检查护理	248
第十五章 外阴白色病变及外阴瘙痒	250
第十六章 女性生殖系统炎症病人的护理	251
第十七章 女性生殖器肿瘤病人的护理	256
第十八章 滋养细胞疾病病人的护理	263
第十九章 放疗、化疗病人的护理	266
第二十章 月经失调病人的护理	268
第二十一章 女性生殖器官损伤病人的护理	273
第二十二章 其他妇科疾病病人的护理	275
第二十三章 妇产科受术者的护理	277
第二十四章 计划生育妇女的护理	280
第二十五章 妇女保健	286
第四篇 儿科护理学	288
第一章 绪论	288
第二章 生长发育	289
第三章 儿童保健	294
第四章 健康小儿的营养	298
第五章 小儿疾病的治疗及护理	302
第六章 新生儿和患病新生儿的护理	303
第七章 营养性疾病患儿的护理	310
第八章 消化系统疾病患儿的护理	315
第九章 呼吸系统疾病患儿的护理	323
第十章 循环系统疾病患儿的护理	330
第十一章 造血系统疾病患儿的护理	335
第十二章 泌尿系统疾病患儿的护理	341
第十三章 内分泌系统疾病患儿的护理	347
第十四章 神经系统疾病患儿的护理	351
第十五章 免疫缺陷病和结缔组织病患儿的护理	356
第十六章 遗传代谢性疾病患儿的护理	359
第十七章 常见传染病患儿的护理	362
第十八章 结核病患儿的护理	368
第十九章 寄生虫病患儿的护理	373
第二十章 急性中毒和常见急症患儿的护理	374
第五篇 护理健康教育	381
第六篇 社区护理	386
第七篇 医院感染护理	391

模拟试题一(基础知识)	427
模拟试题二(相关专业知识)	433
模拟试题三(专业知识)	439
模拟试题四(实践能力)	445
参考答案	451

第一篇 内科护理学

第一章 绪 论

A 型题

1. 整体护理的涵义不包括 ()
 - A. 护理观察是以人为中心的护理
 - B. 护理是单纯照顾病人的生活和疾病
 - C. 护理服务对象是病人和健康人
 - D. 护理服务于人的生命全过程
 - E. 护理要面向社会,保持人和环境间的平衡
2. 护理理论的几个基本概念是 ()
 - A. 预防、治疗、护理、环境
 - B. 病人、健康、社会、护理
 - C. 人、环境、健康、社会
 - D. 病人、预防、治疗、护理
 - E. 人、环境、健康、护理
3. 现代护理学关于人和健康的概念不包括 ()
 - A. 人是单纯的生物体
 - B. 人是生理和心理的统一体
 - C. 人的健康是生理对自然环境的适应
 - D. 人的健康是心理对自然环境的适应
 - E. 人需要护理促进健康
4. 护理程序的基础是 ()
 - A. 病人估计
 - B. 护理诊断
 - C. 护理计划
 - D. 护理实施
 - E. 护理评价
5. 现代护理认为,护士与服务对象的关系应是 ()
 - A. 服务对象绝对服从护士
 - B. 护士绝对服从服务对象

- C. 服务对象与护士相互作用
- D. 服务对象与护士互不作用
- E. 服务对象选择性的作用护士

X 型题

6. 护理程序分以下几个步骤 ()
 - A. 评估
 - B. 诊断
 - C. 计划
 - D. 实施
 - E. 评价
7. 护理程序的特性有 ()
 - A. 为护理对象提供质量的整体护理
 - B. 护士需具备多学科知识
 - C. 护士需有良好的人际沟通能力
 - D. 护士具有创造性
 - E. 护士需有良好的合作能力
8. 对护理学性质描述错误的是 ()
 - A. 从事病人生活护理的科学
 - B. 从属于医疗的辅助性科学
 - C. 综合性应用科学
 - D. 医疗科学中的一门独立学科
 - E. 以操作为主的专门科学
9. 护理理论四个基本概念 ()
 - A. 人
 - B. 环境
 - C. 健康
 - D. 护理
 - E. 疾病

第二章 呼吸系统疾病病人的护理

A 型题

1. 上呼吸道对吸入气体的作用不包括 ()
A. 交换 B. 过滤
C. 湿化 D. 加温
E. 黏附
2. 呼吸系统疾病最常见的病因是 ()
A. 大气污染 B. 吸烟
C. 变态反应 D. 感染
E. 肿瘤
3. 肺的主要功能是 ()
A. 外呼吸 B. 湿化空气
C. 排痰 D. 气体交换
E. 以上都是
4. 正确肺循环是 ()
A. 右心室→肺动脉→肺毛血管→肺静脉→左心房
B. 左心房→肺动脉→肺毛血管→肺静脉→右心室
C. 左心房→肺静脉→肺动脉→肺毛血管→左心室
D. 右心室→肺静脉→肺动脉→肺毛血管→左心房
E. 以上都不是
5. 呼吸运动的化学调节是指动脉血或脑脊液中的下列哪些物质对呼吸的调节作用 ()
A. O_2 B. O_2, CO_2
C. O_2, CO_2, H^+ D. $PaCO_2$
E. PaO_2
6. 上呼吸道病变是指 ()
A. 咽部病变 B. 气管病变
C. 支气管病变 D. 喉以上部位病变
E. 气管以下部位病变
7. 呼吸系统疾病最常见症状是 ()
A. 咽痛 B. 咳嗽
C. 咯痰 D. 咯血
E. 呼吸困难
8. 咯脓臭痰常提示病人呼吸道有 ()
A. 病毒感染 B. 真菌感染
C. 化脓菌感染 D. 铜绿假单胞菌感染
E. 厌氧菌感染
9. 吸气性呼吸困难常见于 ()
A. 喉部气管病变 B. 支气管病变
C. 肺组织病变 D. 肺血管病变
E. 胸膜病变
10. 引起细菌性咽一扁桃体炎最主要的致病菌为 ()
A. 葡萄球菌 B. 溶血性链球菌
C. 肺炎球菌 D. 奈瑟球菌
E. 粪链球菌
11. 突然发作的吸气性呼吸困难最常见于 ()
A. 自发性气胸 B. 支气管哮喘
C. 肺心病 D. 气管内异物或梗阻
E. 阻塞性肺气肿
12. 关于急性上呼吸道感染的保健指导, 不正确的一项是 ()
A. 注意锻炼身体
B. 感冒流行季节尽可能少去公共场所
C. 接触病人时注意床边隔离, 以防交叉感染
D. 室内用食醋加热熏蒸
E. 增强机体耐寒能力
13. 治疗上呼吸道感染的措施, 下列哪项不妥 ()
A. 适当休息, 多饮水 B. 进半流质饮食
C. 作必要的对症处理 D. 中医药治疗
E. 常规应用抗菌药
14. 在呼吸道感染流行时为防止交叉感染, 接触病毒感染患者应 ()
A. 卧床休息 B. 对症处理
C. 中医中药治疗 D. 室内食醋熏蒸
E. 呼吸道隔离
15. 急性支气管炎的主要病因是 ()
A. 病毒或细菌感染 B. 吸入刺激性气体
C. 寒冷空气刺激 D. 过敏反应
E. 寄生虫感染
16. 慢性支气管炎最突出的症状是 ()
A. 长期反复咳嗽、咳痰
B. 胸痛 C. 喘息
D. 反复发热 E. 少量咳血
17. 慢性阻塞性肺病合并呼吸衰竭时, 用利尿剂治疗易发生哪种电解质及酸碱平衡紊乱 ()
A. 低钠血症 B. 高钾低氯血症
C. 低钙血症 D. 低钾、低氯血症、代谢性碱中毒
E. 高钙血症
18. 慢性支气管炎并发阻塞性肺气肿病人, 主要是在

- 原有症状的基础上出现 ()
- A. 反复发绀 B. 剧烈咳嗽
C. 咯多量脓痰 D. 经常感染发热
E. 逐渐加重的呼吸困难
19. 慢性支气管炎最常见的并发症是 ()
- A. 急性肺部感染 B. 支气管扩张
C. 阻塞性肺气肿 D. 慢性肺脓肿
E. 中毒性肺炎
20. 慢性阻塞性肺气肿最常见的病因是 ()
- A. 慢性支气管炎 B. 支气管肺炎
C. 支气管扩张症 D. 支气管哮喘
E. α_1 -抗胰蛋白酶不足
21. 关于慢性阻塞性肺气肿病人的护理,不正确的是 ()
- A. 避免不良气体刺激 B. 指导作腹式呼吸
C. 给予高浓度吸氧 D. 慎用镇静剂
E. 预防和治疗呼吸道感染
22. 慢性支气管炎发作时最重要的治疗是应用 ()
- A. 核酪 B. 抗生素
C. 祛痰镇咳药 D. 糖皮质激素
E. 支气管扩张剂
23. 不符合阻塞性肺气肿病人的肺功能检查结果是 ()
- A. 残气量增加 B. 动脉血氧分压降低
C. 最大通气量增加 D. 时间肺活量减少
E. 通气/血流比例小于 0.8
24. 慢性支气管炎的主要诊断依据是 ()
- A. 病史和临床表现 B. 肺功能测定
C. 痰液细菌学检查 D. X 线检查
E. 临床体征
25. 肺部叩诊呈过清音提示 ()
- A. 肺结核 B. 胸腔积液
C. 胃潴留 D. 气胸
E. 肺气肿
26. 诊断早期阻塞性肺气肿最有价值的一项是 ()
- A. 病史、体征 B. 肺功能测定
C. 痰菌培养 D. 血气分析
E. X 线检查
27. 重症哮喘发作时宜选用的药物是 ()
- A. 酮替芬 B. 氨茶碱
C. 喘定 D. 泼尼松
E. 布特他林
28. 重症哮喘病人禁用的药物是 ()
- A. 吗啡 B. 氨茶碱
C. 异丙肾上腺素 D. 肾上腺素
E. 色甘酸钠
29. 氨茶碱的严重不良反应是 ()
- A. 头痛、手指颤抖 B. 恶心、呕吐
C. 血压下降、甚至死亡
D. 心率加快 E. 嗜睡、胃肠道反应
30. 护理重症哮喘者时,下列哪项不妥 ()
- A. 守护在床边,加强心理护理
B. 安排舒适的半卧位或坐位
C. 给予低流量鼻导管吸氧
D. 勿勉强进食,限制水的摄入
E. 痰多黏稠者可作药物雾化
31. 支气管哮喘的临床表现,下列哪项是错误的 ()
- A. 呼气性呼吸困难 B. 两肺满布哮鸣音
C. 心浊音界缩小 D. 三凹征
E. 发绀
32. 支气管哮喘急性发作的首选药物是 ()
- A. β_2 肾上腺素受体兴奋剂
B. 黄嘌呤类药物 C. 色甘酸钠
D. 糖皮质激素 E. 酮替芬
33. 支气管哮喘与心源性哮喘的鉴别中有助于后者诊断的是 ()
- A. 注射氨茶碱后症状好转
B. 呼气性呼吸困难
C. 咳出粉红色的泡沫样痰
D. 肺部闻及哮鸣音
E. 肺部闻及湿啰音
34. 支气管哮喘与心源性哮喘不能鉴别时,宜选用的药是 ()
- A. 舒喘灵 B. 氨茶碱
C. 哌替啶 D. 地塞米松
E. 毒毛旋花子苷 K
35. 哮喘持续状态是指哮喘发作严重,持续多长时间以上 ()
- A. 6 小时 B. 12 小时
C. 24 小时 D. 48 小时
E. 72 小时
36. 护理哮喘持续状态病人时,不正确的是 ()
- A. 守护在床边,加强心理护理
B. 安排舒适的半卧位或坐位
C. 给予低流量鼻导管吸氧
D. 勿勉强进食,限制水的摄入
E. 痰多黏稠者可作药物雾化吸入
37. 对支气管哮喘病人作保健指导,错误的是 ()
- A. 居室应美化,适当放置花、草、地毯
B. 避免进食可能致敏的食物(如鱼、虾、蛋)
C. 避免刺激性气体吸入

- D. 避免过度劳累或情绪激动等诱发因素
E. 气候变化时注意保暖,避免呼吸道感染
38. 支气管哮喘的发作出现下列哪种呼吸困难 ()
A. 呼气性呼吸困难 B. 吸气性呼吸困难
C. 混合性呼吸困难 D. 劳力性呼吸困难
E. 夜间阵发性呼吸困难
39. 支气管哮喘发作时,听诊两肺有广泛哮鸣音,其原因是 ()
A. 肺泡间质水肿 B. 支气管平滑肌痉挛
C. 肺泡内分泌物增多
D. 支气管内黏稠分泌物增多
E. 支气管黏膜肿胀致支气管狭窄
40. 支气管哮喘发作的主要诊断依据是 ()
A. 端坐呼吸
B. X线胸片示双肺纹理增粗
C. 双肺可闻及干湿性啰音
D. 嗜酸性粒细胞增多
E. 反复发作带有哮鸣音、呼气性呼吸困难
41. 哮喘持续状态病人的护理不正确的是 ()
A. 保持有效吸氧
B. 保持呼吸道通畅
C. 加快输液速度,以纠正脱水,防止痰黏塞
D. 专人护理,消除病人紧张恐惧心理
E. 严密观察血压、脉搏、呼吸及神志的变化
42. 治疗支气管哮喘持续状态,需纠正酸中毒,其最主要临床意义是 ()
A. 增强抗生素疗效 B. 使痰液易咯出
C. 改善呼吸困难 D. 加强祛痰效果
E. 增强支气管解痉药疗效
43. 支气管扩张病人反复大咯血的主要原因是 ()
A. 肺动脉高压 B. 肺静脉高压
C. 支气管过度扩张
D. 支气管先天性发育缺损
E. 感染引起支气管内肉芽组织或血管瘤破裂
44. 支气管扩张病人如有厌氧菌感染,则痰的特征为 ()
A. 铁锈色 B. 胶冻样
C. 泡沫痰 D. 白色痰
E. 痰有恶臭
45. 支气管扩张病人的咳嗽特点为 ()
A. 晨起及晚上躺下时较重
B. 常出现刺激性干咳
C. 有时呈阵发性呛咳
D. 后期咳嗽加重并伴喘鸣声
E. 严重者出现呼吸困难
46. 支气管扩张病人体位引流合理的体位是 ()
A. 任何体位均可
B. 采取病人感觉舒适的体位
C. 患侧位于低处,引流支气管开口朝上
D. 患侧位于水平位,引流支气管开口水平位
E. 患侧位于高处,引流支气管开口朝下
47. 能确诊支气管扩张的检查是 ()
A. 胸部X光片 B. 胸部CT
C. 痰菌培养 D. 结核菌素试验
E. 痰脱落细胞检查
48. 防止支气管扩张感染关键在于 ()
A. 祛痰药 B. 注射疫苗
C. 使用支气管扩张剂
D. 加强呼吸道痰液引流
E. 选择广谱抗生素
49. 支气管扩张发生大咯血首要的护理措施是 ()
A. 保持呼吸道通畅 B. 静脉输液
C. 止血药的应用 D. 抗休克治疗
E. 持续吸氧
50. 肺炎球菌肺炎患者最具特征性的症状为 ()
A. 寒颤、高热 B. 呼吸困难
C. 胸痛 D. 咯铁锈色痰
E. 咳嗽
51. 肺炎球菌肺炎患者的热型常呈 ()
A. 稽留热 B. 弛张热
C. 间歇热 D. 波状热
E. 不规则热
52. 下列哪项提示肺炎球菌肺炎患者病情严重 ()
A. 症状、体征较为典型
B. 白细胞明显增多,中性粒细胞比例增高
C. 白细胞总数不高甚至降低,但中性粒细胞比例增高,核左移
D. 痰涂片或培养见肺炎球菌
E. X线检查见病部呈大片均匀、致密阴影
53. 治疗肺炎球菌肺炎常首选 ()
A. 青霉素 B. 头孢菌素
C. 氨苄青霉素 D. 磺胺嘧啶
E. 红霉素
54. 肺炎球菌肺炎的致病因素最主要的是 ()
A. 荚膜 B. 细菌的内毒素
C. 细菌的外毒素 D. 细菌迅速繁殖
E. 细菌有杀白细胞素
55. 肺炎球菌肺炎时产生的铁锈色痰最主要的原因是 ()
A. 痰内有大量红细胞
B. 痰内含大量脓细胞
C. 白细胞破坏时所产生的溶蛋白酶

- D. 红细胞破坏释放出含铁血黄素
E. 红细胞碎屑被巨噬细胞吞噬
56. 肺炎球菌肺炎病人胸痛特点,下列哪项不正确 ()
A. 呈尖锐的刺痛
B. 咳嗽和深呼吸时加剧
C. 迫使病人取健侧卧位
D. 少数病人可有胸、腹或肩部放射痛
E. 下胸部呼吸幅度较大的部位较明显
57. 关于革兰阴性杆菌肺炎特点,下列哪项是错误的 ()
A. 双侧下叶肺多受累
B. 肺实变或病变融合,坏死后易形成脓肿
C. 波及胸膜,可引起胸膜渗液或脓肿
D. 多为院外感染,病人原先为健康的青壮年人
E. 治疗时抗生素宜大剂量、长疗程、联合用药,静滴为主
58. 对肺炎链球菌肺炎的抗菌药物治疗正确的是 ()
A. 首选青霉素疗程 7~10 天
B. 首选青霉素疗程 10~14 天
C. 首选青霉素疗程 14~21 天
D. 首选红霉素疗程 7~14 天
E. 首选红霉素疗程 14~21 天
59. 军团肺炎抗菌治疗正确的方法是 ()
A. 首选红霉素疗程 7~14 天
B. 首选青霉素疗程 10~14 天
C. 首选青霉素疗程 14~21 天
D. 首选红霉素疗程 14~21 天
E. 首选红霉素疗程 21~28 天
60. 中毒性肺炎的抗休克治疗措施一般不包括 ()
A. 静滴低分子右旋糖酐
B. 应用强心药物
C. 滴注糖皮质激素
D. 使用碱性药物
E. 应用血管活性药物
61. 肺炎杆菌肺炎(肺炎克雷伯杆菌肺炎)的临床表现中具有特征的是 ()
A. 胸痛
B. 寒战、发热
C. 可闻干、湿性啰音
D. 红色胶冻状黏稠脓性痰
E. 胸片见模糊淡薄阴影
62. 对肺炎支原体肺炎的治疗首选 ()
A. 青霉素
B. 红霉素
C. 激素
D. 咪康唑
E. 甲硝唑
63. 肺炎球菌肺炎最重要的体征是 ()
A. 胸膜摩擦音
B. 面色发绀
C. 唇部疱疹
D. 气急、鼻翼扇动
E. 胸部实变体征和啰音
64. 治疗肺真菌病选用的药物是 ()
A. 两性霉素
B. 红霉素
C. 青霉素
D. 头孢菌素
E. 激素
65. 护士在观察中毒性肺炎病人时应特别注意 ()
A. 起病缓急
B. 体温高低
C. 呼吸困难程度
D. 有无末梢循环衰竭
E. 白细胞总数
66. 中毒性肺炎抗休克治疗的首要措施是 ()
A. 应用强心剂
B. 补充血容量
C. 纠正酸碱平衡失调
D. 应用血管活性药
E. 应用糖皮质激素
67. 提示中毒性肺炎病人病情严重的表现是 ()
A. 尿量增加
B. 烦躁不安
C. 体温升高
D. 脉搏加快
E. 血压下降
68. 急性肺脓肿的主要治疗措施是 ()
A. 早期手术治疗
B. 应用抗生素
C. 抗生素及痰液引流
D. 痰液引流
E. 补充营养
69. 肺结核咯血伴高热常提示 ()
A. 病灶扩散
B. 空洞形成
C. 支气管内血液吸收
D. 炎症波及壁层胸膜
E. 并发气胸
70. 下列肺结核病人的消毒隔离措施中,错误的一项是 ()
A. 做好呼吸道隔离
B. 剩余的饭菜煮沸后弃去
C. 痰液加等量的 1%过氧乙酸浸泡
D. 餐具洗涤后应煮沸 5 分钟
E. 病室每日用紫外线灯照射
71. 预防肺结核发生与流行的关键措施是 ()
A. 加强营养,增强体质
B. 接种卡介苗
C. 抗结核治疗
D. 做好痰的处理
E. 隔离病人及早有效地化疗
72. 肺结核病人痰菌阳性,下列说法错误的一项是 ()
A. 病灶具有活动性
B. 需要抗结核治疗
C. 需要接种卡介苗
D. 加强隔离制度
E. 加强营养
73. 肺结核病人痰液最简单有效的灭菌方法是 ()
A. 掩埋
B. 煮沸
C. 阳光下暴晒
D. 纸包后焚烧

- E. 1%过氧乙酸浸泡
74. 对肺结核疗效考核的最可靠方法是 ()
 A. X线检查 B. 痰菌检查
 C. 血沉检查 D. 结核菌素试验
 E. 体温、体重测量
75. 观察结核菌素试验正确的时间是 ()
 A. 6~12小时 B. 13~24小时
 C. 25~36小时 D. 37~47小时
 E. 48~72小时
76. 继发性肺结核不正确的是 ()
 A. 一般发生在曾受过结核感染的成年人
 B. 可通过内源性感染而来
 C. 可通过外源性感染而来
 D. 肺内局部组织炎症反应较轻
 E. 病灶多在肺尖
77. 继发肺结核好发于 ()
 A. 肺尖 B. 左肺上叶
 C. 左肺下叶 D. 右肺中叶
 E. 右肺下叶
78. 作结核菌素试验的主要目的是 ()
 A. 测定人体是否受过结核菌感染
 B. 诊断是否患有肺结核
 C. 判断结核有无活动性
 D. 增强机体对结核菌的免疫力
 E. 明确肺结核病人是否需隔离治疗
79. 未曾接种卡介苗的3岁以下儿童结合菌素试验强阳性,提示 ()
 A. 机体反应性差 B. 需接种卡介苗
 C. 患有活动性结核病
 D. 曾有结核菌感染
 E. 严重营养不良
80. 结核菌主要的传播途径是 ()
 A. 消化道 B. 泌尿道
 C. 生殖道 D. 呼吸道
 E. 皮肤接触
81. 早期诊断肺结核的主要方法是 ()
 A. 结核菌素试验 B. 痰结核菌检查
 C. 血液检查
 D. 纤维支气管镜检查
 E. X线检查
82. 继发性肺结核中最常见的类型为 ()
 A. 原发型肺结核 B. 血行播散型肺结核
 C. 浸润型肺结核
 D. 慢性纤维空洞型肺结核
 E. 结核性胸膜炎
83. 对肺结核病人进行病情观察时,发现下列何种情况提示病情较重,应加强护理 ()
 A. 低热盗汗,颧部潮红 B. 软弱疲乏,精神不振
 C. 食欲减退,体重减轻
 D. 胸闷不适,咳嗽咯痰
 E. 高热不退,脉搏快速,呼吸急促
84. 对肺结核咯血病人的病情观察,主要应密切注意 ()
 A. 体温变化 B. 脉搏变化
 C. 呼吸变化 D. 有无休克早期表现
 E. 有无窒息先兆表现
85. 可使人体产生对结核菌获得性免疫力的预防措施是 ()
 A. 进行卡介苗接种
 B. 普及结核病防治知识
 C. 及早发现并治疗病人
 D. 隔离病人,消毒衣物
 E. 加强锻炼,增强体质
86. 结核菌吸入人体后发生变态反应的时间是 ()
 A. 1周 B. 2周
 C. 3周 D. 4~8周
 E. 9~10周
87. 结核病化疗联用的主要目的 ()
 A. 减少并发症
 B. 避免发生耐药性,增加疗效
 C. 避免不良反应
 D. 可完全杀灭结核菌
 E. 缩短疗程
88. 肺癌早期的重要体征是 ()
 A. 呼吸加快 B. 语颤增强
 C. 叩诊呈浊音或实音
 D. 听到局限性喘鸣音,咳嗽后不消失
 E. 出现消瘦及恶液质
89. 肺癌早期特异性的表现是 ()
 A. 刺激性呛咳呈金属音
 B. 咯血 C. 胸痛
 D. 胸闷、气促 E. 发热、消瘦
90. 持续痰中带血最可能的疾病是 ()
 A. 支气管炎 B. 肺炎
 C. 肺气肿 D. 肺癌
 E. 心脏病
91. 与吸烟有密切关系,且是肺癌中恶性程度最高的一种应是 ()
 A. 鳞状上皮癌 B. 小细胞未分化癌
 C. 大细胞未分化癌 D. 腺癌
 E. 细支气管肺泡癌
92. 诊断支气管肺癌最可靠的手段是 ()

- A. 病史体征 B. 胸部 X 线检查
C. 支气管造影 D. 胸部 CT 检查
E. 纤维支气管镜检查
93. 肺癌患者出现声音嘶哑, 应考虑 ()
A. 压迫食管 B. 压迫颈交感神经
C. 压迫喉返神经 D. 压迫膈神经
E. 压迫上腔静脉
94. 按组织学分型, 支气管肺癌最常见的类型为 ()
A. 鳞状上皮细胞癌 B. 小细胞未分化癌
C. 大细胞未分化癌 D. 腺癌
E. 细支气管-肺泡细胞癌
95. 继发性气胸发生的原因可能为 ()
A. 继发于肺部疾病引起的肺气肿
B. 胸膜下微小的肺大泡破裂
C. 屏气用力或剧烈咳嗽
D. 从高压压的环境突然进入低气压环境
E. 持续正压人工呼吸时加压过高
96. 自发性气胸最常见的症状是 ()
A. 胸痛, 随之出现呼吸困难
B. 咯血 C. 咳嗽
D. 咯痰 E. 有休克征象
97. 张力性气胸的重要表现是 ()
A. 突发胸痛 B. 进行性呼吸困难
C. 干咳无痰 D. 出现发绀
E. 有休克征象
98. 下列哪项不符合气胸的体征 ()
A. 患侧胸廓饱满, 肋间隙增宽
B. 呼吸运动减弱 C. 语颤减弱或消失
D. 叩诊呈浊音 E. 呼吸音减弱或消失
99. 确诊气胸最可靠的依据是 ()
A. 有肺气肿病史
B. 在胸内压突然增高的情况下发病
C. 突然出现胸痛伴有呼吸困难
D. 有气胸体征
E. X 线检查见气胸征象
100. 下列哪项不是正压通气的禁忌证 ()
A. ARDS B. 大咯血
C. 重症肺大泡 D. 急性心肌梗死
E. 未经引流的气胸、纵隔气肿
101. 下列哪项不是机械通气的治疗作用 ()
A. 改善通气 B. 减少呼吸肌做功
C. 改善肺泡通气血流比例
D. 改善肺换气、血气比例
E. 改善真性动静脉分流
102. 测定自发性气胸类型(单纯性、交通性、张力性)最可靠的依据 ()
A. 有无循环衰竭 B. 胸部鼓音区的大小
C. 呼吸困难的程度 D. 气管移位的程度
E. 胸腔穿刺测压的动态观察
103. 自发性气胸最重要的处理 ()
A. 吸氧 B. 镇痛药
C. 马上手术治疗 D. 使用抗生素
E. 采取排气措施, 使肺复张
104. 不符合张力性气胸的表现是 ()
A. 呼吸急促 B. 呼吸音消失
C. 反常呼吸 D. 皮下气肿
E. 纵隔移位
105. 以下哪项不是特发性气胸的特征 ()
A. 多发生在瘦高的男青年
B. 有 COPD 病史
C. 常规胸部 X 线检查肺无明显异常
D. 胸内负压减小或为正压
E. 容易复发
106. 胸腔内压维持在 0 上下, 抽气后观察数分钟仍无变化, 是哪型气胸的特点 ()
A. 闭合性气胸 B. 交通性气胸
C. 张力性气胸 D. 特发性气胸
E. 高压性气胸
107. 慢性肺心病最常见的病因是 ()
A. 支气管扩张 B. COPD
C. 肺小动脉栓塞 D. IV 型肺结核
E. 严重的胸廓、脊柱畸形
108. 肺心病的形成与下列哪种因素关系最密切 ()
A. 肺血管床减少 B. 血液黏稠度升高
C. 血容量增多和二氧化碳潴留使肺血管收缩
D. 缺氧 E. 心脏代偿能力下降
109. 肺心病急性加重期的治疗关键是 ()
A. 低流量吸氧
B. 利用呼吸机改善呼吸功能
C. 强心、利尿
D. 积极控制感染、解除支气管痉挛、改善通气功能
E. 纠正电解质紊乱
110. 肺源性心脏病(肺心病)肺动脉高压形成的最主要因素是 ()
A. 继发性红细胞增多 B. 血液黏稠度增加
C. 血容量增加
D. 肺部毛细血管微小栓子形成
E. 缺氧及二氧化碳潴留引起肺小血管收缩痉挛
111. 肺心病的首要死亡原因是 ()
A. 休克 B. 肺性脑病

- C. 上消化道出血 D. 水、电解质平衡失调
E. 心律失常
112. 肺心病呼吸衰竭时应给予 ()
A. 高流量持续吸氧 B. 高流量间歇吸氧
C. 低流量间歇吸氧 D. 低流量持续吸氧
E. 低流量混有二氧化碳的氧吸入
113. 慢性肺心病急性加重期的最常见诱因 ()
A. 过劳 B. 大量利尿
C. 使用镇静剂 D. 呼吸道感染
E. 使用支气管扩张剂
114. 肺心病呼吸衰竭诊断主要根据 ()
A. 发绀、呼吸困难 B. 精神、神经症状
C. 二氧化碳结合力明显升高
D. $\text{PaCO}_2 > 50 \text{ mmHg}$, $\text{PaO}_2 < 60 \text{ mmHg}$
E. 肺通气功能明显减退
115. 慢性肺心病发生心力衰竭时, 治疗首选是 ()
A. 强心剂 B. 利尿剂
C. 血管扩张剂 D. 控制心律失常
E. 控制感染, 改善通气
116. 慢性肺心病急性加重期病人应慎用 ()
A. 抗生素 B. 祛痰剂
C. 平喘药 D. 镇静剂
E. 呼吸兴奋剂
117. 引起慢性呼吸衰竭最多见的病因是 ()
A. 心血管疾病 B. 支气管肺疾病
C. 神经肌肉疾病 D. 胸廓胸膜疾病
E. 成人呼吸窘迫综合征
118. 肺心病急性加重期的关键治疗措施是 ()
A. 改善呼吸功能 B. 控制呼吸道感染
C. 利尿减轻心负荷 D. 给洋地黄制剂
E. 控制心律失常
119. 慢性肺心病失代偿期的表现 ()
A. 肺动脉瓣区第二心音亢进
B. 右心室肥大 C. 呼吸音减弱
D. 嗜睡、神志恍惚 E. 肺部干湿啰音
120. 慢性肺心病失代偿期的治疗中心环节是 ()
A. 利尿 B. 祛痰
C. 控制感染 D. 改善通气
E. 纠正缺氧和二氧化碳潴留
121. 肺心病烦躁不安的病人需使用镇静剂时, 禁忌 ()
A. 哌替啶 B. 水合氯醛
C. 异丙嗪 D. 利眠宁
E. 安定
122. 呼吸衰竭病人最早出现的表现是 ()
A. 咳嗽 B. 发绀
C. 呼吸困难 D. 心率加快
E. 神志不清
123. 护士在给急性呼吸窘迫综合征病人氧气吸入时应采用 ()
A. 呼气末正压给氧 B. 持续低流量给氧
C. 间歇给氧 D. 高浓度给氧
E. 间歇高流量给氧
124. 慢性呼吸衰竭并发肺性脑病, 不宜吸高浓度氧的主要原因是 ()
A. 防止引起氧中毒
B. 缺氧不是主要的原因
C. 高浓度氧可降低颈内动脉窦化学感受器的兴奋性
D. 促使二氧化碳排出过快
E. 诱发代谢性碱中毒
125. 呼吸衰竭缺氧伴 CO_2 潴留患者不可能出现 ()
A. 呼吸深快 B. 发绀
C. 心率、血压变化 D. 皮肤干燥
E. 球结膜充血水肿
126. 观察呼吸困难患者时见到下列哪种情况提示病情垂危 ()
A. 呼吸频率加快 B. 呼吸频率减慢
C. 间停呼吸 D. 库氏呼吸
E. 浅快呼吸
127. 呼吸衰竭患者的病情观察, 下列哪项对发现肺性脑病先兆极为重要 ()
A. 皮肤及面部变化 B. 神志与精神变化
C. 呼吸变化 D. 心率与血压变化
E. 瞳孔变化
128. 下列哪项不是机械通气的治疗作用 ()
A. 改善通气 B. 减少呼吸肌做功
C. 改善肺泡通气/血流比例
D. 改善肺换气、血气比例
E. 改善真性动静脉分流
129. 呼吸衰竭时, 血液气体分析的诊断标准是 ()
A. $\text{PaO}_2 < 6.66 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 6.66 \text{ kPa}$
B. $\text{PaO}_2 < 7.99 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 6.66 \text{ kPa}$
C. $\text{PaO}_2 < 10.66 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 7.99 \text{ kPa}$
D. $\text{PaO}_2 < 7.99 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 7.99 \text{ kPa}$
E. $\text{PaO}_2 < 6.66 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 9.33 \text{ kPa}$
130. 纠正呼吸性酸中毒主要措施 ()
A. 静滴碱性药 B. 控制感染
C. 增加通气 D. 使用激素
E. 吸入高浓度氧
131. II型呼吸衰竭病人发生痰堵窒息时见于 ()
A. 翻身时 B. 分泌物干结时

- C. 气管切开后气囊滑脱
D. 食物误入气管 E. 呼吸器故障
132. 急性呼吸窘迫综合征目前主张及早采用的措施是 ()
A. 正压通气 B. 控制感染
C. 消除肺水肿 D. 肾上腺糖皮质激素
E. 以上均不是
133. 急性呼吸窘迫综合征病人,正确的体位是 ()
A. 平卧位 B. 俯卧位
C. 膝胸位 D. 端坐位
E. 侧位和半卧位
134. 呼吸衰竭患者给予充足热量及高蛋白、易消化、少刺激、富含维生素饮食的主要目的是 ()
A. 提高机体免疫力 B. 提高血浆胶体渗透压
C. 消除水肿 D. 改善肺功能
E. 防止产生氧的负平衡
135. 呼吸衰竭患者保持呼吸道通畅,维护呼吸功能的重要环节是 ()
A. 清除积痰 B. 加压吸氧
C. 使用呼吸兴奋剂 D. 控制呼吸道感染
E. 纠正酸碱平衡紊乱
136. 呼吸衰竭低氧血症伴高碳酸血症患者应用 ()
A. 高压吸氧 B. 酒精湿化吸氧
C. 间歇吸氧 D. 高浓度吸氧
E. 低流量、低浓度持续吸氧
137. 对呼吸衰竭患者采用低流量、低浓度持续吸氧的目的是为了 ()
A. 保持缺氧对呼吸中枢的刺激作用
B. 保持缺氧对颈动脉窦、主动脉体化学感受器的刺激作用
C. 保持 CO_2 对呼吸中枢的刺激作用
D. 保持 CO_2 对颈动脉窦、主动脉体化学感受器的刺激作用
E. 保持缺氧及 CO_2 对呼吸中枢的刺激作用
138. 动脉血液气体分析标本的采集方法,下列哪项不正确 ()
A. 选用 2 ml 干燥注射器
B. 先抽入少许经过稀释的肝素冲荡针筒后全部弃去
C. 在严格无菌操作下抽取动脉血 2 ml 左右
D. 拔出针头后立即送验
E. 需半小时内完成化验
139. 患者男性,70 岁,长期吸烟,2 个月来声音嘶哑,痰中带血,低热乏力,少量黏痰,血象正常,曾有结核病接触史,胸部 X 线检查左肺上野有一直径 3 cm 密度较高的球形阴影,最可能的诊断是 ()
A. 结核瘤 B. 炎性假瘤
C. 原发型中心性肺癌
D. 错构瘤 E. 淋巴瘤
140. 某青年患者,突然寒战,高热达 40°C ,伴有咳嗽、胸痛,2 小时前服阿司匹林,出大汗后热退,血压 10.6/6.5 kPa,脉搏 102 次/分,神志清,四肢暖,白细胞 $20 \times 10^9/\text{L}$,胸片为右上肺大片状阴影,呈段分布。诊断为 ()
A. 休克型肺炎 B. 葡萄球菌性肺炎
C. 克雷伯杆菌肺炎 D. 肺脓肿
E. 肺炎球菌性肺炎
141. 林先生,70 岁。慢性支气管炎、肺气肿病史多年,中午进餐时米粒呛入气管引起剧烈咳嗽后,突然呼吸困难,伴右胸痛,逐渐加重。最可能是 ()
A. 心肌梗死 B. 肺栓塞
C. 自发性气胸 D. 胸腔积液
E. 支气管阻塞
142. 张女士,65 岁,慢性咳嗽 10 年,近 3 年出现气喘,且逐渐加重。双肺散在哮鸣音。最可能的诊断是 ()
A. 慢性阻塞性肺气肿
B. 喘息型慢性支气管炎
C. 单纯型慢性支气管炎
D. 支气管哮喘 E. 支气管肺癌
143. 患者男性,50 岁,慢性支气管炎、肺气肿病史多年,于阵咳后突然出现呼吸困难,右胸痛,逐渐加重,最可能是 ()
A. 急性心肌梗死
B. 慢性支气管炎急性发作
C. 气胸 D. 支气管哮喘
E. 胸腔积液
144. 男性,50 岁,近半个月咳嗽,偶有血痰,伴乏力、低热,去年冬季曾有咳嗽、咯少许白痰 3 个月,经抗炎治疗症状消失。吸烟 20 年,1 包/日。查体:除体温 37.3°C 外均阴性。应首先考虑的诊断是 ()
A. 急性支气管炎 B. 慢性支气管炎
C. 支气管扩张 D. 肺癌
E. 肺结核
145. 20 岁,支气管哮喘患者,突然出现一侧胸痛,呼吸时加重,伴发绀、大汗,为明确诊断首先进行的检查是 ()
A. 心肺体检
B. 白细胞及分类,了解是否有感染
C. 心电图,除外心肌梗死