

家庭医疗保健

丛
书

JIATING
YILIAOBAOJIAN

CONGSHU



皮肤病

PIFUBING PIFUBING

主编：叶建洪 \ 广州出版社



家庭保健
JIATING
YILIAOBAOJIAN
CONGSHU

皮肤病

主编：叶建洪
广州出版社



图书在版编目(CIP)数据

皮肤病/叶建洪主编. —广州:广州出版社,2003. 5

(家庭医疗保健丛书. 第1辑)

ISBN 7 - 80655 - 510 - 2

I. 皮... II. 叶... III. 皮肤病—食物疗法

IV. R751. 05

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 035834 号

家庭医疗保健丛书(第一辑)·皮肤病

广州出版社出版发行

(地址:广州市人民中路同乐路 10 号 邮政编码:510121)

广东茂名广发印刷有限公司印刷

(地址:茂名市计星路 60 号 邮政编码:525000)

开本:850 × 1168 1/32 总字数:2400 千 总印张:118

印 数:1—5000 套

2003 年 5 月第 1 版 2003 年 5 月第 1 次印刷

责任编辑:何发斌

责任校对:陈宾杰 封面设计:郭 炜

发行专线:020 - 83793214 83780366

ISBN 7 - 80655 - 510 - 2/R · 79

总定价:162.00 元[全九册(软精装)]



出版前言

皮肤病是临床上的常见病、多发病，亦是难治之症。皮肤病严重影响人的身体健康，给广大患者带来痛苦。为了减轻广大患者的痛苦，本人参考了大量有关治疗皮肤病的专著并结合临床工作三十年治疗皮肤病的经验编成本书。目的是提高广大患者对皮肤病的认识，做好对皮肤病的防治，做到未病先防，既病防变，早诊断，早治疗。

本书共分三章：**第一章常见皮肤病的治疗；第二章皮肤病常用中药；第三章皮肤病经方验方。**重点在第一章常见皮肤病的治疗。全书除了论述皮肤病的临床表现外，还论及中西医的治疗，内治与外治相结合，内容丰富，方法多样，层次分明，重点突出，是一部比较全面的皮肤病著作。

限于时间和水平，书中欠妥之处在所难免，祈望广大读者不吝赐教！

编者
2003年4月

目 录

C O N T E N T S

第一章 常见皮肤病的治疗

第一 节 单纯疱疹	1	第十六 节 硬结性红斑	60
第二 节 带状疱疹	5	第十七 节 颜面粟粒性狼疮	
第三 节 水痘	11	63
第四 节 风疹	14	第十八 节 头癣	66
第五 节 传染性软疣	16	第十九 节 手足癣	69
第六 节 寻常疣	19	第二十 节 甲癣	73
第七 节 扁平疣	23	第二十一 节 体癣	76
第八 节 脓疱疮	27	第二十二 节 花斑癣	79
第九 节 頑疮	31	第二十三 节 癣菌疹	81
第十 节 毛囊炎	34	第二十四 节 鹅口疮	84
第十一 节 帀	39	第二十五 节 疥疮	88
第十二 节 痘	43	第二十六 节 蟲形螨病	91
第十三 节 丹毒	47	第二十七 节 蕈子	95
第十四 节 寻常狼疮	53	第二十八 节 冻疮	98
第十五 节 痰疬性皮肤结核	57	第二十九 节 接触性皮炎
			101

第三十节 湿疹	106	第五十节 化脓性汗腺炎	…
第三十一节 异位性皮炎	…	…	199
	112	第五十一节 痘	…
第三十二节 荨麻疹	117	第五十二节 虫咬皮炎	…
第三十三节 药物性皮炎	…	第五十三节 白癜风	…
	124	第五十四节 黑斑	…
第三十四节 神经性皮炎	…	第五十五节 天疱疮	…
	131	第五十六节 疣疹样皮炎	…
第三十五节 瘙痒病	136	…	220
第三十六节 结节性痒疹	…	第五十七节 硬皮病	…
	140	第五十八节 血管性水肿	…
第三十七节 银屑病	144	…	227
第三十八节 副银屑病	153	第五十九节 单纯性痒疹	…
第三十九节 玫瑰糠疹	156	…	229
第四十节 多形性红斑	…	第六十节 毛发红糠疹	…
	160	…	232
第四十一节 寻常痤疮	164	第六十一节 单纯糠疹	…
第四十二节 酒渣鼻	169	第六十二节 扁平苔藓	…
第四十三节 脂溢性皮炎	…	第六十三节 红皮病	…
	174	第六十四节 汗疱疹	…
第四十四节 斑秃	179	第六十五节 多汗症	…
第四十五节 臭汗症	183	第六十六节 口周皮炎	…
第四十六节 红斑狼疮	186	第六十七节 皮肌炎	…
第四十七节 多形性日光疹	…	第六十八节 系统性红斑性狼疮	…
	193	…	254
第四十八节 红斑性肢痛病	…	第六十九节 黄褐斑	…
	195	第七十节 雀斑	…
第四十九节 传染性湿疹样皮炎	…		268
	197		

第二章 皮肤病常用中药

荆芥	271	土茯苓	300
防风	272	白鲜皮	300
羌活	273	熊胆	301
白芷	274	白薇	302
葱白	275	大黄	303
薄荷	276	芦荟	306
浮萍	277	白花蛇	307
石膏	279	海桐皮	309
梔子	280	蚕砂	309
黄芩	281	滑石	310
黄连	283	茵陈蒿	311
黄柏	284	地肤子	312
龙胆草	286	萹蓄	313
苦参	287	地榆	314
金银花	288	白及	315
连翘	289	苎麻根	316
蒲公英	290	侧柏叶	317
紫花地丁	291	全蝎	318
大青叶	292	蜈蚣	319
青黛	294	白僵蚕	320
穿心莲	295	赤石脂	322
牛黄	296	冰片	323
蚤休	297	硫黄	324
半边莲	298	雄黄	326
垂盆草	299	砒石	327

轻粉	328	蛇床子	336
升药	330	露蜂房	338
铅丹	330	樟脑	339
炉甘石	331	大风子	340
硼砂	332	木槿皮	341
大蒜	333	守宫	342
蟾蜍	335		

第三章 皮肤病经方验方

水痘	344	疥疮及癣病	404
荨麻疹	347	脓疱疮	412
湿疹	357	黄褐斑	417
皮肤瘙痒症	368	疣	429
鹅掌风	375	红斑狼疮	434
带状疱疹	379	皮肌炎	438
银屑病	382	皮肤肿瘤	440
神经性皮炎	388	梅毒	441
脂溢性皮炎	394	淋病	443
白癜风	398	尖锐湿疣	444
痤疮	402		



第一章 常见皮肤病的治疗

第一节 单纯疱疹

本病由单纯疱疹病毒(HSV)导致。HSV分为两型,Ⅰ型主要侵犯口、鼻等皮肤粘膜交界处,Ⅱ型则主要侵犯生殖器。临床表现为所侵犯部位簇集成群的小水疱,病程短暂而易于复发,属中医“热疮”、“火燎疮”范畴。

一、临床表现

(一) 口唇疱疹

1. 口角、唇缘、鼻孔附近等皮肤粘膜交界处在红斑基础上簇集成群的小水疱,擦破后糜烂、渗液、结痂。
2. 皮损偶发于颜面或唇部。初起常先有灼热、发紧及瘙痒。
3. 常于发热、胃肠功能障碍或机体过度疲劳时发生。
4. 本病有自限性,约1~2周自愈。易复发。

(二) 生殖器疱疹

1. 多为HSVⅡ型导致,属性传播疾病。



2. 皮损好发于包皮、龟头、冠状沟、阴茎、大阴唇、宫颈等处，水疱易破溃、糜烂、形成浅溃疡，剧烈疼痛。可继发感染，易复发。
3. 孕妇易致流产、早产、畸胎和死胎。

二、组织病理

表皮细胞网状及气球样变性，其中可见有嗜酸性包涵体。表皮早期为多房性水疱，以后聚合为单房性水疱。真皮乳头层炎性细胞浸润，严重者可致急性血管类改变。

三、中医辨证治疗

肺胃风热型

〔证见〕皮疹发生于上部(如口角、唇缘、眼睑、鼻孔附近或面部等)，自觉轻度灼热和瘙痒，一般疼痛不明显，可伴有发热，倦怠不适，口干，舌尖边红，苔薄黄，脉浮数等。

〔治法〕疏风清热。

〔方药〕

1. 主方：辛夷花6克，枇杷叶、山梔子、知母各9克，桑叶、黄芩各12克，金银花、白菊花、连翘各15克，生石膏30克(先煎)，生甘草5克。水煎服，每日1剂。

2. 中成药

抗病毒口服液，口服，每次1支(10毫升)，每日3次，温开水送服。



肝胆经湿热型

〔证见〕皮疹发生于下部(主要发生于外生殖器部位,也有发生于臀部、肛门周围、大腿等部位)。自觉灼热、疼痛较明显。常伴口苦,咽干,口渴,烦躁易怒。小便黄赤,大便干结。舌质红,苔薄黄或黄腻,脉弦滑或弦数、弦滑数等。

〔治法〕泻肝火,利湿热。

〔方药〕

1. 主方:龙胆泻肝汤(李东垣方,录自《古今医方集成》)
加减

处方:龙胆草、山梔子、黃柏、车前子、泽泻各 12 克,柴胡、木通各 9 克,生甘草 5 克,生地黃、土茯苓、板蓝根各 30 克,生薏苡仁 15 克。水煎服,每日 1 剂。

2. 中成药

(1)龙胆泻肝丸,口服,每次 6 克,每日 3 次,温开水送服。

(2)抗病毒口服液,口服,每次 1 支(10 毫升),每日 3 次,温开水送服。

四、西医治疗

(一)全身治疗

1. 抗病毒:①万乃洛韦片 0.3 克,日 2 次口服;②无环鸟苷片 200 毫克,日 5 次口服;严重者可用无环鸟苷针 0.25 克,加入 5% 葡萄糖溶液 500 毫升中静滴,8 小时 1 次。

2. 促进免疫:①左旋咪唑 50 毫克,日 3 次口服,每周连服 3 天,间歇 11 天;②丙种球蛋白 3~6 毫升,每周 2 次肌肉注射;③



脊髓灰质类糖丸每周1丸，连服3周；④转移因子2毫升，每周2次肌注。

(二)局部治疗

1. 药物：①0.1% 无环鸟苷溶液或5% 无环鸟苷软膏外涂，日2~3次；②有渗液者，3%~4% 硼酸溶液湿敷，日2次。

2. 物理疗法：HeNe 激光或紫外线局部照射。

五、外治法

1. 皮损干燥或渗出较少者，青吹口散、玉露膏、金黄散油膏、黄连软膏等，任选一种外涂，日2~3次。多用于口唇疱疹。

2. 渗液多或糜烂溃疡者，10% 黄柏溶液或蒲公英、野菊花各30克煎水冷湿敷，1次20分钟，1日2次。多用于生殖器疱疹。

六、其他疗法

1. 梅花针疗法：常规消毒后，梅花针叩打患处至轻微渗血，1日1次。（山东中医杂志，1989;8(6):25）

2. 短波紫外线疗法：采用YS-II型体腔紫外线治疗机，波长253nm，红斑量，照射距离1cm。1日1次。（中华理疗杂志，1989;12(3):167）



第二节 带状疱疹

本病由水痘一带状疱疹病毒(VZV)引起。侵入人体的病毒,潜伏于脊神经或颅神经的感觉神经节的神经原中,在诱因作用下,病毒活动,引起疼痛及皮肤带状分布集簇的水疱。属中医“蛇串疮”、“蛇丹”、“缠腰火丹”、“蜘蛛疮”范畴。

一、临床表现

1. 炎性红斑上簇状水疱,粟粒至黄豆大小,各群皮疹之间可分为正常皮肤。皮疹偶可见大疱性、血疱性、坏疽性。
2. 皮疹沿外周神经呈单侧性带状分布,一般不超过正中线。好发于肋间神经支配区,亦可泛发。
3. 有不同程度的神经痛,或先痒后痛。老年患者疼痛较甚,其神经痛常持续1~2个月或更久。
4. 可伴有发热,邻近浅淋巴结肿大。
5. 病程2~3周,愈后极少复发。

二、组织病理

棘层细胞气球状变性,即棘层细胞变大,内含嗜酸性包涵体,皮肤深部毛囊的表皮细胞亦有气球状变性。



三、中医辨证治疗

肝胆火盛型

〔证见〕皮肤上出现红斑、簇集性水疱，自觉灼热疼痛，伴有口苦、咽干、口渴、烦躁易怒，小便黄赤，大便干结。舌质红，苔薄黄或黄腻，脉弦滑或弦数、弦滑数。

〔治法〕泻肝火，利湿热。

〔方药〕

1. 主方：龙胆泻肝汤（李东垣方，录自《古今医方集成》）加减

处方：龙胆草、黄芩、泽泻、车前子、大青叶各 12 克，柴胡、山梔子、木通各 9 克，生甘草 5 克，生地黄、板蓝根各 30 克。水煎服，每日 1 剂。

便秘者，加大黄 12 克（后下）。疼痛较甚者，酌加化瘀通络之品，如延胡索 9 克，乳香、没药各 6 克，丹参 15 克等，或三七末 3 克（冲服）。兼血热而出现血疱、坏死者，可加水牛角 30 克（先煎），牡丹皮、紫草各 12 克等。

2. 中成药

（1）龙胆泻肝丸，口服，每次 6 克，每日 3 次，温开水送服。

（2）抗病毒口服液，口服，每次 1 支（10 毫升），每日 3 次，温开水送服。



湿盛型

〔证见〕皮肤见淡红斑，水疱破溃，糜烂，渗液较多，伴有口不渴或渴不欲饮，纳呆，腹胀，大便溏。舌质淡红，苔白厚或白滑，脉濡缓。

〔治法〕清热解毒，健脾利湿，理气和中。

〔方药〕

1. 主方：除湿胃苓汤（吴谦等《医宗金鉴》）加减

处方：苍术、白术、厚朴、延胡索、木通各9克，车前子、泽泻各12克，滑石、土茯苓、板蓝根各30克，陈皮、生甘草各5克。水煎服，每日1剂。

疼痛较甚者，酌加乳香、没药各6克，丹参15克，或加三七末3克（冲服）。

2. 中成药

抗病毒口服液，口服，每次1支（10毫升），每日3次，温开水送服。

气滞血瘀型

〔证见〕皮疹大部或全部消退后，局部仍疼痛不止，伴有夜眠不宁，精神疲乏。舌质黯红，或舌尖边有瘀斑，苔白，脉弦。

〔治法〕活血化瘀，行气止痛。

〔方药〕

主方：柴胡疏肝散（张介宾《景岳全书》）加减

处方：柴胡、赤芍、枳壳、香附各12克，丹参15克，鸡血藤30



克，延胡索 9 克，川芎、陈皮、生甘草各 6 克。水煎服，每日 1 剂。

如疼痛较甚，舌有瘀斑者，加桃红、川红花各 9 克，三七末 3 克(冲)。

气血两虚型

[证见] 皮疹消退后仍疼痛日久者(主要见于老年患者)，伴有面色㿠白，气短，纳呆，神疲乏力，夜睡难寐。舌质淡，少苔，脉细或弦细。

[治法] 调补气血，重镇安神，佐以化瘀止痛。

[方药]

主方：八珍汤(薛己《正体类要》)加减

处方：党参 18 克，白芍、丹参各 15 克，白术、茯苓各 12 克，当归、川芍各 9 克，炙甘草 6 克，三七末 3 克(冲)，龙骨、牡蛎、珍珠母各 30 克(先煎)。水煎服，每日 1 剂。

四、西医治疗

(一) 全身治疗

1. 抗病毒：①无环鸟苷 5~10 毫克/千克，每 8 小时 1 次，静滴，7 天为 1 疗程；或万乃洛韦片 0.3 克，每日 2 次，连服 10 天。②病毒唑，每日 10~15 毫克/千克，分 2 次肌注或静滴，持续用药 7~10 天。③阿糖腺苷每日 10~15 毫克/千克，静注 10 天。④干扰素 40 万单位，每周 3 次，肌注。

2. 止痛

(1) 急性期：消炎痛 25 毫克，日 3 次口服；蝮蛇抗栓酶 0.01~0.02 毫克/日，加生理盐水 250 毫升静滴，每日 1 次，用 3~



5 天。

(2) 后遗神经痛: 多虑平 25 毫克, 日 3 次口服; 甲氯咪胍 0.2 克, 地塞米松 1.5 毫克, 赛庚啶 2 毫克, 日 3 次口服, 维生素 B₁₂ 100 微克每日 1 次肌注, 共用 10 天。

(3) 皮质类固醇激素: 用于起病早期, 采用强的松短疗程递减疗法, 疗程 10 ~ 12 天。

(二) 局部治疗

1. 酞丁胺擦剂或炉甘石洗剂外搽, 1 日 3 ~ 5 次。糜烂者涂 2% 龙胆紫溶液或涂新霉素糠馏油糊剂。

2. 紫外线照射, 音频电疗, 激光照射(氦一氖或 CO₂, 扩束照射), TDP 频谱照射等, 可选择运用。

3. 局部神经组织封闭治疗后遗神经痛: 2% 利多卡因 5 毫升, 维生素 B₁ 200 毫克, 维生素 B₁₂ 500 微克, 氟美松 4 ~ 5 毫克, 隔日 1 次, 沿神经进行阻滞。

五、外治法

一般不宜挑破水疱。

1. 水疱未破者, 可用双柏散、青黛散、金黄散或二味拔毒散, 冷开水调搽; 可用紫金锭与云南白药各半, 冷开水调搽; 也可用五妙水仙膏点涂。

2. 水疱已破糜烂者, 可用青黛散油外涂, 也可外涂 2% 龙胆紫溶液。

3. 个别患者渗液较多者, 可用板蓝根、银花叶、木贼、虎杖、野菊花、黄柏各 30 克, 煎水待冷湿敷。