



权威 • 全面

国家执业药师资格考试

药学综合知识与技能

仿真试卷及详解

编写 / 本书编委会

药学综合知识与技能仿真试卷及详解由多年从事教学、考前培训、再教育的老师根据切身经验，模拟历年真题精心设计而成。针对每个习题都有相应答案，通过解答的横纵向延伸，考生能掌握多个知识点。

希望考生经过认真的考前复习，结合多年实际工作经验，顺利通过考试！

中国医药科技出版社



本套丛书由具有多年考前辅导经验的专家组执笔，按照考试真题要求设计，内容紧扣新版考试大纲，重点突出，“考试点”覆盖率高，提供试题详解，总结答题规律，使应试者在有限的时间内，有的放矢，准确把握要点和考点，熟悉和掌握教材中的大部分知识，对顺利通过执业药师资格考试有重要的帮助。

中国医药科技出版社
北京市海淀区文慧园北路甲22号
100088
010-62244206
787 × 1092mm 1/16
www.cspyp.cn www.mpsky.com.cn
2006年6月第1版
2006年6月第1次印刷
廊坊市海翔印刷有限公司
全国各地新华书店
ISBN 7-5067-3443-5/G · 0499
26.00元
本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

药 学 综 合 知 识 与 技 能

仿真试卷及详解

图书在版编目(CIP)数据


国家执业药师资格考试药学综合知识与技能仿真试卷及详解/《国家执业药师资格考试药学综合知识与技能仿真试卷及详解》编委会编写. —北京: 中国医药科技出版社, 2006.6

ISBN 7-5067-3443-5

I. 国... II. 国... III. 药理学-药剂人员-资格考试-习题 R9-44 IV.

中国版本图书馆CIP数据核字(2006)第061388号

ISBN 7-5067-3443-5



9 787506 734431 >

ISBN 7-5067-3443-5
定价: 26.00元

应考人员注意事项

本试卷科目代码为“4”，考生务必将此代码填涂在答题卡“科目代码”相应的栏目内；否则，无法评分。

本试卷 140 题，全卷连续编号。请按题型指导语选择正确答案，并按题号在答题卡上将所选选项对应的字母用 2B 铅笔涂黑。

在试卷上作答无效。

药学·综合

国家执业药师资格考试

药学综合知识与技能

仿真试卷一

一、A型题（最佳选择题）共40题，每题1分。每题的备选答案中只有一个最佳答案。

1. 药品说明书的核心部分是

- A. 药物相互作用
- B. 适应证
- C. 用法用量
- D. 药品通用名称
- E. 注意事项

2. 以下关于药品有效期的说法不正确的是

- A. 药品说明书未标明有效期的按劣药论处
- B. 药品有效期是涉及药品稳定性和使用安全的标识
- C. 药品有效期具有法律效力
- D. 药品有效期是药品在一定贮存条件下能够保证质量的期限
- E. 通过实验研究后可对有效期进行修改

3. 处方组成包括

- A. 患者姓名、性别、年龄、科别、病历号
- B. 医疗机构名称、患者姓名、药品名、剂型、规格、数量、用法
- C. 处方前记、处方正文和处方后记三个部分
- D. 患者姓名、药品名、医师和药师签字
- E. 医院名称、患者姓名、药品名、处方医师签字

4. “每天”的外文缩写是

- A. q.n.
- B. q.s.
- C. q.i.d.
- D. q.h
- E. q.d.

5. 按规定，一般处方限量为

- A. 一日量
- B. 三日量
- C. 五日量
- D. 七日量
- E. 二日量

6. 老年人用卡那霉素时应谨慎，主要因为

- A. 老年人肝血流量减少、肝功能下降，从而使血药浓度升高
- B. 老年人血浆蛋白含量降低
- C. 老年人体内水分少、药物分布容积降低
- D. 老年人肾功能降低，药物半衰期延长，耳、肾毒性增加
- E. 老年人易产生肺毒性反应

7. 下列关于儿童用药的特点，哪项说法是正确的

- A. 体表面积比成人相对较大、皮肤角化层薄、局部用药要防止吸收中毒

- B. 早产儿脂肪含量低，脂溶性药物能与其充分结合
 C. 新生儿酶系完备，用药不必考虑肝酶成熟情况
 D. 新生儿肾血流量及肾小球滤过率较成人为高，故药物廓清率也高
 E. 儿童新陈代谢旺盛、药物排泄快，因此可长期大量应用酸碱类药物
8. 药物在乳汁中排泄不受下列哪种因素影响
 A. 药物的分子量 B. 药物的剂型 C. 药物与母体浆蛋白结合率
 D. 药物的离解度 E. 药物的酸碱度
9. 使左旋多巴疗效下降的是
 A. 高蛋白饮食 B. 低蛋白饮食 C. 高糖饮食
 D. 低糖饮食 E. 低盐白饮食
10. 下列哪一种是药酶抑制剂
 A. 苯巴比妥 B. 利福平 C. 苯妥英钠
 D. 保泰松 E. 帕吉林（优降宁）
11. 何种途径给药可产生首过作用
 A. 口服 B. 鼻内滴入 C. 静脉注射
 D. 舌下含服 E. 气雾吸入
12. 下列哪一项不是病人缺乏依从性的后果
 A. 导致治疗失败 B. 药物对照研究中干扰临床试验结果
 C. 造成严重中毒 D. 危及生命安全
 E. 简化治疗方案
13. 合理用药的临床基础是
 A. 正确调配 B. 正确诊断 C. 正确服药
 D. 严格审方 E. 正确给药
14. A 型药物不良反应的特点不包括
 A. 死亡率高 B. 发生率高 C. 可以预测
 D. 与给药剂量有关 E. 常规毒理学筛选可以发现
15. 药师在合理用药中的作用不包括
 A. 提供信息 B. 提出建议 C. 药物治疗监测
 D. 参与诊断 E. 宣传教育
16. 不合理用药的具体表现之一为

- A. 收受药品回扣 B. 使用过期药品 C. 无适应证用药
D. 发生药物不良反应 E. 审查处方不严格
17. 下列哪种药不用于苯二氮草类药物中毒的解救药
A. 抗生素 B. 回苏灵 C. 氟马西尼
D. 尼可刹米 E. 亚甲蓝
18. 特殊解毒剂使用时应注意
A. 抓紧时间，越早使用越好
B. 不宜太早使用解毒剂，应先注意观察病情
C. 注意剂量，剂量越大越好
D. 为避免解毒剂引起中毒，尽量少用解毒剂
E. 了解解毒剂的适应证和禁忌证，根据不同情况掌握使用
19. 下面属于药物经济学评价中表示用药效果的指标是
A. 发病率 B. 病人满意程度 C. 病人的舒适程度
D. 与健康相关的生活质量 E. 净收益
20. 社会在实施某一药物治疗方案过程中所投入的下列资源属于间接成本的是
A. 医生的时间 B. 医生的工资
C. 劳动力降低或丧失带来的经济损失 D. 病人的差旅费
E. 因病引起的疼痛
21. 用药方案复杂，最易对哪些人引起不依从性
A. 儿童 B. 少年 C. 青年
D. 壮年 E. 老年
22. 下列哪项不是治疗药物监测的意义
A. 促进临床合理用药 B. 控制药品质量 C. 为新药研制提供依据
D. 为老药改进提供依据 E. 提高医院的经济效益
23. 非处方药的遴选原则不包括
A. 应用安全 B. 疗效确切 C. 质量稳定
D. 慎重从严 E. 使用方便
24. 药品批准文号前注有 J 者为
A. 化学药 B. 辅料 C. 进口分装药品
D. 新生物制品 E. 化学药仿制药

25. 苯二氮革类镇静催眠药的特异性治疗药物是
A. 去甲肾上腺素 B. 尼克刹米 C. 氟马西尼
D. 回苏灵 E. 硫酸钠
26. 甲类非处方药专有标识为
A. 绿色 B. 红色 C. 黄色
D. 蓝色 E. 白色
27. 在药品经营企业中，库保管员填报有效期商品催销表时应做到
A. 每周填报 B. 每半月填报 C. 按月填报
D. 每 2 个月填报 E. 按季填报
28. 易于挥发（逸散）的药品是
A. 氢氧化钠 B. 薄荷脑 C. 碘化钾
D. 乙酰水杨酸 E. 氯化铵
29. 按一类精神药品管理的药品是
A. 盐酸二氢埃托啡片 B. 枸橼酸芬太尼针 C. 美沙酮片
D. 马吲哚片 E. 盐酸吗啡片
30. 给药个体化的步骤中确定初始给药方案的人是
A. 临床医师 B. 临床药师 C. 执业药师
D. 临床医师和临床药师 E. 临床药师和执业药师
31. 第一批公布的国家非处方药规定全部按
A. 乙类非处方药管理 B. 甲类非处方药管理
C. 甲类和乙类两类非处方药管理 D. 按一般处方药管理
E. 按“受限药”管理
32. 按非处方药的管理，哪一条是错误的
A. 不需要凭执业医师处方即可自行判断购买和使用的药品
B. 其标签说明书必须注有国家指定的非处方药专有标识
C. 医疗机构根据医疗需要可以销售使用非处方药
D. 可以在大众传播媒介进行广告宣传
E. 零售乙类非处方药的企业，必须具有《药品经营企业许可证》
33. 2000 年世界卫生组织（WHO）提出卫生保健目标是
A. 强制推行新的医疗保险制度
B. 采取国家、社会和个人共同分担医疗保健费

- C. 通过自我药疗来实现
D. 人人享有卫生保健
E. 提高自我负责精神和自我保健素质
34. 哪一项不是药学信息系统服务质量指标
A. 可靠 B. 及时 C. 先进
D. 普及 E. 新颖
35. 药学信息管理的方法不包括
A. 要对 DI 进行分类 B. 做好编目与索引 C. 把资料输入计算机
D. 统计工作量, 计次收费 E. 建规立制, 正常运行
36. 若某药的成人剂量是每次 500mg, 那么一个体重 35kg 的儿童按体表面积计算每次服用剂量为
A. 350mg B. 250mg C. 300mg
D. 400mg E. 150mg
37. 处方的调配原则不包括
A. 调配处方必须经过核对
B. 对方所列药品不得擅自更改或代用
C. 对有配伍禁忌或者超剂量的地方, 应当拒绝调配
D. 必须详细询问患者的病史及用药史
E. 必要时, 经处方医师更正或者重新签字, 方可调配
38. 以下说法不正确的是
A. 用药时应力求应用得当, 趋利避害
B. 用药是指病人服用药物的过程
C. 合理用药的含义包括安全、有效、经济、适当地用药
D. 病人的依从性与药物使用是否方便、不良反应轻重等因素有关
E. 合理用药的意义和目的就是要充分发挥药物的作用
39. 属于降低毒性和减少副作用的联合用药是
A. 青霉素类与氨基糖苷类抗生素合用
B. 普萘洛尔与氨酰心安联合应用治疗高血压
C. 异烟肼与维生素 B₆ 合用
D. 依那普利与格列齐特联合应用
E. 利福平和乙胺丁醇联合应用
40. 退货记录应保存____年备查

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

二、B 型题（配伍选择题）共 80 题，每题 0.5 分。备选答案在前，试题在后，每组若干题。每组题均对应同一组备选答案，每题只有一个正确答案。每个备选答案可重复选用，也可不选用。

[41 ~ 45]

A. 防止药物滥用和贵重药品丢失

B. 保证分装准确无误

C. 保证发药正确率，提高医师和药师的业务水平

D. 保证药品质量和效率

E. 考核审查工作质量和效率

处方调配的有关管理制度中

41. 差错登记制度是为了

42. 特殊药品和贵重药品管理制度是为了

43. 查对制度是为了

44. 岗位责任制是为了

45. 药品分装制度是为了

[46 ~ 49]

A. 泻药与雌激素

B. 喹诺酮类抗生素

C. 四环素类抗生素

D. 氨基糖苷类抗生素

E. 适量的维生素、铁、钙等

46. 妊娠头 3 个月，可以使用的是

47. 在饭前半小时服用的是

48. 小儿服用后可能引致骨骼损伤的是

49. 对正常妇女月经期有影响的是

[50 ~ 54]

A. 选用药物不当

B. 合并用药不当

C. 用药过量

D. 重复用药

E. 无必要地使用价格昂贵的药品

50. 病毒性感冒使用抗生素的现象属于

51. 丁胺卡那霉素与庆大霉素联合应用属于

52. 给儿童长期服用成人剂量的维生素 A 属于

53. 类风湿性关节炎首选青霉素属于

54. 多西环素（强力霉素）与四环素联合应用属于

[55 ~ 59]

A. 药物因素

B. 药师因素

C. 护士因素

D. 病人因素

E. 医师因素

55. 混合静脉注射时未注意配伍禁忌，是造成不合理用药的

56. 未向病人交待用药方法, 是造成不合理用药的
57. 急于解除病痛自选择撤换药品, 是造成不合理用药的
58. 违反治疗原则开大处方, 是造成不合理用药的
59. 药物治疗决策失当, 是造成不合理用药的

[60~63]

- | | | |
|--------|--------|--------|
| A. 1 年 | B. 2 年 | C. 3 年 |
| D. 4 年 | E. 5 年 | |

60. 麻黄素单方制剂处方留存
61. 毒性药品处方留存
62. 一类精神药品处方留存
63. 麻醉药品处方留存

[64~68]

- | | | |
|-----------|-----------|-----------|
| A. 急诊处方 | B. 慢性疾病处方 | C. 精神药品处方 |
| D. 麻醉药品处方 | E. 一般药品处方 | |

64. 粉红色的处方是
65. 应增加诊断项的是
66. 3 日内有效的是
67. 保存 3 年的是
68. 淡黄色的处方是

[69~73]

关于药品名称

- | | | |
|-----------|--------|--------|
| A. 通用名称 | B. 习用名 | C. 商品名 |
| D. 国际非专利名 | E. 化学名 | |

69. 利复星为
70. 氟哌酸为
71. 头孢氨苄为
72. 苯唑西林钠为
73. 左旋氧氟沙星

[74~78]

- | | | |
|-----------|--------|---------|
| A. 硫酸钠 | B. 松节油 | C. 阿司匹林 |
| D. 氢氧化铝凝胶 | E. 滑石粉 | |

74. 易被空气中的氧所氧化而变色的药品为
75. 易发生冻结的药品为
76. 具有吸附性的药品为
77. 易吸潮而水解变质的药品为

78. 易风化的药品为

[79 ~ 80]

A. 格列齐特

B. 苯海索

C. 丙咪嗪

D. 氯苯那敏

E. 甲基多巴

79. 降血糖的药是

80. 抗抑郁的药是

[81 ~ 82]

A. 庆大霉素

B. 阿米卡星

C. 妥布霉素

D. 四环素

E. 链霉素

81. Gentamycin 是

82. Tobramycin 是

[83 ~ 85]

A. 盐酸异丙嗪

B. 马来酸氯苯那敏

C. 盐酸苯海拉明

D. 茶苯海明

E. 盐酸地芬尼多

83. 用于过敏、镇静，但青光眼、癫痫、甲亢患者应慎用的是

84. 用于防治晕车、晕船、晕机，但青光眼、胃溃疡、妊娠、心动过速者应慎用的是

85. 用于防治晕车、晕船、晕机，但勿与地西泮和酒精同用，孕妇、新生儿禁用的是

[86 ~ 90]

A. 处方前记

B. 处方正文

C. 处方后记

D. 协定处方

E. 法定处方

86. 局颁标准收录的处方属

87. 药品名称、剂型、规格属

88. 发药日期属

89. 临床诊断属

90. 药品单价和总计金额通常属

[91 ~ 95]

老年人用药

A. 镇静安眠药

B. 解热镇痛药

C. 降压药

D. β 受体阻滞剂

E. 抗心绞痛药

91. 可诱发或加重青光眼的是

92. 易引起神经系统抑制的是

93. 可致心动过缓、心脏停搏的是

94. 可导致大汗淋漓，甚至发生虚脱的是

95. 可诱发哮喘，加重心衰的是

[96 ~ 100]

- A. 氢氯噻嗪 B. 维拉帕米 C. 洛沙坦
D. 阿替洛尔 E. 依那普利

96. 适用于一二级高血压，尤其是老年高血压或并发心衰者
97. 适用于各级高血压，尤其是老年高血压或合并稳定型心绞痛患者
98. 适用于一二级高血压，尤其是静息时心率较快的中毒患者或合并心绞痛者
99. 适应证与 ACEI 相同，用于不能耐受 ACEI 的患者
100. 适用于高血压合并糖尿病或并发心脏功能不全、肾损害且有蛋白尿的患者

[101 ~ 105]

- A. 首过效应 B. 酶促作用 C. 相加作用
D. 诱导肝微粒体氧化酶 E. 生成难溶性化合物

101. 长期饮酒（每天超过 200g）可影响药效的原因是
102. 用镇痛新的过程中，大量吸烟而使镇痛新的药效降低的原因是
103. 服用华法林的同时吃大蒜，引起出血的原因是
104. 服用特非那定的同时喝胡柚的果汁，会造成心律失常患者死亡的原因是
105. 服用补血药的同时喝大量茶，会使补血剂失效的原因是

[106 ~ 110]

- A. 最小成本分析 B. 成本效果分析 C. 成本效用分析
D. 回顾性研究 E. 成本效益分析

106. 其结果以单位健康效果增加所需成本值表示的方法是
107. 常用单位是生命质量调整年的方法是
108. 研究前提要求药物效果完全相同的方法是
109. 是成本效果分析的一种特例的方法是
110. 其结果用净效益来表示的方法是

[111 ~ 115]

- A. 醛类镇静催眠药中毒 B. 氨基甲酸酯类中毒
C. 二巯代氨基甲酸酯类中毒 D. 磷化锌、磷化铝、磷化钙等中毒
E. 麻醉性镇痛药中毒

111. 中毒期间禁食油脂类饮食及饮酒的是
112. 救治期间禁用中枢兴奋剂的是
113. 禁用解磷定、氯磷定等解毒剂的是
114. 禁用胆碱酯酶复活剂的是
115. 禁用肾上腺素的是

[116 ~ 120]

药物动力学的几个重要参数表示符号

A. K

B. K_a

C. F

D. V

E. $t_{1/2}$

116. 消除速率常数为

117. 吸收分数为

118. 生物半衰期为

119. 表观分布容积为

120. 吸收速率常数为

三、X 型题（多项选择题）共 20 题，每题 1 分。每题的备选答案中有 2 个或 2 个以上正确答案。少选或多选均不得分。

121. 《麻黄素管理办法》所指麻黄素管理品种为

A. 盐酸伪麻黄素

B. 消旋盐酸麻黄素

C. 麻黄流浸膏

D. 盐酸麻黄素片

E. 盐酸麻黄素注射液

122. 第一阶梯镇痛用药推荐使用

A. 曲马多

B. 吲哚美辛

C. 美沙酮

D. 对乙酰氨基酚

E. 右丙氧酚

123. 我国目前常用精神药品有

A. 氨酚待因

B. 苯妥英钠

C. 艾司唑仑

D. 三唑仑

E. 卡比多巴

124. 下列哪几种是哺乳期妇女应完全避免使用的药物

A. 异烟肼

B. 卡那霉素

C. 青霉素

D. 红霉素

E. 维生素 C

125. 弱酸性药物在碱性尿中

A. 解离度大

B. 解离度小

C. 重吸收少

D. 重吸收多

E. 排泄量减少

126. 下列药物中描述 ACEI 作用特点的有

A. 多数药物为前体药物，生物利用度低

B. 不会引起干咳和血管神经性水肿

C. 其中含有巯基类时心脏选择性强，还有改善胰岛素抵抗作用

D. 全部经肾脏排泄，肝功能不直接影响其药物活性

E. 可以阻滞血管紧张素 II 受体，从而产生降压作用

127. 下列哪几种属于已知致畸的药物

- A. 甲氨蝶呤
- B. 对乙酰氨基酚
- C. 苯妥英钠
- D. 雄激素类
- E. 己烯雌

128. 促进合理用药的措施有

- A. 推行基本药物政策
- B. 开展用药监护
- C. 加强药品上市后的再评价工作
- D. 发挥执业药师的作用
- E. 进行药物流行病学研究

129. 口服氨基甲酸酯类、有机氟类灭鼠药中毒时, 共同的解救方法有

- A. 给予硫酸阿托品
- B. 洗胃
- C. 导泻
- D. 洗胃后饮用牛奶
- E. 口服钙盐

130. 药品说明书中, 关于标明药品成分的说法不正确的是

- A. 列出制剂中所含有的各种辅料成分
- B. 所有药品必须列出化学名称
- C. 复方制剂必须列出所含活性成分及其名称
- D. 中药复方制剂主要药味排序要符合中医君、臣、佐、使组方原则
- E. 中药的主要成分是处方中所含的主要药味、有效部位或有效成分

131. 非处方药与自我药疗在全民卫生保健中的作用

- A. 增强人民群众的健康意识
- B. 加快了医疗卫生制度改革
- C. 方便了广大群众购买药品
- D. 提高了民众科学文化素质
- E. 加速了执业药师队伍建设

132. 需凭《麻醉药品购用印签卡》购置的是

- A. 麻黄素单方制剂
- B. 供医疗配方用小包装麻黄素
- C. 福尔可定片
- D. 安钠咖粉
- E. 磷酸可待因糖浆

133. 药品上市前的临床研究过程中常受到哪些人为因素的限制

- A. 病例较少
- B. 试验条件控制不严
- C. 研究时间较短
- D. 试验对象年龄范围窄
- E. 研究目的单纯

134. 销售处方药和非处方药

- A. 不得采用有奖销售
- B. 不得采用附赠药品
- C. 暂不允许网上销售
- D. 不得进行广告宣传
- E. 不得采用附赠礼品

135. 药物经济学在控制药品费用方面的作用体现在
- A. 可指导厂家研制更多的成本效果好的药品
 - B. 用于制订《国家基本药物目录》
 - C. 帮助医院制定医院用药目录, 规范医生用药
 - D. 扩大药物的适用范围
 - E. 帮助病人选择便宜药物
136. 实施自我治疗的内容包括
- A. 自我药疗
 - B. 自我检测
 - C. 自我诊断
 - D. 自我安慰
 - E. 自我理疗
137. 药学信息的特点是
- A. 内容广泛多样
 - B. 信息传递快速
 - C. 必须去伪存真
 - D. 紧密结合临床
 - E. 容易区分
138. 关于药物在乳汁中排泄的说法错误的是
- A. 只有在母体血浆中处于游离状态的药物才能进入乳汁
 - B. 离解度越低, 乳汁中药物浓度越高
 - C. 在脂肪和水中都有一定的溶解度的物质较难通过细胞膜
 - D. 乳母用药后药物进入乳汁, 一般不至于给乳儿带来危害
 - E. 弱酸性药物在乳汁中较难排泄
139. 下面关于药物经济学的基本概念理解正确的是
- A. 药物经济学泛指西方经济学在药物治疗评价上的应用
 - B. 药物经济学分析的范围包括: 不同的药物治疗方案, 药物治疗方案与其他方案以及不同医疗或社会服务项目
 - C. 药物经济学的成本包括直接成本、间接成本和隐性成本
 - D. 隐性成本是指由于伤病或死亡所造成的工资损失
 - E. 药物经济学评价的用药结果主要有: 效果、效益和效用
140. 一次性使用注射器选购和使用注意事项包括
- A. 查看包装有无“无菌”、“无热源”、“一次性使用”字样
 - B. 查看失效日期
 - C. 在使用前检查每一单包装是否破裂
 - D. 若附注射针, 应注明规格
 - E. 用后立即销毁

药学·综合

国家执业药师资格考试

药学综合知识与技能

仿真试卷二