

精选妙用

敏

涛

朱敏为

谢英彪

主编

江西科学技术出版社

中草药治疗常见儿科疾病

【精选妙用中草药治疗常见病系列】

精选妙用中草药防癌抗癌

精选妙用中草药减肥、美容、养生

精选妙用中草药

治疳

见皮肤

精选妙用中

精选妙用中草药

精选妙用中



精

精选妙用

精

精选妙用中草药

疗性功能障碍

中约治疗

播疾病

儿科



精选妙用中草药治疗常见儿科疾病

敏 涛 朱敏为 谢英彪 主编

刘亚军 周 涛 瑶 卿 时 文 林 华 编著

江西科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

精选妙用中草药治疗常见儿科疾病/敏涛等编著. —南昌:江西科学技术出版社, 2006. 6

ISBN 7-5390-2853-X

I. 精… II. 敏… III. 小儿疾病—验方—汇编 IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 045935 号

国际互联网(Internet)地址:

HTTP://WWW.NCU.EDU.CN:800/

选题序号:KX2006062

赣科版图书代码:06033-101

精选妙用中草药治疗常见儿科疾病

敏涛等编著

出版	江西科学技术出版社
发行	
社址	南昌市蓼洲街2号附1号
	邮编:330009 电话:(0791)6623341 6610326(传真)
印刷	江西农业大学印刷厂
经销	各地新华书店
开本	850mm × 1168mm 1/32
字数	206千字
印张	8.25
印数	5000册
版次	2006年6月第1版 2006年6月第1次印刷
书号	ISBN 7-5390-2853-X/R·691
定价	14.00元

(赣科版图书凡属印装错误,可向出版社发行部或承印厂调换)

目录

- 一、新生儿小便不通/1
- 二、新生儿脐疝/3
- 三、新生儿皮脂硬化症/9
- 四、新生儿破伤风/12
- 五、小儿白喉/15
- 六、百日咳/18
- 七、小儿结核病/23

- 八、小儿流行性脑脊髓膜炎/25
- 九、小儿流行性乙型脑炎/28
- 十、流行性腮腺炎/35
- 十一、小儿脊髓灰质炎/56
- 十二、小儿麻疹/64
- 十三、水痘/73
- 十四、猩红热/82

- 十五、小儿风疹/86
十六、传染性单核细胞增多症/90
十七、川崎病/95
十八、小儿手足口病/101
十九、登革热/107
二十、小儿感冒/110
二十一、小儿发热/119
二十二、小儿夏季热/122
二十三、小儿支气管炎/126
二十四、小儿肺炎/133
二十五、小儿呕吐/140
二十六、小儿腹泻/144

- 二十七、小儿痢疾/160
二十八、小儿腹胀/164
二十九、小儿厌食症/171
三十、小儿疳积/174
三十一、小儿便秘/181
三十二、小儿遗尿/185
三十三、小儿肾炎/193
三十四、小儿自汗、盗汗/196
三十五、小儿夜啼/199
三十六、小儿佝偻病/203
三十七、小儿抽动-秽语综合征/

三十八、儿童多动症/210

三十九、小儿过敏性紫癜/214

四十、小儿癫痫/219

四十一、小儿寄生虫病/222

四十二、小儿暑疖/227

四十三、小儿肠梗阻/229

四十四、小儿湿疹/231

四十五、婴幼儿尿布皮炎/238

四十六、小儿夜盲症/241

四十七、小儿鹅口疮/243

四十八、小儿疱疹性口炎/248

四十九、疱疹性咽峡炎/251

五十、小儿流涎/254

一、新生儿小便不通

新生儿出生不久,当有小便,一般出生后 36 小时内皆有排尿,若 48 小时后仍无小便排出,检查无先天性泌尿道畸形者,称为新生儿小便不通。新生儿小便不通多因胎热壅结、元气亏虚、下焦气闭等影响膀胱气化所致。治以清热利尿。对于先天性畸形的新生儿小便不通则需手术治疗。

人参五苓散

【组成】 人参 1.5 克,五苓散 3 克。

【制法】 用人参煎汤。

【功效】 补气利水。

【用途】 适用于新生儿小便不通。

【用法】 用人参汤调服五苓散,每日 2 次。

三草饮

【组成】 通草 3 克,生甘草 1.5 克,灯心草 3 克。

【制法】 将上药加水煎药汁。

【功效】 清热利尿。

【用途】 适用于新生儿小便不通。

【用法】 调乳汁服。

地黄甘草市通散

【组成】 生地黄、生甘草、木通、淡竹叶各等份。

【制法】 用前 3 药研末。

【功效】 清热利尿。

【用途】 适用于新生儿小便不通。

妙用中草药

【用法】 每服1克,用淡竹叶煎汤温服。

人参甘草麦冬汤

【组成】 人参、炙甘草各3克,麦冬6克,黄柏1.5克,生姜3片。

【制法】 水煎取药汁。

【功效】 补气利水。

【用途】 适用于新生儿气虚津液不足,小便不通。

【用法】 温热服用。



二、新生儿脐患

新生儿脐患是指断脐后出现的脐湿、脐疮、脐出血、脐突等。其中,脐湿是指脐带脱落后脐部湿润久而不干;脐疮是指脐周围皮肤红肿、热痛、脓疡;脐湿和脐疮相当于现代医学所说的“脐炎”。脐出血是指血从脐带伤口处溢出,或从底部渗出,多因扎脐线结松脱或勒伤脐带,或胎热内盛迫血妄行,或禀赋不足,气不摄血所引起。脐突是指小肠或腹腔脂膜突入脐中,致使脐部突起的一种疾病,多因先天禀赋薄弱,加之断脐后婴儿啼哭过度,或较长时间的剧烈咳嗽、用力所致,相当于现代医学所说的“脐疝”。

三七散

- 【组成】 三七适量。
- 【制法】 将三七研粉。
- 【功效】 止血。
- 【用途】 适用于新生儿脐出血,渗血,速度较慢,出血量少。
- 【用法】 直接扑于新生儿脐带伤口上,也可用云南白药外扑。

枯矾龙骨散

- 【组成】 枯矾、煅龙骨各6克,麝香0.15克。
- 【制法】 取以上3味药共研细末。
- 【功效】 燥湿敛疮。
- 【用途】 适用于新生儿脐湿。
- 【用法】 扑于脐中。每日2~3次。

藕节五倍子糊

- 【组成】 鲜藕节6克,五倍子3克。

妙用中草药

- 【制法】 用以上2味共捣烂，敷于脐部。
【功效】 止血敛疮。
【用途】 适用于新生儿脐炎、血水从脐中溢出者。
【用法】

枯矾散

- 【组成】 枯矾适量。
【制法】 把以上1味研成细末。
【功效】 清热，收湿敛疮。
【用途】 适用于新生儿脐疮、糜烂流水者。
【用法】 敷于脐部。

白石脂黄柏散

- 【组成】 白石脂3克，黄柏10克，枯矾3克，百草霜1克。
【制法】 将以上4味共研细末。
【功效】 清热解毒，消肿止痛，收敛燥湿。
【用途】 适用于新生儿脐湿。
【用法】 取适量药末，填于脐孔中，换药前需用艾叶煎水洗净

脐窝并擦干。

荆芥葱叶外用方

- 【组成】 荆芥、葱叶各适量。
【制法】 将荆芥加水浓煎取液，再把葱叶捣烂如泥备用。
【功效】 解表散风，消疮。
【用途】 适用于新生儿脐突。
【用法】 用时先以荆芥汤液清洁皮肤，然后取葱叶泥膏敷在脐部，盖以纱布，胶布固定。每日1次。

金黄散

【组成】 大黄、黄柏、姜黄、白芷各 10 克，天南星、陈皮、苍术、厚朴、甘草各 5 克，瓜蒌 20 克，凡士林适量。

【制法】 取以上前 10 味共研细末，搅拌和匀，即为金黄散。然后以凡士林 4 份、金黄散 1 份的比例调和成金黄膏备用。

【功效】 清热解毒。

【用途】 适用于新生儿脐疮。

【用法】 用药前先以 75% 酒精擦拭脐疮周围皮肤，然后用生理盐水浸湿棉签将渗液揩拭干净，再将金黄膏敷贴在患处。每日换药 1 次，5 次为一个疗程。

丁香花敷脐方

【组成】 鲜丁香花 3 克。

【制法】 用以上 1 味捣烂。

【功效】 解毒消肿。

【用途】 适用于新生儿脐炎、红肿疼痛。

【用法】 敷于脐部，每日 2 次。

蒜苗甘草敷脐方

【组成】 嫩蒜苗 5 克，甘草 1 克。

【制法】 取以上 2 味共捣烂。

【功效】 清热燥湿，解毒消肿。

【用途】 适用于新生儿脐周红肿糜烂。

【用法】 敷于脐部及周围处，每日 2 次。

柿叶葱白敷脐方

【组成】 鲜柿叶 5 克，葱白 3 克。

【制法】 将以上 2 味共捣烂。

妙用中耳药

【功效】 解毒消肿,止血。

【用途】 适用于新生儿脐中溢血、周围湿润不干者。

【用法】 敷于脐部。

黄连龙骨散

【组成】 黄连 20 克,煅龙骨 20 克,乌贼骨粉 10 克。

【制法】 把以上 3 味共研细末。

【功效】 清热解毒,收湿敛疮。

【用途】 适用于新生儿脐疮。

【用法】 取适量药末撒于脐中。

龙骨枯矾散

【组成】 龙骨 60 克,枯矾 60 克。

【制法】 用以上 2 味共研细末。

【功效】 收湿敛疮。

【用途】 适用于新生儿脐中湿润不干,甚则糜烂、脓水溢出者。

【用法】 敷于脐部,然后用消毒纱布覆盖,再用胶布固定,隔日换药 1 次。

露蜂房敷脐方

【组成】 露蜂房 10 克,蜂蜜适量。

【制法】 将露蜂房研末。

【功效】 祛风攻毒,消肿止痛。

【用途】 适用于新生儿脐部微红、肿痛、糜烂。

【用法】 每次取少许药末,用适量蜂蜜调匀成糊,敷于脐部,每日 1~2 次。

当归麝香敷脐方

【组成】 当归 30 克,麝香少许。

【制法】 用以上 2 味共研细末,待用。

【功效】 活血解毒消肿。

【用途】 适用于新生儿脐湿。

【用法】 敷于脐部。

苍耳子敷脐方

【组成】 苍耳子 30 克。

【制法】 取以上 1 味共研细末。

【功效】 祛风除湿止痒。

【用途】 适用于新生儿脐疮。

【用法】 敷于脐部。

车前子敷脐方

【组成】 车前子 5 克。

【制法】 将以上 1 味炒焦研为细末。

【功效】 清利湿热。

【用途】 适用于新生儿脐中流水。

【用法】 敷于脐部,然后用消毒纱布包扎。

五倍子敷脐方

【组成】 五倍子 3 克。

【制法】 把以上 1 味炒至深黄色,研为细末。

【功效】 收敛化湿。

【用途】 适用于新生儿脐中流水。

【用法】 敷于脐部,然后用消毒纱布包扎,每天换药 1 次。

苍术黄柏散

【组成】 苍术、黄柏、槟榔各等量。

【制法】 用以上 3 味共研细末。

妙用中草药

【功效】 清热燥湿。用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

【用途】 适用于新生儿脐痒流黄水。用青，黄，白，用。【新撰】

【用法】 取药末干搓脐部。用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

用白，朱砂同其製，以用。【新撰】




用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

用白，朱砂同其製，以用。【新撰】

用白，朱砂同其製，以用。【新撰】



三、新生儿皮脂硬化症

新生儿皮脂硬化症是新生儿期较常见的一种疾病,尤其是冬季早产儿、出生低体重儿得这种病的最多,通常发生在生后保暖不好、喂养不足或生后1周内患病的新生儿。新生儿皮脂硬化症患者多表现为不吃、不哭、不动、体温不升、体重不增,以及少吃、少哭、少动、体温增高少、体重增长少。本病常发生在出生后1周内,常系早产儿,以寒冷季节多见,常有摄食过少、保暖不当等病史,以致热量产生与消耗失调。患儿体温在 $31 \sim 35^{\circ}\text{C}$ 左右,皮下脂肪凝固,皮肤发硬呈暗红色,甚至青紫、苍白,兼有水肿,硬肿由两下肢渐向臀部、躯干、面颊部发展。患儿活动少,哭声低下,严重者影响呼吸及吸吮,导致低血糖、酸中毒、循环衰竭,患儿常死于弥散性血管内凝血及肺出血。新生儿皮脂硬化症常伴感染,感染又加重其症状。

· 9 ·

归芎红花膏

【组成】 当归、红花、川芎、赤芍、透骨草各15克,川乌、草乌、乳香、没药各7.5克,丁香9克,肉桂6克,羊毛脂100克,凡士林900克。

【制法】 用以上前11味研细末过筛。将羊毛脂、凡士林隔水加热、溶化,过滤后把药末加入调匀即成。

【功效】 活血化淤,温阳通络。

【用途】 适用于小儿皮脂硬化症。

【用法】 用时取药膏涂于纱布上,略加温后敷于硬肿部位。每日换药1次,直到痊愈。

肉桂丁香川乌膏

【组成】 肉桂12克,丁香6克,川乌、草乌各15克,乳香、没药、

妙用中草药

生姜各 15 克,红花、当归各 30 克,羊毛脂、凡士林各适量。

【制法】 取以上前 9 味共研细末,用羊毛脂及凡士林搅拌成 50% 软膏。

【功效】 活血化淤,温阳通络。

【用途】 适用于新生儿皮脂硬化症。

【用法】 涂抹硬肿部位,用纱布包裹。每日 1 次。

软坚消肿汤

【组成】 丹参 12 克,川芎 12 克,红花 9 克,桃仁 9 克,降香 9 克,当归 10 克,附子 3 克(先煎)。

【制法】 先用 500 克水煎附子 30~60 分钟,再加水至 500 克,加入其他药物,煎取药汁 250 克;2 煎加水 400 克,取汁 200 克,将所得药汁混合。

10 · 【功效】 软坚消肿。

【用途】 适用于小儿皮脂硬化症。

【用法】 每日 1 剂。每日用以擦洗患处 8~10 次,重症擦洗全身。连续应用 7~10 日为一个疗程。可连续用一至三个疗程。

硬肿消

【组成】 苏木 15 克,红花 15 克,桃仁 15 克,乳香 10 克,没药 10 克,水蛭 5 克,干姜 10 克,肉桂 10 克,丹参 10 克,甘草 5 克。

【制法】 将上药加冷水煮沸后,煎煮 30 分钟,再加凉开水最多半脸盆,使水温达 40~42℃。

【功效】 温中散寒,活血通络。

【用途】 适用于新生儿硬肿症。

【用法】 用时将患儿放入脸盆中,仅留面部和颈部在外。操作者以左手扶稳小儿头颈部,右手用小毛巾蘸药液擦洗小儿皮肤,硬肿部位可用手反复轻轻按摩。洗澡时间 15 分钟。每日洗 2 次,暖箱保暖。

消肿散

【组成】 桂枝 15 克,川芎 15 克,生姜 15 克,细辛 10 克,白芷 10 克,红花 10 克,当归 10 克,麻黄 6 克,白芥子 10 克。

【制法】 将上药加水 500~800 克煎至 200~500 克滤出,滤液温度保持在 40~50℃ 之间。

【功效】 温经通阳,活血通络。

【用途】 适用于小儿皮脂硬化症。

【用法】 每日 1 剂,用干净小毛巾在滤液中浸湿外敷患处,并随毛巾温度的改变随时更换。每次外敷 3~4 小时,每日 1~2 次。

肉桂川乌归芍熏洗方

【组成】 肉桂、川乌、草乌各 6 克,当归、赤芍、川芎、红花、透骨草、艾叶各 15 克。

【制法】 用以上 9 味加水 700 克煎浓汁,连渣倒入盆内。

【功效】 温经散寒,活血化淤,软坚散结。

【用途】 适用于新生儿皮脂硬化症。

【用法】 将硬肿处对准盆口处热熏,同时用薄被覆盖其上以免散热。待湿时,再洗或浸泡 15~25 分钟。每日熏洗 1 次。

伸筋草艾叶洗方

【组成】 伸筋草、艾叶、桑枝各 15 克,透骨草、刘寄奴、官桂各 7.5 克,苏木、草红花各 4.5 克。

【制法】 取以上 8 味共研末,装纱布袋内,加水煮沸后备用。

【功效】 活血温经,通络软坚。

【用途】 适用于新生儿皮脂硬化症。

【用法】 用时浸洗患处。每日或隔日 1 次。