

2006年版

# 国家临床执业助理医师资格考试

## 考前冲刺模拟试卷

专家编写组 编

- 融会大纲精髓
- 全面点击真题
- 模拟临考状态
- 解读命题规律
- 重点考点强化
- 提高应试能力

 北京科学技术出版社



**2006年版**

# **国家临床执业助理医师资格考试 考前冲刺模拟试卷**

专家编写组 编



**北京科学技术出版社**

## 图书在版编目(CIP)数据

国家临床执业助理医师资格考试考前冲刺模拟试卷/《国家临床  
执业助理医师资格考试考前冲刺模拟试卷》专家编写组编. —北京:  
北京科学技术出版社, 2006. 6

ISBN 7 - 5304 - 3360 - 1

I. 国... II. 国... III. 临床医学 - 医师 - 资格考核 - 习题  
IV. R4 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 051399 号

## 国家临床执业助理医师资格考试考前冲刺模拟试卷

---

作 者: 专家编写组

策 划: 李金莉

责任编辑: 代 毅

责任校对: 黄立辉

封面设计: 贾 晖

出 版 人: 张敬德

出版发行: 北京科学技术出版社

社 址: 北京西直门南大街 16 号

邮政编码: 100035

电话传真: 0086 - 10 - 66161951 (总编室)

0086 - 10 - 66113227 (发行部)

0086 - 10 - 66161952 (发行部传真)

电子信箱: postmaster@bkjpress.com

网 址: www.bkjpress.com

经 销: 新华书店

印 刷: 三河国新印装有限公司

开 本: 787mm × 1092mm 1/16

字 数: 200 千

印 张: 7

版 次: 2006 年 6 月第 1 版

印 次: 2006 年 6 月第 1 次印刷

ISBN 7 - 5304 - 3360 - 1/R · 888

---

定 价: 18.00 元



京科版图书, 版权所有, 侵权必究。

京科版图书, 印装差错, 负责退换。

# 国家临床执业(助理)医师资格考试考前冲刺模拟试卷

## 出版说明

卫生部医师资格考试委员会颁布的《医师资格考试大纲(医学综合笔试部分临床执业医师)2006年版》包含的考试内容是宽泛的,而执业医师考试又是水平考试,主要是考察考生对知识的占有量。对于一个考生,同时复习十几门课程,这需要投入大量的时间和精力,还要有日常的工作要做。每个人的复习习惯和学习需求不同,但如何高效复习、省时、省力都是每个考生很关心的,这也是我们想努力做到的。

在复习的最后阶段,有别于前阶段的复习,考生通过熟悉考试环境与题型可以提高应试能力,并发现遗漏。本书通过对考试大纲的分析,研究历年考题及考点分布,编写了几套全真模拟试题,并选编了历年考题,将反复考察的知识点进行强化复习,作为考生考前冲刺备考之用。

希望考生通过使用本书,可以在有限的时间内得到事半功倍的复习效果,取得理想的成绩。

# 国家临床执业(助理)医师资格考试

## 试题类型和解题说明

国家临床执业(助理)医师资格考试的全部试题均采用以选择题为代表的客观型试题。各类选择题均由两部分组成:①题干,是试题的主体,可由一段短语、问句或不完整的陈述句构成,也可由一段病例、病史、图表、照片或其他临床资料来表示。②选项,也称备选答案,由4~5个用字母标明、可供选择的词组或短句组成。执业(助理)医师资格考试采用A型题和B型题,A型题分为A<sub>1</sub>、A<sub>2</sub>、A<sub>3</sub>/A<sub>4</sub>型题,B型题分为B<sub>1</sub>、B<sub>2</sub>型题(医师资格考试暂不采用B<sub>2</sub>型题)。

为了帮助考生更好地了解考试题型,顺利通过考试,我们将各题型的特点及应试方法分别介绍如下:

### (一) A<sub>1</sub>型题:单句型最佳选择题

#### 1. 答题说明

以下每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

#### 2. 例题及特点、答题方法

**例1** 胃癌的主要转移途径是( )

- |           |         |         |
|-----------|---------|---------|
| A. 肝转移    | B. 血运转移 | C. 淋巴转移 |
| D. 腹腔种植转移 | E. 直接蔓延 |         |

**正确答案:**C

**特点及答题方法:**每道题由一个题干和五个备选答案组成,其中只有一个最佳答案为正确答案,其余均为干扰答案。回答问题时,应找出最佳的或最适当的答案,排除似乎有道理而实际不恰当的答案。

### (二) A<sub>2</sub>型题:病历摘要型最佳选择题

#### 1. 答题说明

以下每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

#### 2. 例题

**例2** 女性,28岁,股骨下端疼痛,膝关节活动轻微受限。查体:股骨下端偏外侧局限性隆起,压痛。X线片:股骨外侧髁可见偏心性生长的骨吸收病灶,皮质向外膨隆变薄,呈肥皂泡样,无骨膜反应。诊断为( )

- A. 骨纤维异样增殖症      B. 骨巨细胞瘤      C. 嗜酸性肉芽肿  
D. 内生软骨瘤      E. 骨囊肿

**正确答案: B**

### 3. 答题方法

每一道考题是由一个叙述性主体(简要病历)作为题干,一个引导性问题和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成。回答此类试题,要全面分析题干中所给出的各种条件,分清主次,选择正确答案。

## (三) A<sub>3</sub>/A<sub>4</sub> 型题: 病历组型最佳选择题

### 1. 答题说明

以下提供若干案例,每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息,在每道下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

### 2. 例题

**例 3** 女性,28 岁,转移性右下腹痛 28 小时,并恶心、呕吐,呕吐物为胃内容物,量少,伴发热。查体:体温约 38.2℃,脉搏 98 次/分,右下腹压痛、反跳痛、肌紧张。血 WBC 为  $1.2 \times 10^{10}/L$ ,中性 90%,尿常规 WBC 8~10/HP,红细胞 2~3/HP。

1. 该患者最可能的诊断是( )

- A. 急性胆囊炎      B. 消化性溃疡穿孔      C. 急性化脓性阑尾炎  
D. 急性胰腺炎      E. 急性肠梗阻

**正确答案 C**

2. 该患者最佳治疗方法为( )

- A. 观察      B. 急诊行手术治疗      C. 抗炎补液  
D. 中药治疗      E. 对症治疗

**正确答案 B**

3. 该患者手术后最常出现的并发症为( )

- A. 肠粘连梗阻      B. 肠痿      C. 腹腔残余脓肿  
D. 腹腔出血      E. 切口感染

**正确答案 E**

### 3. 特点及答题方法

每一道题先开始叙述一个以病人为中心的临床病例,然后提出 2~3 个问题,每个问题下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。每一个问题均与开始叙述的临床病例有关,但测试点不同。而且问题之间是相互独立的,每一个问题都是一个单句型的最佳选择题。回答这类问题,要注意每一个测试要点的区别,找出临床病例中能回答这个问题的相关部分。

## (四) B<sub>1</sub> 型题: 配伍题

### 1. 答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题密切相关的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次,多次或不被选择。

## 2. 例题

### 例4 (1~3 共用备选答案)

- A. 抗结核治疗                      B. 病灶清除术                      C. 肾部分切除术  
D. 肾切除术                      E. 肾造瘘

1. 一侧肾结核,肾上极肾盏有虫蚀样改变,不规则扩大,应采用(     )
2. 一侧肾结核无功能,对侧肾正常,应作(     )
3. 一侧肾结核无功能,对侧肾重度积水并尿毒症,应先作(     )

正确答案:1. C    2. D    3. E

### 3. 特点及答题方法

每组题由 A、B、C、D、E 五个备选答案与 2~3 个题干组成,答案在前,题干在后。答题时要求为每一个题干选择一个正确答案,每个备选答案可以重复选用,也可以一次不用。





- A. 引起痛觉                      B. 引起温度觉                      C. 使机体进入睡眠状态  
D. 引起触觉                      E. 维持大脑皮质的兴奋状态
9. 幼年期甲状腺激素分泌过少会导致(     )  
A. 呆小症                      B. 巨人症                      C. 肢端肥大症  
D. 侏儒症                      E. 黏液性水肿
10. 蛋白质的基本组成单位是(     )  
A. 肽键平面                      B. 核苷酸                      C. 肽  
D. 氨基酸                      E. 碱基
11. 磷酸戊糖途径的主要生理意义是(     )  
A. 生成 ATP                      B. 防止酸中毒                      C. 维持血糖浓度  
D. 抑制脂肪合成                      E. 生成 NADPH
12. 运输内源性三酰甘油的脂蛋白是(     )  
A. CM                      B. VLDL                      C. LDL  
D. IDL                      E. HDL
13. 正常成人血浆中  $[Ca] \times [P]$  乘积为(     )  
A. 5 ~ 10                      B. 15 ~ 20                      C. 25 ~ 30  
D. 35 ~ 40                      E. 45 ~ 50
14. 影响酶促反应速度的因素不包括(     )  
A. 底物浓度                      B. 酶的浓度                      C. 反应环境的 pH  
D. 反应温度                      E. 酶原的浓度
15. 维生素 A 缺乏时引起(     )  
A. 癞皮病                      B. 脚气病                      C. 夜盲症  
D. 坏血病                      E. 佝偻病
16. 下列不是 RNA 所包含的核苷酸是(     )  
A. TMP                      B. CMP                      C. GMP  
D. UMP                      E. AMP
17. 蛋白质分子中氨基酸排列顺序决定于(     )  
A. 氨基酸种类                      B. rRNA                      C. tRNA  
D. mRNA 分子中单核苷酸排列顺序                      E. hnRNA
18. 下列哪一项不属于萎缩(     )  
A. 重症脑动脉粥样硬化时脑体积变小                      B. 空洞型肾结核时变薄的肾实质  
C. 老年人的心脏                      D. 小儿麻痹症的下肢肌肉                      E. 恶病质时的肢体
19. 血栓形成的条件不正确的是(     )  
A. 血管内皮损伤                      B. 新生血小板增多                      C. 涡流形成  
D. 纤维蛋白溶酶增加                      E. 组织因子释放
20. 良性与恶性肿瘤判定中,最有诊断意义的是(     )  
A. 生长方式                      B. 生长速度                      C. 肿瘤的异型性  
D. 对机体影响                      E. 出血与坏死
21. 有可能造成大出血的动脉粥样硬化复合病变是(     )  
A. 血管腔狭窄                      B. 动脉瘤                      C. 粥样性溃疡  
D. 附壁血栓形成                      E. 斑块破裂
22. 风湿病中最具诊断意义的病变是(     )  
A. 心肌局灶性变性、坏死                      B. 心内膜纤维组织增长                      C. 胶原纤维的纤维素样变性  
D. Aschoff 小体形成                      E. 心外膜纤维渗出

23. 最能反映小叶性肺炎的病变特征是( )  
 A. 病变累及肺小叶范围 B. 病灶多位于背侧和下叶 C. 病灶相互融合或累及全叶  
 D. 支气管化脓性炎症 E. 细支气管及周围肺泡化脓性炎症
24. 急性普通型病毒性肝炎,其坏死病变主要为( )  
 A. 点状坏死 B. 桥接坏死 C. 碎片状坏死  
 D. 大片坏死 E. 灶性坏死
25. 急性菌痢肠黏膜溃疡形成的原因是( )  
 A. 肠壁血液循环障碍 B. 血栓形成 C. 细菌毒素  
 D. 中性粒细胞释放的蛋白酶使假膜溶解脱落 E. 肠内容物的机械性损伤
26. 乳腺癌最常见的病理组织学类型是( )  
 A. 鳞状细胞癌 B. 浸润性导管癌 C. 浸润性小叶癌  
 D. 髓样癌 E. 湿疹样癌
27. 毛细血管内增生性肾小球肾炎增生的细胞是( )  
 A. 肾小球球囊壁层上皮细胞 B. 肾小球球囊脏层上皮细胞 C. 肾小球系膜细胞和内皮细胞  
 D. 肾小球内皮细胞 E. 肾小球系膜细胞
28. 结核结节中最具有诊断意义的细胞成分是( )  
 A. 朗格汉斯巨细胞和淋巴细胞 B. 朗格汉斯巨细胞和上皮样细胞 C. 淋巴细胞和上皮样细胞  
 D. 上皮样细胞和异物巨细胞 E. 异物巨细胞和纤维细胞
29. 哮喘急性发作应选用( )  
 A. 吸入色甘酸钠 B. 吸入倍氯米松 C. 吸入沙丁胺醇  
 D. 口服氨茶碱 E. 口服沙丁胺醇
30. 能翻转肾上腺素升压作用的药物是( )  
 A. 普萘洛尔 B. 多巴胺 C. 异丙肾上腺素  
 D. 酚妥拉明 E. 间羟胺
31. 高血压病患者伴发心悸和劳力性心绞痛时,应首选( )  
 A.  $\beta$ 受体阻断药 B. 血管紧张素转换酶抑制剂 C.  $\alpha_1$ 受体阻断药  
 D. 钙离子拮抗剂 E. 利尿药
32. 下列哪项不是肝素的适应证( )  
 A. 肺栓塞 B. DIC 早期 C. 心脏瓣膜置换术  
 D. 血液透析 E. 严重高血压
33. 下列哪项不属于糖皮质激素的禁忌证( )  
 A. 曾患严重精神病 B. 新近胃肠吻合术 C. 非特异性角膜炎  
 D. 水痘 E. 严重糖尿病
34. 哪种药物服后尿液为橙赤色( )  
 A. 异烟肼 B. 利福平 C. 红霉素  
 D. 乙胺丁醇 E. 链霉素
35. 下列哪项属于非感染性发热( )  
 A. 风湿热 B. 大叶性肺炎发热 C. 细菌性痢疾发热  
 D. 阿米巴肝脓肿 E. 普通感冒
36. 周围性发绀见于( )  
 A. 重症休克 B. 肺炎 C. 气胸  
 D. 肺水肿 E. 法洛四联症
37. 靴形心见于下列哪种疾病( )  
 A. 高血压心脏病 B. 肺心病 C. 扩张型心肌病

- D. 二尖瓣狭窄 E. 心包积液
38. 进行性头痛伴呕吐、视盘水肿、头痛往往在清晨加重,应考虑( )  
A. 颅内占位 B. 偏头痛 C. 颅内出血  
D. 颅内感染 E. 高血压
39. 慢性支气管炎的临床分型是( )  
A. 单纯型、喘息型和过敏型 B. 急性型、慢性型、迁延型 C. 单纯型、喘息型  
D. 急性型、慢性型 E. 单纯型、喘息型和感染型
40. 支气管哮喘与心源性哮喘不同点在于( )  
A. 慢性、阵发性、季节性发作史 B. 呼气性呼吸困难 C. 肺部听诊哮鸣音  
D. 心脏无特殊体征 E. 咯粉红色泡沫痰
41. 支气管扩张最有诊断价值的检查是( )  
A. 胸透 B. 胸正、侧位片 C. 肺 CT  
D. 肺磁共振 E. 支气管造影
42. 早期发现肺结核的首选方法是( )  
A. 结核菌素试验 B. 纤维支气管镜检查 C. 血清酶联免疫试验  
D. 痰结核杆菌检查 E. 胸部 X 线检查
43. 胸穿抽出臭味混浊液体,需进一步作何检查以明确病因( )  
A. 查瘤细胞 B. 厌氧菌培养 C. 需氧菌和真菌培养  
D. 查虫卵 E. 涂片革兰染色和抗酸染色
44. 慢性呼吸衰竭最常见的病因为( )  
A. 肺间质纤维化 B. 重症肺结核 C. 胸廓和神经肌肉病变  
D. 慢性阻塞性肺疾病 E. 肺尘埃沉着病(尘肺)
45. 治疗肺心病心力衰竭的首要措施是( )  
A. 卧床休息、低盐饮食 B. 使用小剂量强心剂 C. 使用小剂量作用缓和的利尿剂  
D. 应用血管扩张剂减轻心脏负荷 E. 积极控制感染和改善呼吸功能
46. 慢性充血性心力衰竭的诱发因素最为常见的是( )  
A. 环境、气候的急剧变化 B. 妊娠与分娩 C. 过劳与情绪激动  
D. 感染 E. 输液过多、过快
47. 下列哪种心律失常是洋地黄中毒最具特异性的表现( )  
A. 心电图呈鱼钩型 ST-T 改变 B. 频发房性期前收缩 C. 心房颤动或扑动  
D. 心房颤动伴Ⅲ度传导阻滞 E. 左束支传导阻滞
48. 心脏性猝死的主要病因为( )  
A. 冠心病 B. 心肌病 C. 充血性心力衰竭  
D. 心瓣膜病 E. 先天性心血管病
49. 变异性心绞痛的主要特点是( )  
A. 心绞痛发作时常可见 Q 波 B. 常于劳累后发作 C. 情绪激动是常见诱因  
D. 发作时 ST 段上移 E. 发作时 ST 段显示下移
50. 二尖瓣关闭不全与二尖瓣脱垂鉴别主要点是( )  
A. 前者心尖部有全收缩期杂音 B. 前者第一心音减弱 C. 前者第一心音增强  
D. 后者少见 E. 后者除收缩期杂音外,心尖区常有收缩中期喀喇音
51. 亚急性感染性心内膜炎最常见的致病菌是( )  
A. 乙型溶血性链球菌 B. 草绿色链球菌 C. 革兰阴性杆菌  
D. 白色葡萄球菌 E. 肠球菌
52. 高血压危象降低血压宜首先选用( )

- A. 硝苯地平口服                      B. 卡托普利口服                      C. 硝普钠静滴  
D. 哌唑嗪口服                      E. 呋塞米稀释后静注
53. 确诊慢性胃炎的主要依据是( )  
A. 胃液分析                      B. X线钡餐检查                      C. 粪便潜血试验  
D. 病史和临床表现                      E. 胃镜及胃黏膜活检
54. 肝炎肝硬化病人出现血性腹水时应首先考虑并发( )  
A. 结核性腹膜炎                      B. 自发性腹膜炎                      C. 肝肾综合征  
D. 原发性肝癌                      E. 脾梗死
55. 对 HBsAg 阳性的人群作肝癌普查,首选的方法为( )  
A. B超 + AFP                      B. B超 + CT                      C. B超 + MRI  
D. B超 + 肝动脉造影                      E. CT + 肝动脉造影
56. 下述哪一项对结核性腹膜炎最具诊断价值( )  
A. 腹水检查                      B. 腹壁柔韧感                      C. 腹腔镜检查  
D. 腹部 X 线平片检查                      E. 结核菌素皮肤试验
57. 国内急性胰腺炎的常见病因( )  
A. 胆道疾病                      B. 胆胰或胃手术后                      C. 腹部钝挫伤  
D. 大量饮酒和暴饮暴食                      E. 急性病毒感染
58. 溃疡性结肠炎病变多位于( )  
A. 回肠末端及升结肠                      B. 升结肠                      C. 降结肠  
D. 全结肠                      E. 直肠及乙状结肠
59. 慢性肾炎治疗的主要目的是( )  
A. 消除血尿                      B. 消除蛋白质                      C. 治疗水肿  
D. 防止或延缓肾功能进行性恶化                      E. 促进血浆白蛋白升高
60. 哪种疾病时尿中常见大量蛋白( )  
A. 肾结核                      B. 肾病综合征                      C. 急性肾盂肾炎  
D. 急性肾小球肾炎                      E. 慢性肾小球肾炎
61. 关于隐匿性肾小球肾炎,哪项不正确( )  
A. 蛋白尿以白蛋白为主                      B. 血尿为肾小球源性                      C. 虽病程迁延,但多可自愈  
D. 不需特殊治疗                      E. 仅少数转为慢性肾炎
62. 有关铁剂治疗缺铁性贫血的叙述错误的是( )  
A. 首选右旋糖酐铁肌内注射                      B. 服用铁剂时应避免同时服用茶叶                      C. 首选口服铁剂治疗  
D. 消化道吸收障碍者可肌内注射右旋糖酐铁                      E. 山梨醇铁可以用于肌注补铁
63. 可进行骨髓移植治疗的贫血是( )  
A. 巨幼细胞贫血                      B. 再生障碍性贫血                      C. 自身免疫性、溶血性贫血  
D. 慢性病贫血                      E. 缺铁性贫血
64. 甲亢与单纯性甲状腺肿不同的是( )  
A. 甲状腺肿大不明显                      B. 甲状腺肿、痛                      C. 甲状腺质硬  
D. 甲状腺血管杂音                      E. 甲状腺缩小
65. SLE 的典型皮损( )  
A. 环形红斑                      B. 结节性红斑                      C. 网状青斑  
D. 多形性红斑                      E. 面部蝶形红斑
66. 下列哪种物质中毒口唇黏膜呈樱桃红( )  
A. 蛇毒                      B. 农药                      C. 二氧化碳  
D. 一氧化碳                      E. 来苏

67. 对糖尿病诊断首选( )  
 A. 24 小时尿糖定量测定 B. 餐后 2 小时血糖测定 C. 糖化血红蛋白测定  
 D. 口服葡萄糖耐量试验 E. 胰岛素释放试验
68. 晨僵在哪类关节炎中表现最为突出( )  
 A. 骨性关节炎(OA) B. 类风湿关节炎(RA) C. 强直性脊柱炎(AS)  
 D. 感染性关节炎 E. 风湿性关节炎
69. 患者凭空听到两个人在议论自己的行为,各说各的理,此症状是( )  
 A. 争论性幻听 B. 评论性幻听 C. 命令性幻听  
 D. 思维化声 E. 思维鸣响
70. 血管性痴呆的特征是( )  
 A. 早期全面智能损害 B. 常伴错觉 C. 有阶段性波动,智能呈“岛状”损害  
 D. 早期人格明显损害 E. 白天精神紊乱明显
71. 下运动神经元瘫痪的特点是( )  
 A. 痉挛性瘫痪 B. 肌张力增高 C. 出现病理反射  
 D. 弛缓性瘫痪 E. 腱反射亢进
72. 出现偏瘫、偏身感觉障碍、偏盲的病变部位是( )  
 A. 脊髓 B. 小脑 C. 丘脑  
 D. 内囊 E. 脑干
73. 患者有偏瘫、偏身感觉障碍和偏盲,最可能由下述哪条血管闭塞引起( )  
 A. 大脑前动脉 B. 大脑中动脉 C. 大脑后动脉  
 D. 内听动脉 E. 脊髓前动脉
74. 原发性三叉神经痛不应有的表现( )  
 A. 面部发作性剧痛 B. 患侧面部皮肤粗糙 C. 面部痛觉减退  
 D. 痛性抽搐 E. 有触发点
75. 提睾反射的反射中枢是在( )  
 A. 胸<sub>11-12</sub> B. 腰<sub>1-2</sub> C. 腰<sub>3-4</sub>  
 D. 骶<sub>1-2</sub> E. 骶<sub>4-5</sub>
76. 格林-巴利综合征治疗不恰当的是( )  
 A. 早期血浆置换 B. 早期大剂量免疫球蛋白治疗 C. 早期应用肾上腺糖皮质激素  
 D. 早期应用 B 族维生素等 E. 早期康复治疗
77. 呼吸性酸中毒所致的电解质紊乱为( )  
 A. 低钾血症 B. 高钠血症 C. 低钙血症  
 D. 高氯血症 E. 低氯血症
78. 外科病人最容易发生的缺水是( )  
 A. 等渗性脱水 B. 低渗性脱水 C. 高渗性脱水  
 D. 低渗性脱水与低渗性脱水 E. 等渗性脱水与高渗性脱水
79. 低钾血症最早的临床表现( )  
 A. 肌无力 B. U 波 C. 厌食、恶心、呕吐  
 D. 腹胀 E. 腱反射减弱
80. 准备进行骨髓移植的患者需要输血改善贫血症状,首选的血液制品为( )  
 A. 全血 B. 红细胞悬液 C. 少白细胞的红细胞  
 D. 洗涤红细胞 E. 浓缩红细胞
81. 下列哪一种反应为输血时最常见的并发症( )  
 A. 非溶血性发热反应 B. 变态反应和过敏反应 C. 溶血反应



- D. 细菌污染反应 E. 酸碱平衡失调
82. 休克患者早期尿的变化哪些是错误的( )
- A. 尿量少 B. 尿比重高 C. 尿钠高  
D. 尿 pH 值下降 E. 尿钾改变不明显
83. 循环骤停进行复苏时最有效的药物是( )
- A. 肾上腺素 B. 异丙肾上腺素 C. 去甲肾上腺素  
D. 间羟胺 E. 多巴胺
84. 下列哪个选项是引起手术后恶心、呕吐的常见原因( )
- A. 颅内压增高 B. 急性胃扩张 C. 麻醉反应  
D. 肠梗阻 E. 糖尿病酸中毒
85. 有关手术后早期活动,下列哪一项是错误的( )
- A. 改善血液循环 B. 避免腹胀及尿潴留 C. 可影响切口愈合  
D. 减少肺部并发症 E. 防止下肢静脉血栓形成
86. 下列关于胃肠外补充营养的适应证中不包括( )
- A. 高位小肠瘘 B. 恶性肿瘤化疗期呕吐 C. 大面积烧伤  
D. 贫血 E. 坏死性胰腺炎
87. 深部脓肿的特点是( )
- A. 局部红、肿、热、痛明显 B. 局部波动感明显 C. 全身中毒症状不明显  
D. 局部仅有水肿现象,但无压痛 E. 局部水肿,压痛明显,穿刺可抽到脓液
88. 下列哪一种损伤易引起急性肾衰竭( )
- A. 肝、脾破裂 B. 多发肋骨骨折 C. 肾挫裂伤  
D. 挤压伤 E. 多发性骨折伴休克
89. 刺伤的特点是( )
- A. 伤道内污染较轻 B. 伤情一般不重 C. 伤口的大小一般可以反映伤情的轻重  
D. 伤口小,伤道深,可能伤及深部内脏 E. 不会造成大出血
90. 深Ⅱ度烧伤的临床表现,下列错误的是( )
- A. 有时在大腿可见树枝状栓塞血管 B. 创面多有水疱  
C. 创面痛觉迟钝 D. 如无感染,创面3~4周愈合 E. 愈合后多有增生性瘢痕
91. 特异性免疫治疗药物为( )
- A. 卡介苗 B. 转移因子 C. 肿瘤免疫核糖核酸  
D. 左旋咪唑 E. 干扰素
92. 有关甲状腺手术后导致呼吸困难的原因,不包括下列哪一项( )
- A. 手术时止血不完善 B. 双侧喉上神经损伤 C. 血管结扎线脱落  
D. 急性喉头水肿 E. 气管软化塌陷
93. 急性乳腺炎形成脓肿后行切开引流时,错误的是( )
- A. 除乳晕下脓肿外,切口应做放射状 B. 切口应引流通畅  
C. 脓肿较大时可作对口引流 D. 不要分离脓肿隔膜,以防炎症扩散  
E. 乳房后脓肿可做乳房下缘弧形切口
94. 腹外疝最重要的发病原因是( )
- A. 慢性咳嗽 B. 长期便秘 C. 排尿困难  
D. 腹壁有薄弱点或腹壁缺损 E. 经常从事腹内压增高的工作
95. 当腹部闭合性损伤尚未明确,在观察期间下列哪项措施是不恰当的( )
- A. 不随便搬运患者,以免加重伤情  
B. 不给饮食,以防消化道穿孔者腹腔污染加重

- C. 注射止痛剂,以防止创伤性休克  
D. 注射广谱抗生素,预防和治疗可能存在的感染  
E. 胃肠减压,减轻腹胀
96. 腹部闭合性损伤伴休克,腹穿为炎性混浊液,其处理的首要原则( )  
A. 立即手术剖腹探查 B. 抗休克同时尽早手术治疗 C. 抗休克好转后手术  
D. 严密观察腹部情况 E. 输血、补液、应用抗菌药物
97. 关于溃疡病急性穿孔,下列哪一项对诊断最有意义( )  
A. 均有溃疡病史 B. 突起脐周剧痛,转移至右下腹 C. 腹痛剧烈,辗转不安  
D. 约 80% 病例有膈下游离气体 E. 腹部剧痛数小时后缓解,提示病情好转
98. 急性阑尾炎早期出现上腹部及脐周疼痛是由于( )  
A. 胃肠道反射 B. 腹膜炎症刺激 C. 内脏功能紊乱  
D. 内脏神经反射 E. 合并急性胃肠炎
99. 断流手术的方式有许多,下列哪项疗效较为理想( )  
A. 脾切除加贲门周围血管离断术 B. 胃冠状静脉结扎 C. 食管下段胃底切除  
D. 胃底横断术 E. 胃后静脉和左膈下静脉离断
100. 急性梗阻性化脓性胆管炎,最关键的治疗是( )  
A. 纠正休克 B. 抗感染 C. 胆道减压解除梗阻  
D. 胆囊切除 E. 纠正酸中毒
101. 下列哪个叙述不是酒精引起急性胰腺炎的原因( )  
A. 通过刺激胃液分泌间接引起胰液增多  
B. 直接刺激胰腺引起过量分泌  
C. 可引起 Oddi 括约肌痉挛、水肿  
D. 使胰管引流不畅,胰管内压增高,破坏腺泡  
E. 对胰腺有直接毒性作用
102. 最易发生骨折的肋骨是( )  
A. 1~3 肋 B. 4~7 肋 C. 8~10 肋  
D. 11~12 肋 E. 肋软骨
103. 下列哪项不属于肺癌的非转移全身症状( )  
A. 杵状指(趾) B. 重症肌无力 C. Horner 综合征  
D. Cushing 综合征 E. 男性乳腺增生
104. 下列哪一种骨折属于不稳定骨折( )  
A. 裂缝骨折 B. 螺旋骨折 C. 青枝骨折  
D. 嵌插骨折 E. 横骨折
105. 骨折愈合的第二期是( )  
A. 原始骨痂形成期 B. 血肿机化演进期 C. 骨痂改造塑形期  
D. 膜内化骨吸收期 E. 软骨内化骨吸收期
106. 伸直型肱骨髁上骨折的移位方向是( )  
A. 远端向桡侧 B. 远端向尺侧 C. 近端向尺侧  
D. 远端向后 E. 远端向前
107. 关节内注射醋酸泼尼松龙应慎用于( )  
A. 髌骨软骨软化症 B. 胫骨结节骨软骨病 C. 风湿性关节炎  
D. 股骨头骨软骨病 E. 类风湿关节炎
108. 急性血源性骨髓炎的发病部位最常见于( )  
A. 尺桡骨 B. 肱骨、肩胛骨 C. 胫骨、股骨

- D. 髌骨、骶骨 E. 脊椎骨
109. 下列哪种结石在 X 线检查中不显影( )  
A. 胱氨酸结石 B. 黄嘌呤结石 C. 草酸钙结石  
D. 磷酸镁胺结石 E. 尿酸结石
110. 颅内压增高引起最严重的后果是( )  
A. 血管源性水肿 B. 胃肠功能紊乱 C. Cushing 反应  
D. 脑疝 E. 细胞毒性脑水肿
111. 急性硬膜外血肿意识障碍最典型特征( )  
A. 清醒 - 昏迷 B. 昏迷 - 清醒 C. 昏迷 - 清醒 - 昏迷  
D. 昏迷 - 好转 - 昏迷 E. 昏迷 - 昏迷
112. 女性骨盆最少见的类型是( )  
A. 女型骨盆 B. 男型骨盆 C. 类人猿型骨盆  
D. 扁平型骨盆 E. 混合型骨盆
113. 关于羊水的叙述正确的是( )  
A. 胎儿尿液是孕早期羊水的主要来源  
B. 妊娠中期以后羊水主要由母体血清经胎膜进入羊膜腔的透析液形成  
C. 胎儿的消化道是吸收羊水的重要部位  
D. 脐带华通胶不能吸收羊水  
E. 妊娠中期以后,羊水逐渐变为高渗
114. 诊断早孕的辅助检查方法首选( )  
A. 阴道脱落细胞学检查 B. 基础体温测定 C. 尿妊娠试验  
D. 孕激素试验 E. 宫颈黏液涂片镜检
115. 病理性缩复环常见病因( )  
A. 不协调性子宫收缩乏力 B. 女型骨盆 C. 软产道损伤  
D. 头盆不称 E. 枕后位
116. 协调性子宫收缩乏力的概述下列哪项正确( )  
A. 不宜静脉滴注缩宫素 B. 子宫收缩极性倒置 C. 不易发生胎盘残留  
D. 产程延长 E. 容易发生胎儿窘迫
117. 关于胎儿电子监测,提示胎头受压的是( )  
A. NST 无反应型 B. 胎心率加速 C. 早期减速  
D. 变异减速 E. 晚期减速
118. 胎膜早破的概述下列哪项是不正确的( )  
A. 胎膜破后阴道 pH 值应升高 B. 头高浮与臀先露需防止脐带脱垂  
C. 破膜 12 小时开始给抗生素 D. 破膜 24 小时仍未娩出应行剖宫产术  
E. 胎膜破裂,发生于产程开始之前
119. 关于宫腔镜检查,下列哪项正确( )  
A. 主要用于探查异常子宫出血 B. 对诊断原发或继发不孕无帮助  
C. 因为有冷光源指示,不会发生子宫穿孔 D. 有活动性出血时,应先检查然后刮宫  
E. 必须在全身麻醉下进行
120. 滴虫阴道炎的治愈标准是( )  
A. 临床症状消失 B. 局部用药 3 个疗程 C. 连续 3 次月经后检查滴虫阴性  
D. 连续 3 次月经前检查滴虫阴性 E. 治疗后悬滴法检查滴虫阴性
121. 关于宫颈癌早期症状下列哪项正确( )  
A. 阴道大量排液 B. 接触性出血 C. 反复阴道流血

- D. 大腿及腰骶部疼痛 E. 排尿困难
122. 诊断子宫内膜癌最可靠的方法是( )  
A. 阴道后穹隆涂片细胞学检查 B. 宫颈冲洗液涂片细胞学检查 C. 子宫镜检查  
D. B超 E. 分段刮宫
123. 子宫内膜异位症的临床特点是( )  
A. 痛经发生在月经第1~2天 B. 继发性和渐进性痛经 C. 不影响受孕  
D. 病灶局限于生殖系统 E. 多发生于40~50岁妇女
124. 下列哪项不是卵巢恶性肿瘤的特点( )  
A. 肿块界限不清 B. 肿瘤生长迅速 C. 常为单侧性  
D. 常伴腹水 E. 多为实性
125. 诊断葡萄胎最有价值的是( )  
A. 停经后阴道不规则流血 B. 子宫异常增大变软 C. 妇科检查附件区扪及到囊性肿物  
D. 尿中HCG呈高值 E. B超示宫腔内充满弥漫分布的光点和小囊样无回声区
126. 人工流产后12天阴道流血仍多,应首先考虑的是( )  
A. 子宫穿孔 B. 子宫复旧不良 C. 吸宫不全  
D. 子宫内膜炎 E. 漏吸
127. 新生儿生理性体重下降发生在出生后( )  
A. 第1周 B. 第2周 C. 第3周  
D. 第4周 E. 第5周
128. 母乳与牛乳相比,营养丰富,易于消化,是因为母乳中( )  
A. 蛋白质含量高 B. 含酪蛋白多 C. 含白蛋白、球蛋白较多  
D. 含饱和脂肪酸多 E. 含甲型乳糖高
129. 反映儿童生长与营养状况的灵敏指标是( )  
A. 体重 B. 头围 C. 身长  
D. 胸围 E. 牙齿
130. 苯丙酮尿症患儿应采取的措施是( )  
A. 观察,抽搐时给予止抽搐药物 B. 口服甲状腺素片  
C. 静推10%葡萄糖酸钙,同时口服维生素D D. 限制苯丙氨酸摄入量  
E. 口服碘化钾
131. 儿童风湿热的相关发病机制是( )  
A. 链球菌直接损害 B. III型变态反应 C. IV型变态反应  
D. I型变态反应 E. 肠球菌的毒素作用
132. 初种麻疹减毒活疫苗的时间是( )  
A. 生后2个月 B. 生后4个月 C. 生后8个月  
D. 4岁时加强一次 E. 8岁时加强一次
133. 1岁小儿未接种过卡介苗,PPD阳性表示( )  
A. 近2~3周内感染结核 B. 体内已有免疫力不会再感染结核  
C. 体内有活动结核 D. 对结核无免疫力,需立即接种卡介苗  
E. 受过结核感染,不一定有活动结核
134. 新生儿败血症有价值的诊断依据是( )  
A. 高热 B. 白细胞总数增加 C. 血培养阳性  
D. 皮疹明显 E. 有皮肤伤口
135. 小儿重型腹泻最易发生的酸碱平衡紊乱是( )  
A. 呼吸性酸中毒 B. 代谢性酸中毒 C. 代谢性碱中毒