

全 国 高 等 农 业 院 校 教 材

植 物 学

李扬汉 主编



上海科学技术出版社

全国高等农业院校教材

植 物 学

李扬汉 主编

上海科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

植物学/李扬汉主编. —3版. —上海:上海科学技术出版社, 2006. 7

全国高等农业院校教材

ISBN 7 - 5323 - 8502 - 7

I . 植... II . 李... III . 植物学-高等学校-教材
IV . Q94

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 054874 号

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社

(上海钦州南路 71 号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

商务印书馆上海印刷股份有限公司印刷

开本 787×1092 1/16 印张 25.25

字数 615 000

1978 年第 1 版第 1 次印刷

1984 年第 2 版

2006 年 7 月第 3 版第 31 次印刷

印数 338 701—344 700

定价: 29.50 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向承印厂联系调换

主 编 李扬汉(南京农业大学)

编写、审稿人员

丁宝章(河南农业大学)	吴万春(华南农业大学)
王世旄(华南农业大学)	周百嘉(广西农业大学)
王凤翱(湖南农业大学)	陆时万(上海师范大学)
刘稷缘(中国农业大学)	陆廷琦(浙江农业大学)
吉玲芬(河南农业大学)	徐汉卿(南京农业大学)
杜贻斌(河北农业大学)	章毓英(南京农业大学)
谷安根(吉林农业大学)	谢成章(华中农业大学)
连 钝(云南农业大学)	熊济华(西南农业大学)
李扬汉(南京农业大学)	闻洪汉(西北农业大学)
鲍世问(南京农业大学)	杨人俊(沈阳农业大学)

目 录

绪 论

一、植物界的多种多样和祖国的植物资源.....	1
二、植物学的简史和分科概述.....	3
三、学习植物学的目的和方法.....	4

第一篇 被子植物形态结构与功能

第一章 种子和幼苗	6
第一节 种子的组成部分	6
一、胚.....	6
二、胚乳.....	7
三、种皮.....	7
第二节 种子的主要类型	7
一、有胚乳种子.....	7
二、无胚乳种子.....	9
第三节 种子的萌发	10
一、种子萌发的条件.....	11
二、种子萌发的过程.....	13
第四节 幼苗的类型	15
一、子叶出土的幼苗.....	15
二、子叶留土的幼苗.....	17
第二章 植物细胞和组织	20
第一节 植物细胞	20
一、植物细胞的大小和形状.....	21
二、细胞生命活动的物质基础——原生质.....	23
三、植物细胞的基本结构.....	27
四、植物细胞的后含物.....	49
五、植物细胞的分裂.....	52
六、植物细胞的生长和分化.....	56
第二节 植物组织	58
一、植物组织的概念.....	58
二、植物组织的分类.....	59
第三章 被子植物营养器官的形态、结构和功能	83

第一节 根	83
一、根的发生、类型和生理功能	83
二、根系在土壤中的生长和分布	84
三、根尖的分区及其生长动态	85
四、根的结构	91
五、侧根的发生	100
六、根瘤和菌根	102
第二节 茎	107
一、茎的主要生理功能	107
二、茎的基本形态	107
三、芽和分枝	109
四、茎尖的分区及其生长动态	112
五、茎的结构	116
第三节 叶	132
一、叶的主要生理功能	132
二、叶的基本形态	132
三、叶的发生和生长	134
四、叶的解剖结构	134
五、叶的形态结构与生理功能以及与生态条件的关系	144
六、离层和落叶	147
第四节 营养器官之间的互相联系和互相影响	148
一、根、茎、叶之间维管系统的联系	148
二、营养器官之间主要生理功能的相互联系	150
第五节 营养器官的变态	154
一、根的变态	154
二、茎的变态	161
三、叶的变态	166
四、同功器官与同源器官的概念	167
第四章 被子植物生殖器官的形态、结构和功能	168
第一节 花的组成和发生	169
一、花的概念、组成和类型	169
二、花芽分化	172
第二节 雄蕊的发育及其结构	176
一、雄蕊的发育	176
二、花药的发育和结构	176
三、花粉母细胞的减数分裂	179
四、花粉粒的形成和发育	184
五、花粉粒的形态和结构	188
六、花粉的生活力	190
七、花粉植物	191

八、雄性不育植物雄蕊的形态结构特征	192
第三节 雌蕊的发育及其结构	193
一、雌蕊的发育	193
二、胚珠的组成和发育	196
三、胚囊的发育和结构	198
第四节 开花、传粉和受精	202
一、开花	202
二、传粉	203
三、受精	206
四、外界环境条件对传粉、受精的影响	213
第五节 种子的发育过程	214
一、胚的发育	214
二、胚乳的发育	220
三、种皮的发育	222
四、无融合生殖和多胚现象	224
第六节 果实的发育、结构和传播	225
一、果实的发育和结构	225
二、单性结实	227
三、果实和种子的传播	228
第七节 被子植物生活史的概述	228

第二篇 植物界的类群与分类

第五章 植物分类的基础知识	231
第一节 植物分类的方法	232
第二节 植物分类的各级单位	232
第三节 植物的命名法则	233
第四节 植物检索表及其应用	234
第六章 植物界的基本类群	236
第一节 低等植物	237
一、藻类植物	237
二、菌类植物	249
三、地衣植物	259
第二节 高等植物	260
一、苔藓植物	260
二、蕨类植物	265
三、裸子植物	269
四、被子植物	273
第七章 被子植物主要分科概述	274
第一节 被子植物分类主要形态学基础知识	274
一、茎	274

二、叶	275
三、花	279
四、果实	285
第二节 双子叶植物纲	288
一、木兰科	288
二、毛茛科	289
三、十字花科	289
四、石竹科	291
五、蓼科	292
六、藜科	292
七、苋科	293
八、亚麻科	294
九、葫芦科	295
十、山茶科	296
十一、番木瓜科	297
十二、椴树科	298
十三、锦葵科	298
十四、大戟科	300
十五、蔷薇科	301
十六、豆科	304
十七、杨柳科	307
十八、壳斗科	308
十九、桑科	309
二十、荨麻科	309
二十一、大麻科	310
二十二、鼠李科	311
二十三、葡萄科	311
二十四、芸香科	312
二十五、无患子科	313
二十六、胡桃科	314
二十七、伞形花科	315
二十八、柿树科	316
二十九、菊科	316
三十、茄科	317
三十一、旋花科	319
三十二、胡麻科	319
三十三、唇形科	320
第三节 单子叶植物纲	321
一、泽泻科	321
二、凤梨科	321

三、芭蕉科	322
四、百合科	323
五、天南星科	324
六、石蒜科	324
七、兰科	325
八、莎草科	326
九、禾本科	328
第四节 被子植物分类系统简介	333
一、恩格勒系统	333
二、哈钦松系统	334
三、塔赫他间系统	334
第三篇 植物生态、群落和植被	
第八章 植物生态	336
第一节 生态条件	336
一、生态条件与生态环境的概念	336
二、水条件	336
三、温度条件	339
四、光条件	341
五、空气和风	343
六、土壤条件	345
七、地形条件	347
八、生物条件	348
九、人类的影响	349
十、生态条件的综合作用	349
第二节 植物的生活型与生态型	349
一、生活型	349
二、生态型	350
第九章 植物群落	352
第一节 植物群落的概念	352
第二节 植物群落的特征	352
一、种类成分	352
二、成层现象及层片	353
三、多度、盖度	353
四、频度	354
五、群集度	355
六、生活强度	355
七、种的作用及优势种	356
八、物候期	356
九、季相和季相演替	356

十、样地	357
第三节 植物群落与外界环境的联系及植物群落的内部联系	357
一、植物群落与外界环境的联系	357
二、植物群落的内部联系	358
第四节 植物群落的发展	359
一、演替的原因	359
二、演替的趋向和速度	360
第五节 植物群落的分类	361
一、植物群落分类的原则及意义	361
二、中国植被分类简介	361
第十章 自然植物群落的类型及中国植被的分区	364
第一节 自然植物群落的主要类型和分布	364
一、常雨林和红树林	364
二、阔叶常绿林	365
三、竹林	366
四、硬叶林	366
五、季雨林和稀树草原	367
六、夏绿阔叶林	367
七、针叶林	367
八、干草原和草甸	367
九、荒漠	368
十、冻原	369
十一、沼泽植被	369
十二、水生植被	369
第二节 中国植被的分区	370
一、寒温带针叶林区域	370
二、温带针叶阔叶混交林区域	371
三、暖温带落叶阔叶林区域	371
四、亚热带常绿阔叶林区域	372
五、热带季雨林、雨林区域	374
六、温带草原区域	375
七、温带荒漠区域	375
八、青藏高原高寒植被区域	376
第三节 植被研究的展望	377
一、自然植被的充分和合理的利用	378
二、栽培植物群落和经济植物生态学特性的实验研究	378
三、保护生态环境的实验研究	379
附录 英汉植物名词对照	380
主要参考文献	393
编后记	394

绪 论

一、植物界的多种多样和祖国的植物资源

植物的种类是多种多样的,已知植物的总数就有 50 余万种。它们的形态、结构、生活习性以及对环境的适应性各不相同,千差万别。在不同的环境里生长着不同的植物种类。从热带到寒带以至两极地带,从平地到高山,由海洋到大陆,到处都分布着植物,它们的分布或多或少都有一定的地理范围。这些植物体有单细胞的、有群体的,也有多细胞的。这些现象都反映了植物界在漫长的岁月中,从水生到陆生,由低等到高等,由简单到复杂,逐步发展成为绝大多数陆生的、大型而复杂的植物体。植物的多样性来自连续不断的种的形成过程。很多植物在体内具有叶绿素,吸收太阳光能,表现植物所特有的绿色,这些植物被称为绿色植物。另一大类不具叶绿素的,称为非绿色植物。

绿色植物能利用光能,进行光合作用,把无机物合成为有机物。这不仅解决了绿色植物自身的营养,也维持了非绿色植物和人类的生命。通过非绿色植物如细菌、真菌等对死的有机体的分解,即所谓矿化作用,又可将复杂的有机物分解成简单的无机物,再为绿色植物所利用。总之,植物在自然界通过光合作用和矿化作用,也就是合成和分解,使宇宙间物质循环往复,永无止境。

植物界是如此广阔而复杂,有从肉眼看不见的低等植物——藻、菌,到分化程度很高的、结构复杂的高等植物——种子植物。低等植物的结构简单,多以孢子繁殖后代;而种子植物则结构复杂,用种子繁殖后代。植物的生活周期长短也不一致,高等植物中的被子植物有多年生木本和一年生、二年生和多年生的草本。植物界是由最初的原始植物逐渐进化而来的,在进化过程中,有不同的适应方式,随着进化过程的推进,出现结构和功能上的特化,因而有不同的形态和结构,发展成为各式各样的植物,其中种子植物,特别是被子植物是最高等的类群。野生植物经过驯化引种栽培,在长期自然选择和人工选择下,不断起分化定型作用,产生许多新的生态型。

我国地域辽阔,人口众多,历史悠久,植物资源十分丰富,仅种子植物就有 3 万种以上。在我国几乎可以看到北半球覆盖地面的各种类型的植物群。伟大祖国辽阔的土地上,生长着各种各样的天然森林、灌丛、草原和草甸;在中国共产党和人民政府的领导下,我国劳动人民战天斗地,使祖国辽阔的疆土上,遍布着整齐宽广的各种农田、果园、茶园、菜地、药圃和各种经济林场。

最北部的大兴安岭、长白山一带,有耐寒喜光的落叶松,有常绿针叶的云杉、红松。这些树种木质坚硬,是制造船只、车辆、纸张、乐器和建筑的良好用材,林下还分布有闻名中外的药材人参。

华北山地和辽东、山东半岛一带,是全国小麦、棉花和杂粮的重要产区。这一地区盛产苹果、梨、桃、葡萄、枣、核桃、板栗等;还有多种栎树林,树叶作柞蚕饲料,果实(橡子)作纺织浆料,可节约大批粮食。

我国广阔的亚热带地区,是我国水稻主要产区,植物种类非常丰富,仅四川一省就有高等植物近1万种,不仅面积大,而且有闻名世界的活化石植物,如上千年树龄的银杏,木材可供雕刻、制图版或建筑用,果实与叶可作药材;川鄂交界处有适应力强的水杉;川南、桂北山上有100万年前残存的银杉。还可看见各种经济植物如毛竹、油茶树、油桐、乌柏和漆树以及常用的建筑用材——杉木和马尾松。我国西南高山是举世闻名的天然高山花园。

我国广东、海南、广西、福建、台湾和云南南部的热带地区,气候温暖,雨水充沛,四季如春,有利于植物的繁生滋长,仅广东、海南两省就有几千种有花植物。这一地区有菠萝、甘蔗、剑麻农田。山谷植物种类繁多,海湾内有抗击强烈风浪的红树,果树有香蕉、荔枝、龙眼、芒果等,还有橡胶、椰子、咖啡、可可、胡椒、油棕、槟榔等经济作物。台湾省是世界盛产香樟、生产樟脑最多的地方。

南沙群岛由许多岛屿、沙洲、暗礁和暗沙构成。地处赤道热带,热量、水量丰富,热带海洋岛屿气候特征显著。植物主要为银毛树(*Messerschmidia argentea*)和草海桐(*Scaevola sericea*)等组成的灌丛草地。栽培植物有椰子、香蕉和番木瓜等。

西沙群岛是我国南海诸岛的一部分,位于海南省东南的南海中,处于热带海洋,在地理历史上是比较年轻的岛屿。岛上的植物与邻近大陆及大陆岛屿相比显得简单,而具有更多的热带海岸和海岛的植物种类。由于岛屿形成年代不同和自然条件的差异,反映在各岛屿的植物种类分布和数量也有不同程度的差异。经过多次调查和统计,连同栽培植物共有213种。现有栽培植物47种中,除个别以外,是从海南岛运到西沙群岛的,都是我国劳动人民尤其是海南岛的渔民自古以来在西沙群岛生产活动的结果,其中如椰子树的栽培时间最久,面积也最大,分布几乎遍及各个岛屿,成为茂密的椰林。

东北平原和内蒙古高原东部一带,已发展不少农业基地,建立了许多国营农场,有一望无际的大草原。禾本科、豆科牧草,营养价值高。这一带是我国畜牧业主要基地。

青藏高原中东部和南部,有沼泽、湖泊,以及水草丰美、花色瑰丽的草甸。向阳山坡有大片草原。高原谷地种有青稞、冬小麦、荞麦和萝卜。

新疆在固定沙丘或流动沙丘上,也分别生长着供作燃料的琐琐。甘肃和青海的荒漠上,生长着固沙的蒿子和杠柳。荒漠上的绿洲,我国最优质的长绒棉就生长在这里。此外,还有甜蜜的葡萄、西瓜和哈密瓜等果品。戈壁滩上有沙拐枣和麻黄。除麻黄外,其他上述植物都是骆驼的良好饲料。这里还有沙漠地区主要建筑材料的天然树种胡杨,叶子可作骆驼和羊的良好饲料。

在我国西藏西北角高寒荒漠区,也还生长有矮小灌木。有的呈垫状,适应抗风、抗寒、保水的需要。局部湖边、河滩还生长着水杨枝,耐寒耐旱,夏季叶绿花红,构成藏北高原特有的壮丽景色。

植物在任何环境中,几乎都是唯一的、第一级的生产者;有时,又是二级生产者。因此,植物是人类最基本的能源,又是其他能源的潜在来源。当前世界上能源耗费、资源枯竭、人口膨胀、粮食短缺、环境退化与生态因素失调,都与植物资源的是否合理利用与保护有着直接或间接的关系。近年来,在国外又出现了利用植物能源的新技术,采用近代工艺和化学合成,提取植物体内的碳水化合物或碳氢化合物,分离提取液体燃料,如酒精、甲烷、植物精油、

液化树脂等,植物能源的前景十分广阔。

我国的社会主义现代化建设,离不开植物资源的开发和利用。新的栽培植物不断出现,农、工、商业的植物原料逐步扩大,新的药用植物和特殊用途植物不断被发现,都说明植物资源的研究是发展现代化大农业的重要基础之一。但也必须指出,我国森林覆被率约为12%,占世界第121位,属于少林国家。全世界高等植物已陷入濒危状态的种类,有2~2.5万种,占总数10%左右。我国开发森林重砍轻造,木材利用率很低,因此,必须加强保护野生植物,同时大力实行人工繁殖,制定保护和利用的措施。全国人民共同遵守国家的保护条例和法规,植物资源的永续利用是能够做到的。

二、植物学的简史和分科概述

人类关于植物方面的知识积累是和生产实践分不开的。植物学就是在生产实践活动中逐渐建立和成长起来的。

我国是研究植物最早的国家之一。我国劳动人民有丰富的生产经验和独特的创造。就植物科学的考证,就可以证明,远在殷代就开始种麦、黍、稻、粟。古代治病所用的草,就是今日所说的药用植物。各代的志书,都有关于新植物的记述和栽培植物的考证,并有历代相传的药用植物专书,如李时珍的《本草纲目》为国际药学和植物学家所珍视。不仅对于高等种子植物,即使对低等植物如藻类和菌类的利用,也都有较详细的记述。

近百年来,由于封建反动的统治与迫害,和帝国主义的侵略与掠夺,生产力受到严重的压迫和束缚,植物学与其他科学一样,得不到发展。新中国建立后,植物学随着社会主义建设事业的需要和发展,有着广阔光辉的前途。

植物学的分科是基于生产力的发展需要形成的。随着生产力和其他有关学科的发展,植物学已分成许多分科:研究植物外部形态,其中包括个体发育和系统发育中形态建成的规律,以及形态与环境条件关系的称为植物形态学。从广义方面的了解,它是研究植物形态、器官结构及其发育规律的科学。因此,其内容还可包括植物外部形态学、植物解剖学、植物胚胎学和植物细胞学。

植物解剖学是研究植物体的内部结构,个体发育和系统发育中结构建成规律,以及结构与功能和生活条件的关系的科学。

按照植物进化的程序,和植物间的亲缘关系,对植物进行分类的科学称为植物分类学。这一学科的内容,在于确定植物界的总体和部分演化系统、亲缘关系,并且研究植物及其发展。因此,它与了解植物在地质史上的分布和彼此间发展关系的古植物学有比较密切的关系。

植物生理学是研究植物体生命活动及各种过程,以及植物体在个体发育中因生活条件的改变而发生的物质变化的科学。它与研究植物体内发生各种生化变化的植物生物化学有密切的关系。

此外,还有植物遗传学,研究植物的遗传和变异以及人工选择的理论与实践;植物生态学,研究植物体对环境的适应以及植物与环境间的相互影响;地植物学(或植物群落学),研究植物群落以及它们与地理环境间的关系;研究地球上现在和过去植物的传播和分布的科学,称为植物地理学。

众所周知,植物的遗传和变异是由基因的作用造成的。实验研究指出,基因是脱氧核糖核酸类的大分子。脱氧核糖核酸和核糖核酸主要是参与及控制蛋白质分子的合成。蛋白质

是构成活细胞中大部分大分子的。研究这些主要物质及其彼此之间的关系,是一门新兴学科——分子生物学的任务之一。由于仪器的改进和完备,光学显微镜技术的改进,透射电子显微镜和扫描电子显微镜技术的应用,以及生物化学有关理论与技术的发展,使人们对植物细胞结构的认识和理解,有了更高的进展。二十世纪七十年代水湿样品在透射电子显微镜下观察的成功,对植物学研究有重大意义。因为水湿样品比干样品更接近于植物的自然状态。六十年代发展的扫描电子显微镜,加强了植物细胞和组织观察时的立体感,使一般平面图像分辨不清的细微结构,能更清晰地显示出来。我国早已生产了80万倍的透射电子显微镜,高倍的透射电子显微镜的应用,可以看到更加致密的细胞结构,使植物学在研究这些主要物质及其彼此之间的关系方面,逐渐由细胞水平提高到了分子水平。这一进展开辟了探索植物细胞生物学新知识的广阔途径。在生物反应的分子基础上,与有关学科在综合应用方面,将作出更大的贡献,可以卓有成效地为农业生产服务。

植物学的各个分科在其历史发展中,都有其重要意义。为了深入细致地揭露植物的生命现象和发展规律,专门从事某一方面的研究,建立分科是必要的,但是由于生产上的问题是多方面的,也是非常复杂的,因此,各学科在精细分工的基础上,还要结合专业及其有关学科进行协作,开展综合性的研究,才能求得解决。

我国是社会主义国家,在党的领导下,发展综合性科学研究是我国科学特征之一。在综合研究工作中,各门科学密切联系,相互影响,不仅能完成极多的复杂工作和改造自然的任务,而且可以丰富各学科的内容,推动其发展,并使植物学成为为人民服务的有力工具和征服自然的一种武器。

三、学习植物学的目的和方法

生物圈是人类生存的大环境,基本要素由植物构成,植物沟通人与大气圈和岩石圈的联系,起着媒介的作用。植物与我们的生产和生活关系密切。在农业生产中,农、林、牧、副、渔直接或间接与植物有关。轻工业原料是以植物为主的,食品、纺织、造纸、橡胶、制糖、油脂、香料、烟草、医药等工业,也都和植物有密切的关系。甚至炼钢工业的燃料——煤炭,重要能源——石油,都是古代埋在地下的植物变成的。日常生活中可以说衣、食、住、行都离不开植物。我国社会主义建设和人民生活所需的粮、棉、油、麻、丝、茶、糖、菜、烟、果、药、杂,都是利用植物的某些种类而获得的。其他如荒山草坡的利用改造,热带与亚热带植物资源的开发,水土保持,改良土壤,防风固沙,指示探矿,石油开采,环境保护与净化,都与植物密切相关。人们甚至需要依靠植物来监测环境质量的动态变化。此外,农业区划和土地规划等,都与植物学科的工作直接有关。

研究植物的目的在于了解植物的生活习性,掌握植物生长发育、遗传变异和分布的规律,从而控制、利用和改造植物,扩大和充分利用野生植物资源,提高农作物的产量和品质,引种驯化,更好地为我国社会主义建设服务。

植物学是农学类专业中的一门基础课。植物学教材是针对专业培养目标的要求编写的。因此,它是为进一步学好专业基础课和专业课程如植物生理、作物栽培和育种等必要的条件和基础。教材内容以粮、棉、油料、园林和其他主要作物为主,举例说明与栽培和育种必须熟悉的有关植物生长发育中的形态、结构以及传粉、受精等基本知识。所以教材中对形态、结构以及与专业关系密切的细胞与组织部分,作了比较详细的阐述,并且适当地介绍了

一些与农、林、牧业有关的植物学的基本理论和知识。照顾到本学科的系统性和科学性,循序渐进地从种子中的胚体开始,进而讲到细胞和组织,然后在这个基础上讲述营养器官根、茎、叶和生殖器官花、果实、种子的形态和结构。通过对植物界基本类群和分类以及植物生态、群落、植被的介绍,使学生对植物和植物界的进化,植物与环境之间生态关系的规律性,有一个初步的认识。对培养学生从事农、林、牧业生产和研究工作,分析问题和解决问题方面有所帮助。

学习植物学必须具有辩证唯物主义的观点,认识到植物界形形色色的现象是物质运动的形式。各种现象是相互联系、相互制约的,运动形式可以转化。植物的生存和它周围的环境发生着密切的关系。植物与环境之间是相互矛盾、斗争而又是对立统一的辩证关系。我们为了要从植物获得更多的产品和产量,在栽培实践中就必须掌握不同植物生长发育的规律性,以及它们与环境间生态关系的规律性,从而科学地加以控制、促进和调节,因此,必须认真地学习农林科学技术知识,实行科学种田和科学造林。

高等农业院校的植物学与其他生物科学研究方法一样,我们要通过认真观察、系统比较和实验,以了解植物的生活现象、生长发育和形态结构,从而揭露植物的生活、生长与发育和形态与结构变化的表现、规律和本质。学习时,必须强调联系实际,实地观察,针对农学、植保、土化、蔬菜、果树、蚕桑、茶叶等专业的培养目标进行课堂系统讲课和实验实习,亲自操作,按照植物生长发育的过程进行学习,为后继专业有关课程,为今后工作,在植物学基本理论、基本知识和基本技术方面,打下坚实的基础和准备必要的条件。

第一篇 被子植物形态结构与功能

第一章 种子和幼苗

种子植物中的被子植物是进化程度最高的、结构最复杂的高等植物。水稻、小麦、玉米、甘蔗、大豆、桑、茶和甘薯都属于种子植物中的被子植物。一株被子植物通常具有根、茎、叶、花、果实和种子等部分,这些部分叫做器官。器官是生物体由多种组织构成的、能行使一定功能的结构单位。植物的器官各有其不同的功能,如根能从土壤中吸收水分和养料,由茎输送到叶;叶能利用水分、二氧化碳等为原料进行光合作用,制造有机物质,再由茎将这些有机物质输送到植物体各部分去,以营养植物体本身。我们将这些以营养为主要功能的根、茎、叶等器官称为营养器官,它们是产生花、果实和种子的基础。花、果实和种子与植物的生殖有密切关系,一般称为生殖器官。

从种子萌发为幼苗,长成根、茎、叶,这个过程称为营养生长期。当营养生长达到了一定的阶段,便开花、结果,产生种子,繁殖后代,这个过程称为生殖生长期。在营养生长的基础上进行生殖,两个时期是交叠进行的。从种子萌发至新种子的产生,要经历一系列的形态上、结构上和生理上的复杂变化。

种子是由胚珠发育而成的。花生、棉花、油菜、紫云英、柑橘、菜豆、茶和桑的种子,都是由胚珠发育而成的,是真正的种子。水稻、小麦、玉米、高粱、向日葵的籽粒,一般也叫做“种子”,实际上都是果实。因为它们的单粒种子包在果皮之内,特别是禾本科植物的果实,其果皮与种皮相愈合不易分离。

由于被子植物的器官是由种子发育而来的,农作物的生长一般也是从播种开始,所以,学习植物学也首先从种子开始。本章的重点在于学习种子的基本结构及其各部分的功能,联系农业生产实践,说明种子萌发所需要的条件、萌发的过程和萌发时内在变化的基本原理。

第一节 种子的组成部分

种子(seed)在大小、形状和颜色等方面,因植物的种类不同而有较大的差异。如椰子的种子很大,而油菜、萝卜、芝麻的种子则较小,烟草和兰花的种子则更小;大豆、菜豆的种子为肾形,而豌豆、龙眼的种子为圆球形;种子的颜色也有多种,许多禾本科植物的“种子”(颖果)如小麦、粟为黄褐色,大豆为黄色、青色或黑色,荔枝为红褐色等。

种子虽然在形状、大小和颜色各方面存有差异,但其基本结构是一致的。种子里面有胚,部分植物的种子还有胚乳,在种子的外面有种皮。

一、胚

胚(embryo)是构成种子最重要的部分,它是由胚芽(plumule)、胚根(radicle)、胚轴

[hyp(c)tyl]和子叶(cotyledon)四部分所组成。种子萌发后,胚根、胚芽和胚轴分别形成植物的根、茎、叶及其过渡区,因而胚是植物新个体的原始体。

二、胚乳

胚乳(endosperm)是种子内贮藏营养物质的组织。种子萌发时,其营养物质被胚消化、吸收和利用。有些植物的胚乳在种子发育过程中,已被胚吸收、利用,所以这类种子在成熟后无胚乳。

种子内贮藏的营养物质主要有淀粉、脂肪和蛋白质。根据贮藏物质的主要成分,作物的种子可分为淀粉类种子,如水稻、小麦、玉米和高粱等;脂肪类种子,如花生、油菜、芝麻和油茶等;蛋白质类种子,如大豆。下表是几种主要作物风干种子的化学成分,供参考。

几种主要作物风干种子的化学成分(%)

作物种类	水分	碳水化合物(主要是淀粉)	蛋白质	脂肪	粗纤维	灰分
水稻	14.2	75.2	7.7	0.4	2.2	0.5
玉米	12.0	73.0	8.5	4.2	1.3	1.7
高粱 (红) (白)	9.0	72.5	9.9	4.7	1.8	2.5
	13.7	64.0	11.4	5.0	1.6	3.0
小麦	15.0	66.1	13.2	2.0	1.8	1.9
大豆	9.0	25.0	39.2	17.4	4.2	5.0
花生	8.0	22.0	26.2	39.2	2.5	2.0
豌豆	10.0	58.0	24.6	1.0	4.5	2.9

三、种皮

种皮(seed coat, testa)是种子外面的保护层。种皮的厚薄、色泽和层数,因植物种类的不同而有差异。成熟的种子在种皮上通常可见种脐(是种子从果实上脱落后留下的痕迹)和种孔。

第二节 种子的主要类型

根据成熟种子内胚乳的有无,将种子分为有胚乳种子和无胚乳种子两类。

一、有胚乳种子

有胚乳种子(albuminous seed)由种皮、胚和胚乳三部分组成。双子叶植物中的蓖麻、番木瓜、烟草、茄、辣椒、桑、柿等植物的种子和单子叶植物中的水稻、小麦、玉米、高粱、洋葱等植物的种子,都属于这个类型。

(一) 双子叶植物有胚乳种子

1. 蓖麻种子的结构

蓖麻的外种皮光滑并具有花纹,在种子的一端的海绵状突起称为种阜(caruncle),它是