

●生理与病理特点 ●疾病的先兆症状 ●常用经方验方

刘力华 编

名医名家论著 典型病例介绍 医食同源疗法 病后注意事项


妇产科疾病 实用指南

F U C H A N K E J I B I N G S H I Y O N G Z H I N A N


广州出版社



疾病预防早知道



双色图文版



源 强身健体宝典 治病祛疾大全

疾病预防早知道

版社

妇产科疾病 实用指南

F U C H A N K E J I B I N G S H I Y O N G Z H I N A N

双色图文版

刘力华 编



图书在版编目(CIP)数据

妇产科疾病/刘力华编.—广州:广州出版社,2004.12

(疾病预防早知道)

ISBN 7-80655-775-X

I. 妇… II. 刘… III. 妇科病—防治 IV. R771

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 108671 号

书 名 疾病预防早知道——妇产科疾病

出版发行 广州出版社

(地址:广州市人民中路同乐路 10 号 邮政编码:510121)

责任编辑 甘 谦 梁志东

责任校对 杨珊珊

装帧设计 郭 伟

印 刷 广东茂名广发印刷有限公司

(地址:茂名市计星路 60 号 邮政编码:525000)

规 格 787 毫米×1092 毫米 1/16

总 印 张 54.75 印张

总 字 数 1200 千字

印 数 1~5000 套

版 次 2005 年 1 月第 1 版

印 次 2005 年 1 月第 1 次

书 号 ISBN 7-80655-775-X/R·97

总 定 价 80.00 元(全四册)

如发现印装质量问题,影响阅读,请与承印厂联系调换。



妇产科疾病

出版前言



妇产科疾病严重影响妇女的身心健康,它不仅给广大妇女带来肉体和精神上的痛苦,而且给患者家庭带来经济负担。由于妇女具有经、产、带等生理特点,因此,女性的疾病除了内外科病外,还有妇产科病。故历代医家不乏对妇产科疾病有较深研究者,如明代著名医家张景岳结合临床写成的《妇人规》;清代将妇产科称为妇人科或女科,著述颇多。近代涌现出不少妇产科专家教授,如广州中医药大学罗元恺教授、成都中医药大学刘敏如教授、湖北中医学院毛美蓉教授、广西中医学院班秀文教授等,她们对妇产科都有较深的造诣,对妇产科贡献很大,著作颇多。加强妇女保健,及早防治妇产科病,保障广大妇女身心健康,对家庭幸福和社会安定都有重大的意义。为了提高广大读者对妇产科疾病的了解,做好妇产科疾病防治工作,我

们参考了大量有关妇产科的专著和文献,结合自己的临床经验体会编写《妇产科疾病》。其目的是帮助广大妇女掌握自我保健知识,提高自身的抗病能力,减少疾病。

本书共九章,第一章女性生殖器官的解剖生理;第二章月经的生理;第三章妊娠与生育;第四章病因病机;第五章常用治法;第六章常见病的防治;第七章常用经方验方;第八章名医论著;第九章典型病例。本书内容丰富,病种较多,通俗易懂,实用性强,是一本较实用图书。

由于本人水平有限,加上时间仓促,错处在所难免,望广大读者赐教,在此表示衷心的感谢!

编者

2004年8月



妇

产

科

疾

病

目 录

第一章 女性生殖器官的解剖生理 /1

第一节 女性内生殖器 /1

一、卵巢 /1

二、输卵管 /1

三、子宫 /2

四、阴道 /5

第二节 女性外生殖器 /5

第三节 女性乳房 /6

一、位置 /6

二、形态 /6

三、结构 /6

第二章 月经的生理 /8

第一节 月经的生理现象 /8

第二节 月经产生的机理 /9

第三章 妊娠与产育 /13

第一节 受孕机理 /13

第二节 妊娠的生理现象 /14

第三节 临产时的特征 /14

第四节 新产后及哺乳期的生理特点 /15

第四章 病因病机 /16

第一节 病因 /16

一、寒、热、湿邪 /16

二、生活所伤 /17

三、内伤七情 /18

四、体质因素 /18

第二节 病机 /19

一、脏腑功能失常 /19

二、血气失调 /20

三、冲任二脉损伤 /22

第五章 常用治法 /23

- 第一节 补肾滋肾法 /23
- 第二节 疏肝养肝法 /24
- 第三节 健脾和胃法 /24
- 第四节 补益气血法 /25
- 第五节 活血化淤法 /25
- 第六节 理气行滞法 /26
- 第七节 清热凉血法 /26
- 第八节 温经散寒法 /26
- 第九节 利湿除痰法 /27
- 第十节 解毒杀虫法(含外治) /27

第六章 常见病的防治 /28

- 一、月经先期 /28
- 二、月经后期 /29
- 三、月经先后无定期 /30
- 四、月经过多 /31
- 五、月经过少 /33
- 六、经期延长 /34
- 七、痛经 /35
- 八、闭经 /37
- 九、崩漏 /39
- 十、经前乳房胀痛 /40
- 十一、经行头痛 /41
- 十二、经行吐衄 /42
- 十三、经行泄泻 /43
- 十四、更年期综合征 /44
- 十五、带下病 /46
- 十六、妊娠恶阻 /48
- 十七、妊娠腹痛 /49
- 十八、胎漏、胎动不安 /50
- 十九、滑胎 /52
- 二十、异位妊娠 /53
- 二十一、胎萎不长 /55
- 二十二、妊娠肿胀(附:子满) /56
- 二十三、妊娠眩晕 /58
- 二十四、先兆子痫、子痫 /59
- 二十五、妊娠小便淋痛 /61

- 二十六、产后腹痛 /62
- 二十七、产后发热 /63
- 二十八、产后恶露不绝 /65
- 二十九、产后缺乳(附:回乳) /66
- 三十、阴挺 /67
- 三十一、阴痒 /68
- 三十二、症瘕 /69
- 三十三、不孕症 /70
- 三十四、外阴炎 /72
- 三十五、前庭大腺炎 /73
- 三十六、阴道炎 /74
- 三十七、慢性子宫颈炎 /78
- 三十八、盆腔炎 /80
- 三十九、淋病 /82
- 四十、子宫肌瘤 /84
- 四十一、子宫颈癌 /86
- 四十二、子宫内膜癌 /89
- 四十三、卵巢肿瘤 /92
- 四十四、乳腺癌 /95
- 四十五、葡萄胎 /97
- 四十六、绒毛膜癌 /99

第七章 常用经方验方 /102

第一节 月经先期 /102

- 一、平补心脾汤 /102
- 二、圣愈汤 /102
- 三、芩连四物汤 /102
- 四、清化饮 /103

第二节 月经后期 /103

- 一、大营煎 /103
- 二、小营煎 /103
- 三、归地滋血汤 /104
- 四、加减一阴煎 /104
- 五、理阴煎 /104
- 六、当归补血汤 /104

第三节 月经过多 /104

- 一、止血灵 /104
- 二、龟板丸 /105

第四节 崩漏 /105
一、凝血汤 /105
二、椿皮饮 /105
三、固本调元汤 /106
四、大补益当归丸 /106
五、补虚宁血汤 /106
六、胶艾汤 /106
第五节 经期延长 /107
固经汤 /107
第六节 痛经 /107
一、加减乌沉汤 /107
二、乌药汤 /107
三、加味乌药汤 /108
四、温脐化湿汤 /108
五、大延胡索汤 /108
六、活血丹 /108
第七节 闭经 /109
一、归芪调经汤 /109
二、化淤通经散 /109
三、通经散 /109
四、桂仙汤 /109
五、补肾化痰方 /110
六、鳖甲养阴汤 /110
第八节 白带 /110
一、参蛸山药汤 /110
二、六龙固本丸 /110
三、完带汤 /111
四、水陆二仙丸 /111
五、加减归脾汤 /111
六、止带汤 /111
第九节 妊娠恶阻 /111
一、安胎止呕汤 /111
二、归原散 /112
三、中和汤 /112
四、六君子汤 /112
五、加减小参橘皮竹茹汤 /112
六、止吐汤 /113
七、加减六味汤 /113
八、加味胶艾四物汤 /113

第十节 妊娠心烦 /113
加味竹叶汤 /113
第十一节 妊娠腹痛 /113
四君归芍汤 /113
第十二节 妊娠水肿 /114
一、加减补中益气汤 /114
二、全生白术散 /114
第十三节 妊娠高血压综合征 /114
一、一贯煎 /114
二、右归丸 /114
第十四节 子痫 /115
一、加味地黄汤 /115
二、羚羊角散 /115
第十五节 滑胎 /115
一、固冲安胎汤 /115
二、三味固胎饮 /115
三、寿胎丸 /116
四、加味芎归散 /116
第十六节 习惯性流产 /116
一、泰山磐石散 /116
二、女宝丹 /116
三、加味三青饮 /117
四、补肾固胎汤 /117
第十七节 胎位不正 /117
一、气虚散 /117
二、气血双补汤 /117
三、转胎汤 /118
第十八节 死胎 /118
求母丹 /118
第十九节 畸胎 /118
壮神益志保孕汤 /118
第二十节 胞衣不下 /118
一、黑神散 /118
二、小营煎 /119
第二十一节 恶露不绝 /119
一、化淤止漏方 /119
二、蒲黄散 /119
三、生化汤 /120
四、理冲丸 /120

第二十二节 产后少乳 /120

一、少乳煮酒方 /120

二、生乳丸 /121

三、猪蹄汤 /121

四、猪蹄通乳汤 /121

五、增乳汤 /121

六、化乳丹 /122

第二十三节 产后诸风 /122

血风汤 /122

第二十四节 产后腹痛 /122

一、羊肉汤 /122

二、内补当归建中汤 /122

三、千金腹痛方 /123

第二十五节 产后发热 /123

一、三阴煎 /123

二、退虚汤 /123

三、归术保产汤 /123

四、四合汤 /124

第二十六节 产后虚弱 /124

一、五石汤 /124

二、石子汤 /124

三、石子汤 /125

四、生化益气汤 /125

第二十七节 产后虚汗 /125

一、母鸡汤 /125

二、归姜汤 /125

三、当归二黄汤 /125

第二十八节 产后出血不止 /126

一、正经四物汤 /126

二、四物加地榆汤 /126

第二十九节 产后身痛 /126

一、加味止痛汤 /126

二、加味四物汤 /126

第三十节 产后血虚 /127

四物补肝散 /127

第三十一节 产后头痛 /127

归地滋阴汤 /127

第三十二节 子宫脱垂 /127

一、收宫散 /127

二、加减补中益气汤 /127

三、补中益气汤 /128

四、当归黄芪饮 /128

五、固托带脉方 /128

六、二号调经合剂 /128

第三十三节 产后眩晕 /129

立应汤 /129

第三十四节 产后恍惚 /129

四物补心汤 /129

第三十五节 产后水肿 /129

一、加味八物汤 /129

二、驱中汤 /129

三、飞步饮 /129

第三十六节 产后瘫痪 /130

加味四君子汤 /130

第三十七节 产后痹证 /130

趁痛散 /130

第三十八节 产后癰闭 /130

一、加味四君子汤 /130

二、益气启闭汤 /130

三、升麻黄芪汤 /130

四、产后癰闭方 /131

五、黄芪茯苓汤 /131

第三十九节 产后尿频 /131

升阳调元汤 /131

第四十节 产后大便秘结 /131

养血调脾汤 /131

第四十一节 上环后月经过多症 /132

一、逐瘀止血汤加减 /132

二、和血化淤汤 /132

三、益气固冲汤 /132

四、缩宫止漏汤 /132

第四十二节 不孕症 /133

一、广嗣良方 /133

二、养精神玉汤 /133

三、补血养精助孕汤 /133

四、二至丸 /134

五、二益丹 /134

六、化水种子汤 /134

- 七、两地汤加减 /135
- 八、育阴催孕方 /135
- 九、保孕汤 /135
- 十、泽兰赞育汤 /135
- 第四十三节 乳痈 /136
 - 一、桔叶瓜蒌牛蒡汤 /136
 - 二、荆防牛蒡汤 /136
 - 三、碧玉膏 /136
 - 四、八珍仙方活命饮 /137
 - 五、乳痈散 /137
 - 六、瓜蒌牛蒡合透脓散 /137
 - 七、牛蒡子汤 /137
 - 八、乳癖消丸 /138
- 第四十四节 梦交 /138
 - 一、麝角丸 /138
 - 二、加味八珍汤 /138
 - 三、九龙丹 /138
 - 四、归神汤 /138
- 第四十五节 难产 /139
 - 仙传通津救命至灵丹 /139
- 第四十六节 先兆难产 /139
 - 一、安胎饮 /139
 - 二、当归胶艾汤 /139
 - 三、当归寄生汤 /139
 - 四、寿胎丸 /140
 - 五、安胎散 /140
 - 六、生麦安胎饮 /140
 - 七、二黄散 /140
- 第四十七节 乳癖(乳腺瘤) /140
 - 一、补肾化痰祛淤汤 /140
 - 二、消肿汤化裁 /141
 - 三、理气消乳汤 /141
- 第四十八节 乳腺炎 /141
 - 一、赤甘汤 /141
 - 二、活淤解毒汤 /142
 - 三、消乳痈汤 /142
 - 四、逍遥散加味 /142
 - 五、公英绿豆膏 /142
 - 六、乳痈解毒汤 /143

- 第四十九节 乳腺增生症 /143
 - 一、化淤消核汤 /143
 - 二、治乳汤 /143
 - 三、乳宁片 /143
 - 四、消乳汤 /143
 - 五、柴郁汤 /144
 - 六、解郁散结汤 /144
 - 七、乳必安 /144
 - 八、下淤血汤 /145
 - 九、舒肝散结汤 /145
 - 十、清肿汤加味 /145
- 第五十节 宫颈糜烂 /145
 - 一、桂枝加龙骨牡蛎汤 /145
 - 二、官糜康 /146
 - 三、官糜灵Ⅱ号 /146
 - 四、糜烂粉 /146
 - 五、官必宁 /146
 - 六、治糜散 /147
- 第五十一节 回乳 /147
 - 一、回乳剂 /147
 - 二、回乳方 /147
- 第五十二节 盆腔炎 /147
 - 一、大黄清热解毒汤 /147
 - 二、自拟土茯苓败酱草汤 /148
- 第五十三节 慢性盆腔炎 /148
 - 一、大黄牡蛎汤 /148
 - 二、加减红藤汤 /148
 - 三、活血解毒汤 /148
 - 四、丹参蒲香汤 /149
 - 五、慢性盆腔炎方 /149
 - 六、桂枝慈姑汤 /149
 - 七、消痹止痛化滞散 /150
 - 八、祛痛汤 /150
- 第五十四节 卵巢囊肿 /151
 - 一、消散汤 /151
 - 二、桃红四物汤加减 /151
 - 三、化淤消症汤 /151
 - 四、芪防红酱汤 /152
 - 五、加味薏苡仁附子败酱散 /152

六、消积汤 /152

第五十五节 脏躁 /152

一、甘麦大枣汤加味 /152

二、百合地黄汤加减 /153

三、甘麦大枣汤 /153

第八章 名医论著 /154

一、梁剑波名老中医治疗子宫肌瘤临床经验 /154

二、何任教授治疗子宫肌瘤、卵巢囊肿的经验 /156

三、何嘉琳治疗子宫内膜异位症的经验 /158

四、熊辅信教授治疗妇女更年期综合征经验总结 /160

五、魏品康治疗更年期综合征经验 /162

六、中医药治疗子宫肌瘤 32 例 /164

七、温官化淤法治疗痛经 100 例 /165

八、中西医结合治疗霉菌性阴道炎 45 例临床观察 /167

九、中西医结合治疗外阴白色病损 58 例 /168

十、中药内服外敷治疗纤维瘤 35 例 /169

十一、内外合治子宫内膜异位症 35 例临床观察 /170

十二、活血化淤法治疗乳房纤维腺瘤 12 例疗效观察 /171

十三、中医药治疗不孕症 138 例疗效观察 /172

十四、中西药合用治疗妊娠早期先兆流产 /176

十五、中西医治疗免疫性不孕症 18 例 /177

十六、消核膏治疗少女乳房异常发育症 20 例 /178

十七、调补肝肾法治疗无排卵不孕症 52 例 /179

十八、疏肝解郁法治疗高泌乳素血症 170 例 /180

十九、化淤固冲法治疗放环后子宫出血 18 例 /181

二十、中医辨证分型治疗女性尿道综合征 /183

二十一、补肾化淤法治疗子宫内膜异位症 32 例 /185

二十二、八珍汤加减矫治胎位不正 73 例 /186

二十三、固胎汤治疗先兆流产 101 例 /187

二十四、蜈蚣杀胚治疗宫外孕 30 例疗效观察 /188

二十五、五淋安胎饮治疗妊娠期尿路感染 35 例 /189

二十六、复方丹参合钙剂预防妊娠高血压综合征的研究 /190

二十七、症病结合治疗女性抗精子抗体阳性 86 例 /193

二十八、十味酞散加减治疗产后风湿痛 41 例 /195

二十九、少腹逐淤汤直肠灌注治疗子宫肌症 32 例 /196

三十、中药保留灌肠治疗妇女便秘 72 例 /197

三十一、红藤薏苡仁败酱散治疗盆腔炎性包块 30 例 /199

第九章 典型病例 /201



第一章 女性生殖器官的解剖生理

女性生殖器分为内生殖器和外生殖器。内生殖器包括卵巢、输卵管、子宫和阴道。卵巢为产生卵子和分泌女性激素的生殖腺；输卵管、子宫和阴道为生殖管道。外生殖器即女阴。

第一节 女性内生殖器



一、卵巢

卵巢在盆腔内,为成对的实质性器官,呈扁卵圆形。分内外侧面、前后缘和上下端。外侧面贴于盆腔侧壁,位于髂内、外动脉起始部之间的夹角处,内侧面朝向子宫。外侧端借卵巢悬韧带与盆腔壁相连,内侧端借卵巢固有韧带连于子宫。后缘游离,前缘有系膜附着,并有血管、淋巴管和神经等出入。(图1-1)

卵巢的大小和形状随年龄的增长而有

所改变。正常卵巢大小为4厘米×3厘米×1厘米,重5~6克,呈灰白色。幼女的卵巢表面光滑。青春期后,由于多次排卵,卵巢表面形成瘢痕,显得凹凸不平。性成熟期卵巢最大,35~40岁卵巢开始缩小,50岁左右随月经停止而萎缩。



二、输卵管

输卵管为一对细长弯曲的肌性管道,长约8~14厘米,直径约5毫米。输卵管位于子宫底两侧,包裹在子宫阔韧带上缘内。(图1-1)




图 1-1 女性内生殖器

输卵管全长由内侧向外侧分为下列四个部分：

1. 输卵管子宫部 为贯穿子宫壁的部分，很短，其内侧端有输卵管子宫口通子宫腔，外侧续连于输卵管峡部，又称输卵管间质部。

2. 输卵管峡部 短而狭窄，长约 2~3 厘米，输卵管结扎术多在此部进行。此段向外侧移行为壶腹部。

3. 输卵管壶腹部 此段管腔膨大成壶腹状，约占输卵管全长的 2/3，卵子通常在此部受精。若受精卵未能移入子宫，而在输卵管内发育，即成宫外孕。

4. 输卵管漏斗部 为输卵管的外侧端，管腔扩大成漏斗状，漏斗中央有输卵管腹腔口，与腹腔相通。漏斗的周缘为许多指状突起，称为输卵管伞端，多为 1~1.5 厘米，有“拾卵”作用。



三、子宫

子宫是一壁厚的肌性器官，具有产生月经和孕育胎儿的作用。其形态、结构及位置随年龄、月经周期和妊娠情况的变化而变化。（图 1-2）

1. 子宫的形态 成年未孕的子宫，呈前后略扁、倒置的鸭梨形，长约 8 厘米，最大宽径约 4 厘米，壁厚约 2 厘米。子宫可分为三部分：上端在两侧输卵管子宫口以上的圆凸部分称为子宫底；下端细圆的部分称为子宫颈，为癌的好发部位；底与颈之间的部分称为子宫体。子宫颈又分为两部分：子宫颈伸入阴道内的部分，称为子宫颈阴道部；在阴道以上的部分，称为子宫阴道上部。子宫颈与子宫体连接的部位，稍狭细，称为子宫峡部，在非妊娠期，此部不明显。在妊娠期，子宫峡部渐扩张伸长，形成子宫下段。



子宫的内腔甚为狭窄,分为上、下两部。上部位于子宫体内,称为子宫腔;下部在子宫颈内,称为子宫颈管。子宫腔在额状位呈前后略扁的三角形腔隙,其基底两侧角通输卵管,尖向下通子宫颈管。子宫颈管呈梭

形,其上口通子宫腔,下口称为子宫口,通阴道。未产妇的子宫颈口为圆形或椭圆形,边缘光滑整齐。分娩后,子宫颈口变为横裂状。子宫口的前、后缘分别称为前唇和后唇,后唇稍长,位置较高。





图 1-2 子宫各部

2. 子宫的结构 子宫壁分为三层。外层为浆膜,是腹膜脏层;中间为肌层,很厚,由平滑肌构成;内层为黏膜,称为子宫内膜。子宫底和体部的黏膜随月经周期而有变化,呈周期性的增生和脱落,约 28 天一个周期。子宫颈管的黏膜不随月经周期变化。

3. 子宫的位置 子宫位于小骨盆的中

央,在膀胱和直肠之间。成年女子子宫的正常方位为前倾和前屈位。前倾是指整个子宫向前倾倒,子宫颈与阴道之间近乎成直角。子宫底、体比子宫颈更向前倾斜,在子宫颈与子宫体之间形成一钝角,此谓之子宫前屈。子宫的活动性较大,随膀胱和直肠的充盈程度而影响其位置。(图 1-3)



女性膀胱在骨盆的位置低于男性，尿道长度约是男性的五分之一，因此常导致尿道感染。由于子宫伏于膀胱之上，怀孕期子宫扩大，常引起排尿次数增加。

图 1-3 女性膀胱和尿道

4. 子宫的固定装置 对子宫正常位置的固定有下列四对韧带起着重要作用。(图 1-4)




图 1-4 子宫各韧带(前面观)

(1) 子宫阔韧带。在子宫的两侧, 延伸达到骨盆壁, 形成一对双层腹膜皱襞。分为前、后两层。其内侧缘附于子宫, 并移行为子宫前、后的腹膜; 外侧缘连于小骨盆侧壁, 移行为盆壁的腹膜。下缘附于盆底; 上缘游离, 其内包有输卵管。阔韧带前层覆盖子宫圆韧带, 后层包被卵巢, 两层之间有血管、淋巴管、神经和结缔组织等。阔韧带可限制子宫向侧方移位。

(2) 子宫圆韧带。是一对圆索, 由平滑肌和结缔组织构成。起于子宫外侧缘、输卵管近端的前下方, 在子宫阔韧带前层覆盖下, 走向前外侧, 经过腹股沟管, 止于大阴唇的前端。此韧带是维持子宫前倾位的主要结构。

(3) 子宫主韧带。由结缔组织和平滑肌纤维构成, 位于子宫阔韧带的下部两层之间, 自子宫颈两侧连至盆腔侧壁, 其主要作用是固定子宫颈, 防止子宫向下脱垂。

(4) 宫骶韧带。由平滑肌和结缔组织构成。起于子宫颈后面, 向后绕过直肠, 附于骶骨前面。此韧带具有牵引子宫颈向后上的作用, 维持子宫前屈位。



四、阴道

阴道为前后略扁的肌性管道, 连接子宫和外生殖器, 是导入精液、排出月经和娩出胎儿的通道。阴道的下端开口于阴道前庭, 称为阴道口。阴道口周缘有处女膜。阴道的上端较宽, 围绕子宫颈下部, 二者间形成环状的腔隙, 称为阴道穹, 可分为前、后部及两侧部, 以后部为最深。后部与直肠子宫陷

凹紧密相邻, 彼此之间仅隔有阴道壁和一层腹膜。当直肠子宫陷凹有积液时, 可经阴道穹后部进行穿刺或引流。阴道前方邻接膀胱底和尿道, 后方邻接直肠。

第二节 女性外生殖器

女性外生殖器又称外阴(图1-5), 包括以下结构:

1. 阴阜 为耻骨联合前方的皮肤隆起区, 皮下脂肪较多, 青春期开始生长阴毛, 分布呈尖端向下的三角形。

2. 大阴唇 是一对纵行隆起的皮肤皱襞, 起自阴阜, 止于会阴。大阴唇皮下脂肪含丰富血管、淋巴管和神经, 若局部受伤、出血, 易形成大阴唇血肿。

3. 小阴唇 位于大阴唇的内侧, 为一对较薄的皱襞, 表面光滑无毛。

4. 阴道前庭 为两侧小阴唇之间的裂隙。其前方有尿道口, 后方有阴道口。在小阴唇与处女膜之间的浅沟内, 相当于小阴唇中1/3与后1/3交界处, 有前庭大腺的开口。

5. 阴蒂 位于两小阴唇顶端的联合处, 由两个阴蒂海绵体构成, 相当于男性的阴茎海绵体, 其后端为阴蒂脚, 附于耻骨弓, 左右两脚向前互相结合成阴蒂体, 表面盖有阴蒂包皮。阴蒂的前端露于表面的部分, 称为阴蒂头。

6. 前庭球 又称球海绵体, 位于前后两侧呈马蹄铁形, 两外侧部较大, 位于大阴唇的皮下, 中间部细小。

7. 前庭大腺 位于阴道口的两侧, 左右

各一,形如豌豆,其排泄管向内侧开口于小阴唇与处女膜之间的沟内。




图 1-5 女性外生殖器

第三节 女性乳房

乳房为哺乳类动物特有的结构。人的乳房为成对的器官,男性不发达,女性于青春后期开始发育生长,妊娠和哺乳期的乳房有分泌活动,老年妇女乳房萎缩。(图 1-6)



一、位置

乳房位于胸前部,在胸大肌及其筋膜的表面。成年未孕妇女的乳头平对第 4 肋或第 5 肋间隙。



二、形态

成年女子尚未哺乳的乳房呈半球形,紧

张而富有弹性。乳头为乳房中央的圆形突起,其表面有输乳管的开口。乳头周围有一圈颜色较深的区域,称为乳晕。



三、结构

乳房由皮肤、乳腺组织构成。乳腺组织被脂肪组织分隔为 15 ~ 20 个乳腺叶,以乳头为中心呈放射状排列。每个腺叶有一条排泄管,称为输乳管,由该腺叶中各乳腺小叶的导管汇合而成,开口于乳头。临床进行乳房浅部脓肿切开手术时,应尽量采用放射状切口,以免损伤乳腺叶和输乳管。




图 1-6 乳房的外观