



临床执业医师 资格考试 模拟试卷

主 编 王海波 陈鹤汀 金 宇

★名师教案，
凝聚考点
精华

★点津历年
考题

★2006医考
冲刺宝典

LINCHUANG ZHIYE YISHI ZIGE KAOSHI
MONI SHIJUAN



军事医学科学出版社

临床执业医师资格考试模拟试卷

主 编	王海波	陈鹤汀	金 宇	
副主编	刘智勤	朱惠学	宋书江	张运海
编 者	李永辉	康文丽	谢雪兰	田自力
	马 涛	李鹤飞	张军华	姚文双
	贾 浩			

军事医学科学出版社
· 北 京 ·

内 容 提 要

本书与《临床执业医师资格考试历年考点(题)纵览》配套使用,通过分析历年考题,为广大考生设计了五套仿真试卷,从题量到难度,保持真题的风格,希望考生在规定的时间内把这套试卷完成。如果您这套试卷正确率在60%以上,通过2006年医考将没有任何障碍。

图书在版编目(CIP)数据

临床执业医师资格考试模拟试卷/王海波,陈鹤汀,金宇主编.

-北京:军事医学科学出版社,2006

ISBN 7-80121-783-7

I. 临… II. ①王… ②陈… ③金… III. 临床医学-医师-资格考核-习题 IV. R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2006)第 005876 号

出 版:军事医学科学出版社

地 址:北京市海淀区太平路 27 号

邮 编:100850

联系电话:发行部:(010)63801284

63800294

编辑部:(010)66884418;66884402 转 6210,6216,6213

传 真:(010)63801284

网 址:<http://www.mmsp.cn>

印 装:华润印装厂

发 行:新华书店

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:15

字 数:465 千字

版 次:2006 年 4 月第 1 版

印 次:2006 年 4 月第 1 次

定 价:25.00 元

本社图书凡缺、损、倒、脱页者,本社发行部负责调换

前 言

据考试成绩结果统计分析,正规五年制普通本科毕业生参加临床执业医师资格考试,通过率几乎能达到 90%,正规三年制普通专科毕业生参加临床助理医师资格考试,通过率也在 70% 以上,但两年全国平均通过率还不到 40%,淘汰对象主要集中于非正规普通高等教育毕业生和低学历者。反差如此之大,原因有二:一是不能否认有相当部分考生接受的医学教育并没有完全达到医师资格考试应有的水平;二是我们更不能否认相当部分的考生复习方法不对路。复习方法有误表现为三个方面:一是思想上不够重视,不精心全面准备,考前由突击背重点的学习习惯延续到了医考,尤其是基层单位考生表现得更为突出,通过率极低很正常;二是没有处理好教材与练习题的关系,由于充斥市场的所谓“全真模拟”、“冲刺”推波助澜,误导考生背习题答案,其结果可想而知;三是考生指望所谓“权威老师”划重点,于是响应考生的需要,有人吹起了号角,结果往往是几乎没有一道题被划中。其中的道理很简单,因为某些所谓的权威连真正的考试题是什么样都没见过。在我们推出《临床执业医师资格考试历年考点(题)纵览》以前,除非经历过考试的考生,极少有人能见到往年真题全貌。所以能称之为“全真模拟”的试卷必须建立在历年真题的基础上才有效。因此考生以前做过的所谓“全真模拟”、“冲刺”试卷起不到应有的作用也在情理之中。为打破这种现象,我们在推出《临床执业医师资格考试历年考点(题)纵览》之后,根据大纲要求,通过分析历年考题,为广大考生设计了五套仿真试卷,从题量到难度,力争保持真题的风格,希望考生在规定的时间内把这套试卷完成。如果您这套试卷正确率在 60% 以上,通过 2006 年医考将没有任何障碍。

为满足考生需要阅览真题全貌的要求,我们把其中一年执业医师资格考试真题挂到了网上(网址:yixue. bdedu. cn,网络实名:医学考试),欢迎大家到网上与我们交流。

编 者
2006 年 2 月

目 录

模拟试卷一	(1)
模拟试卷二	(45)
模拟试卷三	(90)
模拟试卷四	(137)
模拟试卷五	(185)

模拟试卷一

第一单元

A1型题

1. 下列哪种改变是新月体性肾小球肾炎的主要病变
 - A. 单核细胞渗出于肾球囊内
 - B. 中性粒细胞渗出于肾球囊内
 - C. 肾球囊壁层上皮细胞增生
 - D. 血管内皮细胞坏死
 - E. 毛细血管玻璃样变性
2. 关于冷脓肿的叙述,下列哪项是正确的
 - A. 骨结核时,侵犯周围软组织形成的结核性“脓肿”
 - B. 化脓性细菌所引起组织深部的化脓性炎症
 - C. 骨结核时合并化脓性炎症
 - D. 机体抵抗力下降时细菌引起的化脓性炎症
 - E. 非致热细菌引起的化脓性炎症
3. 下列何种变化是绒毛癌的病理特点
 - A. 镜下见多数坏死病灶内有少量绒毛结构
 - B. 绒毛水肿,滋养细胞呈高度增生
 - C. 间质血管血栓形成,细胞间变
 - D. 多量出血坏死组织,大量滋养细胞增生,没有绒毛结构
 - E. 大量滋养细胞高度增生并侵入子宫肌层,仅见少量绒毛结构
4. 关于酶的不可逆抑制作用,错误的是
 - A. 抑制剂多为有毒物质
 - B. 抑制剂结构与底物相似时抑制加强
 - C. 抑制剂可破坏酶催化功能
 - D. 抑制剂与酶不易分离
 - E. 抑制剂一般为活细胞中产生
5. 下列哪项特征与金黄色葡萄球菌的致病力无关
 - A. 菌落为深黄色
 - B. 耐热核酸酶阳性
 - C. 形成菌落溶血现象
 - D. 胆汁溶菌试验阳性
 - E. 血浆凝固酶阳性
6. 下列哪组临床表现应考虑幽门梗阻
 - A. 上腹膨隆, Traube 区消失
 - B. 上腹肌紧张、压痛、反跳痛,肝浊音界消失
 - C. 呕吐臭食糜,可见肠型
 - D. 呕吐酸腐食物,可见胃型
 - E. 呕吐,黄疸,右肋下可及包块
7. 下列哪种细菌易被溶菌酶杀死
 - A. 大肠杆菌
 - B. 淋球菌
 - C. 葡萄球菌
 - D. 沙门氏菌
 - E. 脑膜炎双球菌
8. “冬眠合剂”是指下述哪一组药物
 - A. 苯巴比妥 + 异丙嗪 + 吗啡
 - B. 苯巴比妥 + 氯丙嗪 + 吗啡
 - C. 氯丙嗪 + 异丙嗪 + 吗啡
 - D. 氯丙嗪 + 异丙嗪 + 哌替啶
 - E. 氯丙嗪 + 阿托品 + 哌替啶
9. 脊休克
 - A. 是脊髓受损伤造成
 - B. 断面以下脊髓反射、感觉和随意运动可以恢复
 - C. 恢复后第二次横切脊髓,不再产生休克
 - D. 恢复的速度与动物进化程度无关
 - E. 恢复后,所有反射都亢进
10. 关于竞争性抑制作用的叙述,正确的是
 - A. 抑制剂结合于酶活性中心以外部位
 - B. 抑制剂结构与底物不相似
 - C. K_m 减小, V_{max} 减小
 - D. 增加 $[S]$ 对抑制作用无影响
 - E. K_m 增大, V_{max} 不变
11. 红细胞渗透脆性增加见于以下哪种疾病
 - A. 遗传性球形红细胞增多症
 - B. 血红蛋白 H 病
 - C. β 珠蛋白生成障碍性贫血
 - D. 缺铁性贫血

- E. 慢性疾病的贫血
12. 急性胃肠炎引起的呕吐属于
- 中枢性呕吐
 - 反射性呕吐
 - 前庭障碍性呕吐
 - 神经紊乱性呕吐
 - 以上都不是
13. 宫内节育器的避孕机制最主要是
- 阻止精子和卵子相遇
 - 阻止精子进入输卵管
 - 影响卵巢排卵
 - 阻止受精卵着床
 - 阻止卵子由卵巢进入子宫
14. 治疗室性早搏首选的抗心律失常药物是
- 利多卡因
 - 普萘洛尔
 - 胺碘酮
 - 维拉帕米
 - 苯妥英钠
15. 幼儿时生长素分泌不足可导致
- 呆小症
 - 侏儒症
 - 巨人症
 - 向心性肥胖
 - 肢端肥大症
16. 某一 DNA 片段, 其中一股的碱基序列为 5' - AACGTT - 3', 另一股应为
- 5' - TTGCAA - 3'
 - 5' - AACGTT - 3'
 - 5' - UUGCAA - 3'
 - 5' - AACGUU - 3'
 - 5' - ACGATT - 3'
17. 关于 TAC 运行一周的叙述错误的是
- 产生 2 分子 CO_2
 - 产生 3 分子 $\text{NADH} + \text{H}^+$
 - 消耗 1 分子乙酰 CoA
 - 有 2 次底物水平磷酸化
 - 产生 24 分子 ATP
18. 下列疾病均可引起颈部姿势和运动的异常, 除了
- 先天性斜颈
 - 颈部外伤
 - 颈椎病
 - 颈静脉怒张
 - 落枕
19. 十二指肠球部溃疡典型的腹痛特点
- 中上腹痛, 空腹痛及夜间痛为主
 - 中上腹痛, 餐后加重
 - 右上腹痛, 放射至腰背部
 - 全腹痛伴发热
 - 中上腹痛, 前屈位缓解
20. 高血压伴阵发性室上性心动过速宜选用哪种抗心律失常药
- 普鲁卡因酰胺
 - 奎尼丁
 - 维拉帕米
 - 胺碘酮
 - 心律平
21. 强直性肌张力增高(铅管样强直)的病变部位在
- 锥体外系
 - 锥体束
 - 小脑
 - 脊髓前角
 - 以上都不是
22. 下列哪种不是病毒性心肌炎的病原体
- 柯萨奇病毒
 - 埃可病毒
 - 脊髓灰质炎病毒
 - 支原体
 - 流感病毒
23. 狂犬病的潜伏期较长, 如及早接种疫苗, 可以预防发病。目前使用的狂犬疫苗属于
- 减毒疫苗
 - 类毒素疫苗
 - 重组疫苗
 - 内毒素疫苗
 - 灭活疫苗
24. 不明种类有机磷杀虫药中毒洗胃液首选
- 皂水
 - 清水
 - 高锰酸钾液
 - 苏打水
 - 糖水
25. 女, 40 岁, 腹部触及肿块已 3 个月, 无任何不适, 近来腹部膨大, B 超示盆腔肿块伴腹水。胸片示右侧胸水。妇科检查宫颈光滑, 宫体未触清, 盆腔内触及不规则质硬肿块, 偏左侧如孕 3 月大小、活动。患者可能为下列何项疾病
- 库肯勃氏瘤

- B. 麦格氏综合征
C. 卵巢恶性肿瘤
D. 子宫多发性肌瘤
E. 子宫内瘤
26. 下列哪种药物对心房纤颤无效
A. 洋地黄毒甙
B. 地高辛
C. 奎尼丁
D. 胺碘酮
E. 利多卡因
27. 肾小球滤过率主要取决于
A. 滤过膜通透性的改变
B. 滤过面积的改变
C. 囊内压的改变
D. 肾血浆流量的改变
E. 全身血浆胶体渗透压的改变
28. 梅毒的病原体是
A. 支原体
B. 病毒
C. 真菌
D. 立克次体
E. 螺旋体
29. 庆大霉素与速尿合用时可引起
A. 抗菌作用增强
B. 肾毒性减轻
C. 耳毒性加重
D. 利尿作用增强
E. 以上均对
30. 女性患者出现呕吐, 并有眩晕及眼球震颤, 最可能是
A. 胰腺炎
B. 肿瘤化疗后
C. 早孕反应
D. 美尼尔病
E. 脑出血
31. 加压素合成部位在
A. 腺垂体
B. 神经垂体
C. 肾上腺
D. 下丘脑室旁核
E. 下丘脑视上核
32. 中枢神经系统中的哪一部位是地西洋抗焦虑的作用部位
A. 纹状体
B. 边缘系统
C. 大脑皮层
D. 下丘脑
E. 中脑网状结构
33. 维持身体姿态的最基本反射是
A. 屈肌反射
B. 腱反射
C. 节间反射
D. 翻正反射
E. 肌紧张反射
34. 下列哪种不是参加丙酮酸氧化脱羧反应的辅酶
A. 硫辛酸
B. HSCoA
C. TPP
D. NAD^{++}
E. FMN
35. 甲型肝炎病毒的核酸类型是
A. 负股 RNA
B. 正股 RNA
C. 单股 DNA
D. 双股 DNA
E. DNA-RNA 二聚体
36. 上消化道出血最常见的原因是
A. 消化性溃疡
B. 食管-胃底静脉曲张破裂
C. 急性胃黏膜病变
D. 血友病
E. 胆道结石
37. 葡萄胎在清宫术时应注意的事项中, 下列哪项是错误的
A. 应采用负压吸引术
B. 必须在输液备血条件下进行
C. 吸宫前应充分扩张宫颈
D. 催产素静滴应在宫口充分扩大后应用
E. 组织病理检查的取材尽可能取宫腔中央的组织
38. 下列哪种药物不能以口服给药方式治疗心律失常
A. 奎尼丁
B. 普鲁卡因酰胺
C. 苯妥英钠
D. 利多卡因
E. 异丙吡胺
39. 气道狭窄患者, 下列哪项叙述是正确的
A. 肺活量和时间肺活量均正常

- B. 肺活量和时间肺活量均减少
C. 肺活量的时间肺活量均增大
D. 肺活量减少而时间肺活量正常
E. 肺活量正常而时间肺活量减少
40. 物质在膜蛋白质帮助下,顺浓度梯度或电位梯度通过细胞膜的过程是属于
A. 单纯扩散
B. 易化扩散
C. 主动转运
D. 入胞
E. 出胞
41. 下列哪种细菌为革兰阴性菌
A. 葡萄球菌
B. 微球菌
C. 脑膜炎球菌
D. 肺炎球菌
E. 都不是
42. 风湿性心瓣膜病二尖瓣狭窄不可能有的心电图改变为
A. 左房肥大, P 波增宽超过 0.11 秒, 有切迹
B. 心房颤动
C. 右室肥大的心电图图形
D. 左室肥大的心电图图形
E. 右束支传导阻滞
43. 关于输卵管, 哪项正确
A. 是精子游走的通道
B. 与圆韧带临近
C. 包括间质部、峡部、壶腹部、漏斗部
D. 黏膜层有三种细胞
E. 黏膜无周期性变化
44. 有机磷酸酯类急性中毒时, 胆碱酯酶被“老化”后, 使用解磷定, 可使该酶
A. 完全恢复活性
B. 部分恢复活性
C. 活性先恢复后抑制
D. 不能恢复活性
E. 活性缓慢恢复
45. 引起抗利尿激素分泌的最敏感因素是
A. 循环血量减少
B. 血浆晶体渗透压升高
C. 血浆胶体渗透压升高
D. 痛刺激
E. 寒冷刺激
46. 关于 K_m 的意义, 正确的是
A. $1/K_m$ 越小, 酶与底物亲和力越大
B. 当 $[S]$ 相同时, 酶的 K_m 越小, 反应速度 V 越大
C. 当 $v = 1/3 V_{max}$ 时, $K_m = [S]$
D. K_m 单位是 $mmol/min$
E. K_m 为酶的比活性
47. 杀灭包括芽孢在内的微生物的方法称为
A. 消毒
B. 无菌
C. 防腐
D. 灭菌
E. 杀菌
48. 正常情况下, 前囟门应在 12 ~ 18 个月闭合, 如过早发生, 可致
A. 方颅
B. 变形颅
C. 巨颅
D. 小颅
E. 以上都不是
49. 维持子宫前位的主要韧带是
A. 子宫圆韧带
B. 阔韧带
C. 卵巢固有韧带
D. 主韧带
E. 子宫骶骨韧带
50. 下列哪种情况能用哌替啶而不能用吗啡
A. 镇痛
B. 镇咳
C. 止泻
D. 人工冬眠
E. 心源性哮喘
51. 关于胎盘激素的作用, 下述哪项正确
A. HCG 作用于黄体, 使妊娠黄体在整个孕期能维持妊娠
B. 胎盘生乳素有促进乳腺泡发育, 促胰岛素生成作用, 协调糖、脂肪与蛋白质代谢等作用
C. 妊娠末期雌三醇(血、尿中)值约为非孕妇女的 100 倍
D. 催产素酶是垂体分泌的催产素活化物
E. 孕期母体雌激素的产生有胎盘参加而无胎儿参加
52. 不参与肝甘油三酯合成的化合物为
A. α -磷酸甘油
B. 磷脂酸
C. CDP-DG

D. 脂酰 CoA

E. DG

53. 10 mg/日吗啡,连用一个月下述哪种作用不会产生耐受性

A. 镇痛

B. 镇咳

C. 缩瞳

D. 欣快

E. 呼吸抑制

54. 下列哪种细菌标本送验时需保温而不是冷藏

A. 肺炎球菌

B. 脑膜炎球菌

C. 志贺氏菌

D. 布氏杆菌

E. 肠炎耶氏菌

55. 目前常用的 α 干扰素主要产自

A. 人成纤维细胞

B. 人神经母细胞

C. 人红细胞

D. 人白细胞

E. 人血小板

56. 脂性肾病的临床特点是

A. 中度血尿

B. 轻度高血压

C. 高度水肿

D. 轻度蛋白尿

E. 高度选择性蛋白尿

57. 在病因推断过程中,反映某个因素与疾病的关联强度常用下列哪个指标

A. 特异危险度

B. 相对危险度

C. 归因危险度

D. 人群归因危险度

E. 病因分值

58. 流行病学实验研究在选择研究对象时,下列哪项是错误的

A. 被选择的对象应该能够从实验研究中受益

B. 选择预期发病率较高的人群作为实验研究对象

C. 选择预期发病率较低的人群作为实验研究对象

D. 选择依从性好的人群作为实验研究对象

E. 已知实验对其有害的人群不能选作研究

对象

59. 下列哪个方法不是为控制病例对照研究中的偏倚的

A. 尽量在社区随机化选择病例

B. 如以医院为基础,则尽量在多个医院中选择病例

C. 尽量选用新发病例

D. 尽量提供记忆目标,减少回忆偏倚

E. 尽量选用现患病例

60. 根据疾病监测的定义,下面不正确的说法是

A. 疾病监测是一个连续的过程

B. 疾病监测用来描述疾病的分布

C. 疾病监测与疾病报告有关

D. 疾病监测应对某病传播的可能性予以监测

E. 疾病监测用来观察疾病的发生

61. 以下哪一项不是潜伏期的流行病学意义

A. 其长短影响流行特征

B. 决定预防措施

C. 是决定病人隔离期限的重要依据

D. 评价某项预防措施的效果

E. 判断传染源与续发病例的关系

62. 预防接种的流行病学效果评价指标是

A. 患病率

B. 发病率

C. 病死率

D. 保护率

E. 阳性率

63. 疫苗可产生哪一类免疫

A. 自然自动免疫

B. 自然被动免疫

C. 人工自动免疫

D. 人工被动免疫

E. 非特异性抵抗力

64. 下列关于均数标准差与标准误的关系的说法哪种是正确的

A. 两者相等

B. 两者无关

C. 标准差小于标准误

D. 标准差越小,标准误越小

E. 标准误小于标准差

65. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 当 μ 恒定时, σ 越大

A. 曲线沿横轴越向左移动

B. 观察值变异程度越小,曲线越“瘦”

C. 观察值变异程度越大,曲线越“胖”

- D. 曲线沿横轴越向右移动
E. 曲线形状和位置不变
66. 就大多数病例对照研究而言,它们不具备下列哪种特点
A. 耗资较少
B. 可估计相对危险度
C. 可计算发病率
D. 选择没有疾病的人作对照
E. 估计暴露史时可能出现偏倚
67. 利用频数分布表及如下公式 $M = L + ifx(n/2 - \sum fL)$ 计算中位数时
A. 要求数据对称分布
B. 要求数据偏态分布
C. 要求数据对数正态分布
D. 不要求组距相等
E. 要求组距相等
68. 环境因素联合作用通常有 4 种类型,下列哪种不属于联合作用
A. 相加作用
B. 独立作用
C. 协同作用
D. 拮抗作用
E. 累积作用
69. 下列关于污染物在大气中转归的叙述中哪项最全面
A. 自净、转移、形成二次污染、转化成二次污染物
B. 自净、转移、转化成二次污染物、稀释
C. 自净、形成二次污染、转化成二次污染物、稀释
D. 自净、转移、挥发、沉降
E. 转移、形成二次污染、转化成二次污染物
70. 水中某些污染物可通过水体中的生物放大作用,使生物体内含量大大高于水体中的浓度
A. 水生生物
B. 食物链
C. 生物转化
D. 生物迁移
E. 氧化还原反应
71. 在病因推断过程中,反映某个因素与疾病的关联强度常用下列哪个指标
A. 特异危险度
B. 相对危险度
C. 归因危险度
D. 人群归因危险度
E. 病因分值
72. 当碘的摄入量低于 $40 \mu\text{g/d}$,人群中尿碘低于多少 $\mu\text{g/d}$ 时,可有克汀病流行
A. 25
B. 35
C. 40
D. 60
E. 50
73. 能降低血糖水平的激素是
A. 糖皮质激素
B. 生长素
C. 胰高血糖素
D. 肾上腺素
E. 胰岛素
74. 队列研究中最重要偏倚是
A. 住院偏倚
B. 转诊偏倚
C. 回忆偏倚
D. 混杂偏倚
E. 失访偏倚
75. 1 mol 葡萄糖在有氧与无氧条件下分别经糖酵解途径氧化产生 ATP 的 mol 数之比应为
A. 2
B. 4
C. 6
D. 18
E. 36
- A2 型题**
76. 女,35 岁,肛门区皮下软组织内形成 $4 \text{ cm} \times 4 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ 的脓肿,一端向体表穿破,另一端向直肠穿破,这两个开口排脓的管道应称为
A. 窦道
B. 瘘管
C. 溃疡
D. 空洞
E. 以上都不是
77. 女,49 岁,近来机体抵抗力下降,细菌经血管和淋巴管进入血流,但无明显全身反应,该患者最可能患何种病症
A. 菌血症
B. 毒血症
C. 败血症
D. 脓毒血症
E. 血友病
78. 女,47 岁,上腹部无规律性疼痛 5 年,B 超检

查盆腔右附件有一圆形包膜完整肿物。最有可能是

- A. 卵巢良性肿物
- B. 卵巢原发恶性肿物
- C. Krukenberg 瘤
- D. 卵巢转移瘤
- E. 卵巢异位妊娠

A3/A4 型题

(79~83 题共用题干)

某男性患者, 26 岁, 有不洁性交史及吸(注射)毒品史。因近半年体重下降, 腹泻、发烧、反复发生口腔真菌感染而入院治疗。初步怀疑为 AIDS

79. 确诊常用的检测指标是

- A. HIV 抗原
- B. 抗-HIV 抗体
- C. 针对 HIV 的 CD8⁺ 细胞
- D. 针对 HIV 的 CF4⁺ 细胞
- E. 抗-AIDS 抗体

80. 首先考虑的药物治疗是针对

- A. HIV
- B. AIDS
- C. 真菌
- D. 腹泻(止泻)
- E. 发烧(退烧)

81. 该患者最具潜在传染危险的分泌物和体液是

- A. 尿
- B. 粪便
- C. 唾液
- D. 血液
- E. 汗液

82. 可考虑使用的抗病毒药物是

- A. 金刚烷胺
- B. 无环鸟苷
- C. 叠氮胸苷
- D. 磺胺
- E. 都不是

83. 可选用的免疫治疗药物是

- A. 转移因子
- B. I 型干扰素
- C. II 型干扰素
- D. IL-2
- E. 都不是

(84~85 题共用题干)

男性患者 30 岁, 肥胖。近来出现多饮多食、多尿、消瘦、尿糖阳性、血糖升高, 诊断为非胰岛素依赖

型糖尿病

84. 首选下列何种治疗方法

- A. 单纯饮食控制
- B. 服用二甲双胍
- C. 普通胰岛素皮下注射
- D. 优降糖口服
- E. 甲苯磺丁脲口服

85. 经上述治疗, 尿糖仍持续阳性, 血糖仍高考虑改用

- A. 长效胰岛素
- B. 苯乙双胍
- C. 氯磺丙脲
- D. 优降糖
- E. 甲苯磺丁脲

B1 型题

(86~89 题共用备选答案)

- A. K⁺ 外流
- B. K⁺ 平衡电位
- C. Na⁺ 内流
- D. Na⁺ 平衡电位
- E. Ca²⁺ 内流

86. 静息电位接近于

87. 神经纤维锋电位上升支的形成是由于

88. 神经纤维锋电位的超射顶端接近于

89. 神经纤维锋电位下降支的形成是由于

(90~94 题共用备选答案)

- A. 盐酸对小肠黏膜的刺激
- B. 脂肪对小肠黏膜的刺激
- C. 氨基酸对胃窦黏膜的刺激
- D. 胆盐在小肠内的吸收
- E. 壁细胞分泌的内因子

90. 有助于维生素 B₁₂ 吸收的是

91. 有利胆作用的是

92. 对胃排空有抑制作用的是

93. 对胰液分泌有促进作用的是

94. 对胃泌素分泌有刺激作用的

(95~99 题共用备选答案)

- A. 脊髓第 3~5 颈段
- B. 延髓
- C. 脑桥
- D. 丘脑
- E. 大脑皮层

95. 支配膈肌的运动神经元位于

96. 呼吸调整中枢位于

97. 吸气活动发生器位于

98. 咳嗽反射的基本中枢位于
99. 随意屏气的控制部位在
(100 ~ 103 题共用备选答案)
- 酚类消毒剂
 - 醇类消毒剂
 - 氧化剂消毒剂
 - 重金属盐类消毒剂
 - 酸碱类
100. 生石灰属于
101. 石炭酸属于
102. 硝酸银属于
103. 漂白粉属于
(104 ~ 109 题共用备选答案)
- 幽门螺杆菌
 - 密螺旋体
 - 流感嗜血杆菌
 - 绿脓杆菌
 - 军团菌
 - 溶血性链球菌
104. 梅毒
105. 消化性溃疡
106. 慢性支气管炎
107. 烧伤创面感染
108. 肺炎
109. 风湿热
(110 ~ 112 题共用备选答案)
- I 度营养不良
 - II 度营养不良
 - III 度营养不良
 - 恶性营养不良
 - 正常儿
110. 1 岁男婴, 体重 5 kg, 身高 71 cm, 极度消瘦, 表情呆滞, 肌张力低下
111. 6 个月女婴, 体重 7 kg, 身高 68 cm, 皮肤红润, 腹壁皮下脂肪 1 cm, 肌张力正常
112. 8 个月男婴, 体重 6 kg, 身高 69 cm, 活泼, 皮肤红润, 腹壁皮下脂肪 0.8 cm, 肌张力正常
(113 ~ 117 题共用备选答案)
- 获得性无丙种球蛋白血症(普通变异性免疫缺损)
 - 重症联合免疫缺损的常染色体隐性遗传形式
 - C8 缺损
 - DiGeorge 综合征
 - 婴幼儿无丙种球蛋白血症
113. 伴有腺苷酸脱氢酶缺损
114. 第 III、IV 咽囊管分化缺陷
115. 伴有反复的奈瑟氏菌感染
116. 淋巴细胞缺失表面 Ig
117. 伴手足抽搐和心脏畸形
(118 ~ 119 题共用备选答案)
- 特异性细胞免疫
 - 特异性体液免疫
 - 非特异性细胞免疫
 - 非特异性体液免疫
 - 以上全不是
118. 偶联毒素的单克隆抗体
119. α -干扰素
(120 ~ 124 题共用备选答案)
- 呋塞米
 - 氢氯噻嗪
 - 螺内酯
 - 氨苯蝶啶
 - 乙酰唑胺
120. 尿崩症病人宜选用
121. 轻度高血压病人宜选用
122. 醛固酮增高性水肿病人宜选用
123. 顽固性水肿病人宜选用
124. 合并有痛风的水肿病人宜选用
(125 ~ 129 题共用备选答案)
- 球形心
 - 靴形心
 - 梨形心
 - 绒毛心
 - 虎斑心
125. 主动脉瓣关闭不全
126. 二尖瓣关闭不全
127. 风湿性全心炎
128. 贫血
129. 二尖瓣狭窄
(130 ~ 133 题共用备选答案)
- 琥珀酰胆碱
 - 硝酸甘油
 - 左旋多巴
 - 麻黄碱
 - 硫喷妥钠
130. 反复应用快速耐受的药物是
131. 遗传因素会明显影响其疗效的药物是
132. 在体内经过变化才能起作用的药物是
133. 吸收后快速贮存在脂肪组织的药物是

(134 ~ 138 题共用备选答案)

- A. 胆碱乙酰化酶
- B. 胆碱酯酶
- C. 多巴脱羧酶
- D. 单胺氧化酶
- E. 儿茶酚氧位甲基转移酶

134. 在线粒体中灭活 NA 的酶是
 135. 在肝肾等组织中灭活 NA 的酶是
 136. 合成 Ach 的酶是
 137. 有机磷酸酯类抑制的酶是
 138. 卡比多巴抑制的酶是

(139 ~ 141 题共用备选答案)

- A. 依赖 DNA 的 DNA 聚合酶
- B. 依赖 DNA 的 RNA 聚合酶
- C. 依赖 RNA 的 RNA 聚合酶
- D. 依赖 RNA 的 DNA 聚合酶
- E. DNA 连接酶

139. 参与反转录过程的酶属于
 140. 参与转录过程的酶属于
 141. 参与 RNA 复制过程的酶属于

(142 ~ 144 题共用备选答案)

- A. 直接通过飞沫传播
- B. 直接接触传播
- C. 经接触疫水传播
- D. 经吸血节肢动物传播
- E. 经污染媒介物间接传播

142. 流感
 143. 血吸虫病
 144. 疟疾

(145 ~ 147 题共用备选答案)

- A. 骨牵引
- B. 皮牵引
- C. 手法复位及石膏外固定
- D. 介入疗法
- E. 骨盆兜垂吊牵引法

145. 髋关节中心脱位股骨头轻度内移者,应采用何种治疗

146. 骨折合并腹膜后出血,若经积极抢救未能使休克好转且血压继续下降,脉搏继续加快或逐渐微弱,可采用何种治疗

147. 盆骨骨折伴有耻骨联合分离且较轻者应采用何种治疗方法

(148 ~ 150 题共用备选答案)

- A. 智力低下
- B. 骨质硬化与骨质疏松
- C. 语言障碍
- D. 视野缩小
- E. 皮肤色素沉着

148. 与碘缺乏病有关的症状和体征是
 149. 与地方性氟中毒有关的症状和体征是
 150. 与地方性砷中毒有关的症状和体征是

参考答案

- | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| 1. C | 2. A | 3. D | 4. E | 5. D |
| 6. D | 7. C | 8. D | 9. C | 10. E |
| 11. A | 12. B | 13. D | 14. A | 15. B |
| 16. B | 17. D | 18. D | 19. A | 20. C |
| 21. A | 22. D | 23. E | 24. B | 25. B |
| 26. E | 27. D | 28. E | 29. C | 30. D |
| 31. E | 32. B | 33. E | 34. E | 35. B |
| 36. A | 37. E | 38. D | 39. E | 40. B |
| 41. C | 42. D | 43. C | 44. D | 45. B |
| 46. B | 47. D | 48. D | 49. A | 50. D |
| 51. B | 52. C | 53. C | 54. B | 55. C |
| 56. E | 57. B | 58. C | 59. E | 60. B |
| 61. D | 62. D | 63. C | 64. C | 65. C |
| 66. C | 67. D | 68. E | 69. A | 70. B |
| 71. B | 72. A | 73. E | 74. E | 75. C |
| 76. B | 77. A | 78. A | 79. B | 80. C |
| 81. D | 82. C | 83. E | 84. A | 85. B |
| 86. B | 87. C | 88. D | 89. A | 90. E |
| 91. D | 92. B | 93. A | 94. C | 95. A |
| 96. C | 97. B | 98. B | 99. E | 100. E |
| 101. A | 102. D | 103. C | 104. B | 105. A |
| 106. C | 107. D | 108. E | 109. F | 110. C |
| 111. E | 112. A | 113. B | 114. D | 115. C |
| 116. E | 117. D | 118. B | 119. E | 120. D |
| 121. A | 122. E | 123. B | 124. A | 125. B |
| 126. A | 127. D | 128. E | 129. C | 130. B |
| 131. A | 132. C | 133. E | 134. D | 135. E |
| 136. A | 137. B | 138. C | 139. D | 140. B |
| 141. C | 142. A | 143. C | 144. D | 145. A |
| 146. D | 147. E | 148. C | 149. D | 150. E |

第二单元

A1 型题

1. 代谢性酸中毒病人最突出的临床表现是
 - A. 呼吸深而快
 - B. 呼吸浅而慢
 - C. 呼吸深而慢
 - D. 呼吸浅而快
 - E. 以上都不是
2. 与速发性哮喘反应最相关的细胞是
 - A. 嗜酸性粒细胞
 - B. 肥大细胞
 - C. 巨噬细胞
 - D. 中性粒细胞
 - E. 气道上皮细胞
3. 下列方法中哪一种可检测小儿智力水平
 - A. 贝利婴幼儿发育量表
 - B. 图片词汇测验
 - C. 发育量表
 - D. 斯坦福-比奈量表
 - E. 韦氏学前儿童智力量表
4. 下列哪一项是动脉粥样硬化的易患因素
 - A. 年龄 < 40 岁
 - B. 女性多于男性
 - C. 血高密度脂蛋白升高
 - D. 吸烟
 - E. 低血压
5. 矮身材伴四肢短小, 面容特殊且智力低下者
 - A. 先天性甲状腺功能减低症
 - B. 严重的营养不良
 - C. 软骨发育不良
 - D. 苯丙酮尿症
 - E. 佝偻病
6. II 型呼吸衰竭是指
 - A. $\text{PaO}_2 < 6.65 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 2 \text{ kPa}$
 - B. $\text{PaO}_2 > 8 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 < 6.65 \text{ kPa}$
 - C. $\text{PaO}_2 < 8 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 6.65 \text{ kPa}$
 - D. $\text{PaO}_2 < 7.5 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 > 6.65 \text{ kPa}$
 - E. $\text{PaO}_2 < 8 \text{ kPa}$, $\text{PaCO}_2 < 6.65 \text{ kPa}$
7. 下列说法错误的是
 - A. 足月儿血清总胆红素 $< 221 \mu\text{mol/L}$ 者均为生理性黄疸
 - B. 生后 24 小时内出现的黄疸为病理性黄疸
 - C. 早产儿第 4 周末肉眼观察仍有黄疸者为病理性黄疸
 - D. 50% ~ 80% 的新生儿可出现生理性黄疸
 - E. 生理性黄疸为自限性
8. 慢性肺心病形成肺动脉高压的主要机制
 - A. 支气管感染
 - B. 红细胞增多
 - C. 血液粘稠度增加
 - D. 肺小动脉痉挛
 - E. 肺毛细血管床减少
9. 新生儿败血症, 产后感染, 国内常见的病原体是
 - A. 大肠杆菌
 - B. 肺炎双球菌
 - C. 绿脓杆菌
 - D. 链球菌
 - E. 以上都不是
10. 引起大叶性肺炎最常见病原菌
 - A. 溶血性链球菌
 - B. 葡萄球菌
 - C. 肺炎克雷白杆菌
 - D. 肺炎球菌
 - E. 结核菌
11. 光照疗法降低胆红素最有效的是
 - A. 紫外线
 - B. 绿光
 - C. 蓝光
 - D. 日光
 - E. 红光
12. 对急性肺水肿诊断最特异的是
 - A. 气促、发绀、烦躁不安
 - B. 肺动脉瓣第二心音亢进
 - C. 心尖区有奔马律, 心率增快
 - D. 咳粉红色泡沫痰
 - E. 肺部有哮鸣音
13. 可靠的早期诊断佝偻病的指标是
 - A. 多汗、喂养困难
 - B. 血磷增高
 - C. 血浆中 cAMP 水平降低
 - D. $1,25(\text{OH})_2\text{D}_3$ 降低
 - E. 骨骼 X 线片

14. 肺炎杆菌肺炎的治疗下列哪项是错误的
- 首选氨基糖甙类抗生素
 - 重症者应联合应用头孢菌素和氨基糖甙类
 - 抗生素以静脉用药为主
 - 疗程一般为2~3周
 - 必要时行手术治疗
15. 诊断早期肺心病的主要依据是
- 慢性肺部疾病史
 - 肺气肿体征
 - 颈静脉充盈
 - 肺动脉高压症
 - 右心功能不全体征
16. 急性病毒性心肌炎早期不主张用激素的理由
- 抑制干扰素合成
 - 抑制抗体产生
 - 抑制肾上腺皮质
 - 避免继发感染
 - 加重心力衰竭
17. 隐性手足搐搦症可有以下体征
- 克氏征阳性
 - 巴氏征阳性
 - 布氏征阳性
 - 面神经征阳性
 - 霍夫曼征阳性
18. 肺结核空洞与肺脓肿空洞最重要的鉴别方法是
- 根据结核接触史
 - 根据临床症状特点
 - 根据胸部X线特征
 - 根据痰细菌学检查
 - 根据结核菌素试验
19. 小儿免疫特点中,错误的是
- 小儿皮肤黏膜娇嫩,淋巴系统发育未成熟
 - 体液免疫不如成人健全
 - 细胞免疫也不如成人健全
 - 新生儿不易患革兰阴性细菌感染
 - 婴幼儿期缺乏SIgA,易患呼吸道及胃肠道感染
20. 心包积液可靠的体征有
- 叩诊心界扩大与体位变化无关
 - 心音减轻
 - 叩诊心界扩大,坐位和卧位有变化
 - 心尖搏动摸不到
 - 脉压减少
21. 新生儿败血症最常见的感染途径是
- 胎内感染
 - 产道感染
 - 脐部感染
 - 暖箱
 - 雾化器
22. 下列抗结核药物中哪项不属于杀菌剂
- 利福平
 - 异烟肼
 - 链霉素
 - 吡嗪酰胺
 - 对氨基水杨酸钠
23. 孕妇肾盂肾炎最宜用哪类药
- 磺胺类
 - 氟喹酮类
 - 半合成青霉素
 - 头孢类
 - 氨基糖甙类
24. 有关早产儿的特点,下述哪项是错误的
- 呼吸暂停发生在1天以内或18天以后者大多属于病理性
 - 早产儿葡萄糖醛酰转换酶不足,生理性黄疸较足月儿明显,持续时间长
 - 早产儿晚期中毒症状在胎龄小于30周的极低出生体重儿可持续数周
 - 早产儿液体需要量相对比足月儿少,每天120~150 ml/kg
 - 早产儿易发生低血糖、低血钙、低血钠症
25. 输血最严重的并发症是
- 发热反应
 - 变态反应
 - 过敏反应
 - 溶血反应
 - 细菌污染反应
26. 诊断典型的冠心病心绞痛,下列哪一项最不具有特征性
- 部位胸骨后中上段
 - 性质呈绞痛样性质
 - 时间一般<5分钟
 - 放射左臂内侧、左肩
 - 含服硝酸甘油,数分钟内心绞痛消失
27. 新生儿高胆红素血症可导致
- 败血症
 - 支气管肺炎

- C. 核黄疸
D. 颅内出血
E. 破伤风
28. 结节病最具特征的胸部 X 线表现是
A. 双侧肺门、纵隔淋巴结肿大
B. 单侧肺门、纵隔淋巴结肿大
C. 肺门淋巴结肿大伴钙化
D. 两肺弥漫性结节影
E. 纵隔淋巴结肿大伴钙化
29. 抗风湿治疗,选用肾上腺皮质激素的指征是
A. 心脏炎
B. 多发性关节炎
C. 舞蹈征
D. 皮下结节
E. 环形红斑
30. 有关金黄色葡萄球菌肺炎,下列哪项最有诊断意义
A. 起病急,病情重
B. 呈弛张热,有猩红热样皮疹
C. 喘憋重,呼吸困难,紫钳
D. 易发生脓胸,肺大泡,脓气胸
E. 白细胞总数高,核左移,中性粒细胞浆有中毒颗粒
31. 地高辛在体内的半衰期约为
A. 5~20 分钟
B. 2~3 小时
C. 1~2 天
D. 5~7 天
E. 1~2 周
32. 下列哪些情况需要用洋地黄制剂
A. 房扑 4:1 传导
B. 房颤,心室率 60 次/分
C. 阵发性室上速呈 2:1 房室传导阻滞
D. 窦性心动过速 120 次/分
E. 阵发性室上速伴差异传导,心室率 180 次/分
33. 免疫缺陷病的诊断,错误的是
A. 体液免疫缺陷者细菌感染率高
B. 细胞免疫缺陷者病毒,真菌感染率高
C. 活疫苗接种后可发生疫苗病
D. 反复感染伴出血病史提示 WAS
E. DiGeorge 综合征属联合免疫缺陷病
34. 洋地黄中毒引起室上性心动过速的治疗,除停用洋地黄药物外,主要是
A. 奎尼丁口服
B. 氯化钾静脉点滴
C. 电击
D. 维拉帕米
E. 以上都不是
35. 麻疹传染性最强的时期为
A. 潜伏期
B. 前驱期
C. 出疹期
D. 恢复期
E. 发热后两周
36. 二尖瓣分离术的禁忌证是
A. 心功能Ⅲ级
B. 妊娠 5~6 个月
C. 有明显主动脉瓣病变或中等以上二尖瓣关闭不全
D. 反复发作肺水肿或大咯血
E. 心房颤动和有动脉栓塞史
37. PPD 结果判断中,正确的是
A. 硬结直径 5~9 mm 为(-)
B. 硬结直径 10~20 mm 为(+)
C. 有水疱局部坏死为(++++)
D. 硬结直径 >29 mm 为(+++)
E. 硬结直径 >10 mm 为强阳性
38. 洋地黄中毒的常见心电图表现是
A. QT 间期缩短
B. ST-T 段改变呈鱼钩状
C. 窦性心动过速
D. Ⅲ度房室传导阻滞
E. 室早二联律
39. 下列不能作为脑膜炎双球菌与肺炎链球菌脑膜炎的鉴别依据的是
A. 发病的季节
B. 皮肤有无出血点
C. 有无流行性
D. 脑脊液的常规和生化检查
E. 脑脊液涂片找细菌和细菌培养
40. 肺癌胸膜,骨转移宜采取的治疗
A. 手术
B. 手术+放疗
C. 手术+化疗
D. 手术+免疫治疗
E. 化疗
41. 配制 2:1 等张含钠液 120 ml 需
A. 0.9% NaCl 80 ml, 5% NaHCO₃ 40 ml
B. 0.9% NaCl 80 ml, 5% NaHCO₃ 5 ml, 10%