

中兽医 验方妙用

ZHONGSHOUYI YANFANG MIAOYONG

◎任养生 编著

家畜感冒方剂

薄荷 30克 桑叶 30克

菊花 20克 紫苏 25克

麦冬 30克 桔梗 30克

甘草 15克 水煎后温


灌服 小兽 酌减



金盾出版社

用妙方验医胥甲

任养生 编著



金盾出版社

内 容 提 要

本书由山西省农业科学院畜牧兽医研究所任养生副研究员编著。编者在学习继承祖国兽医学的基础上,总结自己数十年的科研和临床实践,并吸收古今兽医诊疗验方和偏方,汇总编写成此书。书中以畜禽常见多发的传染病、寄生虫病、内科病、外科病和食物中毒为主,详尽地介绍了每个疾病的主症、诊断和治疗。全书涉及病种 132 种,处方近 1100 个。本书内容简明扼要,文字通俗易懂,所载处方用之效验。适合畜牧兽医工作者和广大畜禽养殖人员阅读,也可供有关院校师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

中兽医验方妙用/任养生编著. —北京:金盾出版社, 2003. 3

ISBN 7-5082-2305-5

I. 中… II. 任… III. 中兽医-验方 IV. S853.9

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 001748 号

金盾出版社出版、总发行

北京太平路 5 号(地铁万寿路站往南)

邮政编码:100036 电话:68214039 66882412

传真:68276683 电挂:0234

封面印刷:北京精彩雅恒印刷有限公司

正文印刷:北京瑞兴印刷有限公司

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/32 印张:7 字数:155 千字

2003 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

印数:1—15000 册 定价:8.00 元

(凡购买金盾出版社的图书,如有缺页、
倒页、脱页者,本社发行部负责调换)

前 言

在我国国民经济飞速发展,人民生活节奏日趋加快的形势下,为满足集约化养殖畜禽疾病防治的需要,本人在学习继承祖国兽医学的基础上,总结了数十年的科研和临床实践,并吸收古今精方及民间偏方,汇编成《中兽医验方妙用》一书,供畜牧兽医工作者及畜禽养殖户置案备用,从中获取收益。同时,为开发、创新和加速中兽医现代化抛砖引玉,以盼对读者有所启迪。

本书所载是以畜禽常见病、多发病为主,重点描述诸病的主症,从而断病下药,甚得其便。全书分六章,涉及病种 132 种,处方近 1100 个。所载处方短小精当,用之效验。方中药材多系天然植物,符合药用规范,且易采易购,价廉效专,富有绿色药用特色。

本书撰写时为求描述准确,简明扼要,通俗易懂,读而易用,用之效验,实需做较多工作。于是“从医”的孩子们,也积极参与了资料的整理和书稿的加工。鉴于业务水平与成书时间所限,其中疏漏、谬误难免,恳请读者多予以批评指正。

本书在命名、立意等方面,得到山西省农业科学院刘雨龙研究员的大力帮助与支持,谨致感谢!

编著者

二〇〇二年十一月

目 录

第一章 畜禽传染病	(1)
感冒	(1)
破伤风	(3)
猪传染性胃肠炎	(4)
猪水肿病	(6)
水疱性口炎	(7)
口蹄疫	(9)
痘症	(10)
仔猪白痢	(13)
猪喘气病	(15)
猪肺疫	(16)
仔猪副伤寒	(17)
猪丹毒	(18)
犬瘟热	(20)
犬细小病毒病	(22)
鸡白痢	(23)
禽霍乱	(25)
鸡传染性喉气管炎	(26)
鸡减蛋综合征	(28)
鸡传染性法氏囊病	(29)
鸡传染性支气管炎	(31)
禽流感	(32)
狂犬病	(34)

放线菌病	(35)
第二章 畜禽寄生虫病	(37)
猪蛔虫病	(37)
鸡蛔虫病	(38)
犬和猫蛔虫病	(39)
犬绦虫病	(40)
禽绦虫病	(41)
牛血孢子虫病	(42)
肝片吸虫病	(44)
兔球虫病	(45)
螨虫病	(47)
虱病	(49)
蚤病	(50)
第三章 畜禽内科病	(51)
第一节 消化系统病	(51)
口疮	(51)
食道阻塞	(53)
反胃吐草	(54)
马急性胃扩张	(55)
瘤胃臌气	(57)
瘤胃积食	(59)
前胃弛缓	(62)
网胃移位	(64)
重瓣胃阻塞	(66)
冷痛	(67)
便秘症	(71)
风气症	(76)

血塞症	(77)
幼驹粪结	(78)
泄泻	(79)
便血	(80)
猪便秘	(82)
第二节 呼吸系统病	(84)
鼻出血	(84)
咽喉炎	(85)
支气管炎	(86)
支气管肺炎	(88)
大叶性肺炎	(89)
异物性肺炎	(90)
第三节 循环系统病	(92)
心力衰竭	(92)
伤力	(94)
心内膜炎	(95)
心肌炎	(96)
第四节 神经系统病	(97)
面神经麻痹	(97)
脑炎	(98)
脑室积水	(100)
癫痫	(101)
中暑	(103)
第五节 泌尿生殖系统病	(104)
血尿	(104)
膀胱炎	(105)
阳痿	(107)

滑精早泄·····	(109)
精液异常·····	(111)
垂缕不收·····	(113)
阴道炎·····	(115)
流产·····	(116)
产前暴喘症·····	(118)
胎死腹中·····	(119)
胎衣不下·····	(120)
恶露不尽·····	(122)
产后瘫痪·····	(123)
产后贫血·····	(124)
乳腺炎·····	(125)
缺乳症·····	(127)
血乳症·····	(128)
乳泣·····	(129)
子宫内膜炎·····	(129)
卵巢机能不全不孕症·····	(131)
卵巢滤泡囊肿不孕症·····	(133)
黄体囊肿不孕症·····	(134)
肾炎·····	(134)
尿闭·····	(136)
仔猪小便不通·····	(138)
尿结石·····	(138)
第六节 代谢病·····	(139)
骨软症·····	(139)
异嗜癖·····	(141)
瘦弱症·····	(142)

僵猪·····	(143)
贫血·····	(144)
尿酸盐沉积症·····	(145)
第四章 畜禽外科病·····	(146)
挫伤·····	(146)
创伤·····	(148)
血肿·····	(149)
脓肿·····	(149)
鞍伤·····	(153)
瘰管·····	(155)
屈腱炎·····	(157)
蜂窝织炎·····	(158)
烧烫伤·····	(160)
漏蹄·····	(163)
腰椎挫伤·····	(165)
骨折·····	(165)
腕部粘液囊炎·····	(169)
结膜炎·····	(170)
角膜翳·····	(171)
额窦与上颌窦蓄脓症·····	(173)
湿疹·····	(173)
风湿症·····	(174)
直肠脱·····	(179)
牙痛·····	(180)
颊部透创·····	(182)
毒蛇咬伤·····	(182)
兽类咬伤·····	(184)

黄蜂螫伤及毒虫咬伤·····	(185)
诸虫入耳·····	(186)
第五章 禽畜食物中毒·····	(186)
氢氰酸中毒·····	(186)
亚硝酸盐中毒·····	(188)
含氮化学肥料中毒·····	(190)
霉玉米中毒·····	(192)
霉饲料中毒·····	(193)
甘薯黑斑病中毒·····	(195)
酒糟中毒·····	(197)
砷中毒·····	(197)
食盐中毒·····	(199)
第六章 畜禽中药饲料添加剂及保健方·····	(201)
猪用饲料添加剂·····	(201)
禽用饲料添加剂·····	(206)
兔用饲料添加剂·····	(207)
鸽用保健沙·····	(208)
鹿增茸添加剂·····	(209)
犬健胃消食散·····	(209)
猪四季保健药·····	(210)
牛保健药验方·····	(210)
骡、马春灌药验方·····	(211)
附录一 《牛经》牛四季保健药方歌诀·····	(212)
附录二 《马经》马四季保健药方歌诀·····	(213)

第一章 畜禽传染病

感 冒

感冒又称伤风感冒、时行感冒。是一种外受风寒而发的常见病，与病毒、细菌感染有关。由于四季气候、各地环境、畜禽体质强弱的不同，表现症状也不一致。

时行感冒，又称流行性感冒。除具有普通感冒症状外，它还有流行快的特点，在短期内，同种动物可互相传染，波及全群。

【主症与诊断】 风寒感冒多见于冬季，患畜耳、鼻发凉，发热冷颤，鼻流清涕，食欲不振等。风热感冒多见于冬末春初，表现耳、鼻发热，体温升高，食欲减少或废绝，便干尿黄，口色红，舌苔黄。挟湿感冒多见于夏季，怕冷乏力，呕吐不食，或肚疼腹泻，口色赤红，舌苔黄腻，体温升高。流行性感冒多见于冬春季节，其他季节也见散发，发病急、传播快，症状与风热感冒相似。

咳嗽初期为干咳，后呈湿咳或阵发性强咳。鼻涕初清，后呈粘浊黄色。病情重者，体温升高，呼吸音粗厉，心跳加快。感冒易引发细菌性或病毒性并发症，如肺炎等，从而加重病情。

【治 疗】

验方1 荆芥 25 克，防风 25 克，厚朴 25 克，前胡 25 克，柴胡 20 克，桔梗 20 克，甘草 20 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌服，中小畜酌减。

验方2 桂枝 30 克，炙枇杷叶 60 克，车前子(包)60 克，

甘草 20 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌服，中小畜酌减。

驗方 3 炙款冬花 30 克，杏仁 15 克，羌活 30 克，陈皮 30 克，当归 30 克，麦冬 30 克，甘草 20 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌服，中小畜酌减。

驗方 4 羌活 25 克，白芷 25 克，淡豆豉 25 克，川芎 20 克，陈皮 30 克，半夏曲 20 克，甘草 15 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌服，中小畜酌减。

驗方 5 金银花 30 克，连翘 30 克，天花粉 30 克，荆芥 25 克，牛蒡子 20 克，薄荷(后下)20 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌服，中小畜酌减。

驗方 6 麻黄 20 克，杏仁 20 克，黄芩 30 克，苍术 30 克，生石膏(先煎)100 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌服，中小畜酌减。

驗方 7 黄芩 30 克，桑叶 30 克，菊花 25 克，紫苏 25 克，麦冬 30 克，桔梗 30 克，甘草 15 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌服，中小畜酌减。

驗方 8 藿香 25 克，佩兰 25 克，香薷 25 克，苏梗 30 克，竹叶 25 克，陈皮 20 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌服，中小畜酌减。

驗方 9 藿香 25 克，佩兰 26 克，防风 20 克，苍术 25 克，蔓荆子 25 克，茯苓 30 克，甘草 20 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌服，中小畜酌减。

驗方 10 桑叶 25 克，杏仁 20 克，沙参 30 克，麦冬 30 克，桔梗 25 克，射干 15 克，玄参 25 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌服，中小畜酌减。

驗方 11 板蓝根 45 克，蒲公英 45 克，黄芩 30 克，柴胡 20 克，葛根 30 克，赤芍 30 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌

服，中小畜酌减。

验方 12 板蓝根 45 克，大青叶 45 克，草河车 30 克，知母 30 克，连翘 30 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌服，中小畜酌减。

验方 13 贯仲 25 克，紫苏 30 克，大青叶 45 克，薄荷（后下）30 克，甘草 20 克。水煎取汁，候温。大畜 1 次灌服，中小畜酌减。

破 伤 风

本病是由破伤风杆菌经创口感染，引发全身强直性痉挛的疾病。马属动物易感，猪次之，牛、羊发生较少。为人、畜共患传染病。该病原广泛存在于自然界及人、畜粪便和土壤中。潜伏期一般 1~3 周。零星发生，多有创伤史。

【主症与诊断】 病初部分肌肉或肌群痉挛，耳、眼不灵活，咀嚼、吞咽异常，逐渐出现全身肌肉强直，耳竖尾直，行动僵硬，形如木马。重症者则牙关紧闭，吞咽困难，呼吸促迫，鼻孔张大。稍一受惊，瞬膜外露，角弓反张，全身颤抖，多汗。失治者可在数日内衰竭，窒息死亡。

【治疗】 对某些外科、产科疾病及深部创伤者，宜用破伤风抗毒素预防注射，成年大畜 1 次皮下注射 5 000~10 000 单位，中小畜酌减。对成年马、骡，就诊当日宜用 5% 葡萄糖液 2 500 毫升中加入破伤风抗毒素 20 万~30 万单位静脉滴注，以后每日肌肉注射 10 万单位，持续 3 日。也可在百会穴（穴位在腰荐结合部的凹陷处）内注入 5 万~10 万单位。伤口要及时处理。中药治疗可选用如下验方：

验方 1 羌活 21 克，防风 21 克，天南星 21 克，天麻 21 克，炒僵蚕 24 克，炒蝉蜕 30 克，全蝎 21 克，川芎 15 克，清半

夏 15 克,姜白芷 21 克,黄酒 250 毫升为引(第二剂起改用蜂蜜 500 克)。水煎 2 次,混合均匀,待凉和酒或蜜。胃管投服,连服 3 剂,隔日 1 剂。

如伤在头部,重用白芷。伤在四肢,加独活 21 克。瞬膜外露严重,重用防风、蝉蜕。流涎多,重用僵蚕、半夏。粪便干燥,加麻子仁 120 克,大黄 60~90 克或芒硝 250 克。牙关紧闭严重病例,加蜈蚣 8 条,乌蛇 24 克,细辛 10 克。

验方 2 雄黄 30 克,白芷 24 克,玄参 30 克,蝉蜕 30 克,葛根 30 克。研为细末,开水冲调,加白酒 250 毫升,候温。大畜胃管 1 次投服,每日 1 剂,连服 3~5 剂。配合艾灸大风门(穴位在头顶上,共 3 穴,呈正三角形)、锁口(在口角后上方约 2.3 厘米处,左右各 1 穴)穴。

验方 3 蔓荆子 30 克,羌活 30 克,防风 30 克,蝉蜕 60 克,乌蛇 30~60 克,制川乌 24 克,制草乌 24 克,黄芩 24 克,大黄 30 克,全蝎 30 克,细辛 15 克,蜈蚣 10 条,半夏 24 克,天南星 24 克,木通 30 克。水煎 2 次合并,加白酒 500 毫升。分 2 次胃管投服,上午 1 次,下午 1 次。

猪传染性胃肠炎

本病是由病毒引起的一种猪急性腹泻传染病。见于各种年龄,但以仔猪发病与死亡率高。在冬春猪食用了被该病毒污染的饮水、饲料后引发,发病急,传播快,呈散发性或地方性流行。

【主症与诊断】 少数仔猪初有轻热,呕吐,急剧腹泻及口渴。粪呈灰白色、淡黄色、淡绿色稀糊状,后呈水样,并混有未消化的母乳、饲料、泡沫和粘液。肛门失禁,边走边拉稀粪,甚至向外喷射。病猪迅速脱水消瘦。病程短的在 48 小时内死亡。

长的可延长5~7日。耐过的猪发育不良,增重迟缓。月龄愈小,死亡率愈高,随年龄的增长,死亡率逐渐下降。成年猪症状较轻,有的食欲不振,腹泻,呕吐。

病理解剖,主要表现胃内容物充满,胃大弯部粘膜有黄豆大到鸽蛋大的潮红糜烂病变。肠壁变薄弛缓。肾混浊肿胀。肠系膜淋巴结肿胀,切面多汁、充血。

【治 疗】

验方1 白头翁30克,马齿苋30克。水煎取汁。母猪喂服,或10头仔猪饮服,每日1剂。

验方2 白头翁35克,龙胆草30克,车前草30克。研为细末,和米汤喂服。每日1~2次,连喂3日。

验方3 白头翁60克,板蓝根60克,连翘35克,大黄炭30克,甘草30克,加水1500毫升。煎至300毫升左右。10头仔猪分服,或母猪分次饮服,1日1剂,连服2剂。

验方4 炒白术25克,炒山药30克,炒车前子(包)30克,炮姜5克。研为细末。每次大猪喂30克,能吃食的仔猪酌情减量,连喂3日。

验方5 铁苋菜1500克,地锦草1500克,白头翁500克,仙鹤草500克,生地榆500克。加水煎煮取汁,浓缩。再取苍术250克,青木香250克,食母生250克。研末过筛,和入煎汁调成糊状。再加硫酸亚铁2.4克,硫酸铜0.3克,氯化钴0.3克,硼酸0.6克,樟脑1.5克,甘油50克。分装前按总量加5%苯甲酸钠防腐。预防量:于出生后第四天开始,每日1~2次,每次0.5~1克,到第十日左右小猪能自动上槽时停止。治疗量加大到2克左右。

猪水肿病

本病主要是由溶血性大肠杆菌引起的一种毒血症。以全身或局部麻痹,运动平衡失调及胃壁和肠系膜水肿为特征。主要发生在1~3月龄的仔猪,尤其多发于断奶后的一、二周内。断奶后饲料突变,饲料单纯,食用过量高蛋白质饲料而消化不良,或长时间喂给抗生素添加剂,是诱发本病的重要因素。

【主症与诊断】 病初病畜体温 $39^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 。眼睑肿胀,结膜高度潮红。精神沉郁,食欲不振,继而停食,独伏墙角,嗜睡,拱背。有的全身震颤,走路摇晃。肌肉紧张,皮肤暗红。后期头盖、颊部、眼睑等处皮肤高度肿胀,呼吸困难,嘴巴触地。前肢跪行,后肢起立困难,或四肢伸直。触及皮肤反应迟钝。抬头吸气,低头呼气,流涎,最终抽搐、死亡。

病理解剖,头盖部、眼睑、顎凹、股前和鼠蹊部皮下高度肿胀,有无色胶冻样液体。体表淋巴结切面多汁水肿、充血,其周围积留水液。胸腹腔与心包有少量粘液,混有丝状纤维素。胃大弯水肿,切面含有清亮黄色渗出液,或胶冻样液。结肠、盲肠、小肠水肿。结肠间膜积有大量水肿液。肠系膜淋巴结充血、水肿。肾、肺、肝充血水肿。

【治 疗】

验方1 蒲公英12克,赤芍6克,泽兰10克,防己6克,白术6克。水煎取汁,灌服。

验方2 白术6克,茯苓皮6克,猪苓6克,冬瓜皮10克,石斛6克。水煎取汁,灌服。

验方3 赤小豆500克,商陆6克,大蒜5个,生姜皮5克。水煎取汁,灌服。

验方4 白术6克,苍术6克,猪苓6克,车前子(包)10

克,黄芩 10 克,大腹皮 12 克,商陆 6 克。水煎取汁,灌服。

水疱性口炎

本病是以口腔粘膜和蹄冠皮肤发生水疱的一种热性病毒性传染病。可危害牛、羊、马、猪及人等。有明显季节性,常见于 5~10 月间,尤其 8 月份发病最多。以后随着天气的转凉,病势减退,冬季发生很少,不像口蹄疫四季流行。发病率不高,死亡少见。而口蹄疫发病率高,患病幼畜死亡多。一旦有马、驴发病,即可诊断为水疱性口炎流行,而不是口蹄疫。

【主症与诊断】 表现症状酷似口蹄疫,尤其牛和猪的感染二者难以区别,潜伏期 24 小时。以后体温升高达 40℃ 以上,食欲减退。2~3 日后出现水疱,并出现磨牙、流涎。不久水疱出现在鼻镜、舌面或蹄冠,直径不超过 3 厘米,经 24 小时破裂。随之体温下降,食欲不振,但喜饮水。

马的水疱多在舌面、口腔粘膜,而蹄冠、蹄踵也可能有水疱性溃疡。牛除舌面外,口角皮肤上也有水疱,蹄部病变仅少数,乳头也会发生,常并发乳腺炎。患猪多见于蹄冠和蹄叉(趾间),疼痛不愿站立。亦见口腔有病变的。

病程 3~4 日恢复食欲,水疱经 1~2 周可治愈,死亡少见。

人感染时,症状与流感相似,突然发热,恶心,肌肉疼痛。少数发生口炎和扁桃体炎。一般 1 周左右恢复。

病理解剖,主要在口唇、舌面和蹄部见有水疱及溃疡病变,其他脏器除肝充血外,则无变化。

【治疗】 本病一旦流行,应按照国家有关防制条例及法规,严格控制。治疗可选用如下方法:

验方 1 知母 21 克,贝母 21 克,桔梗 21 克,黄芩 21 克,