

園藝叢書①

家庭當令盆景

蘇玉鸞 著



園藝叢書①

家庭當令盆景

蘇玉鸞 著



目次

春季

風信子
水仙花
西洋櫻草
鬱金香
西洋杜鵑花
燈籠花
君子蘭
仙丹花
猩猩花
火焰花
非洲菊
瓜葉菊

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3



夏季

金蓮花
黃蟬花
珊瑚花
一串紅
萱草
大岩桐
龍吐珠
萬壽菊
朱槿
雞冠花
矮牽牛
梔子
洋繡球
非洲鳳仙花
西洋石楠
鳶蘿
九重葛
含羞草
翠菊

35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17

秋季

桔梗花

紫藍野牡丹

石榴

常春藤天竺葵

天竺葵

菊花

山茶花

46 44 43 42 41 40 39

冬季

耶誕紅

仙客來

嘉德麗亞蘭

球根秋海棠

長壽花

蟹爪蘭

火鶴花

鳳梨花

非洲紫羅蘭

蝴蝶蘭

萬年青

變葉木

60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49



春季

① 風信子
② 水仙花
③ 西洋櫻草
④ 鬱金香
⑤ 西洋杜鵑花
⑥ 燈籠花

⑦ 君子蘭
⑧ 仙丹花
⑨ 猩猩花
⑩ 火焰花
⑪ 非洲菊
⑫ 瓜葉菊

甜香美妍

風信子

風信子，又名洋水仙，原產地為南非、地中海東岸等地區，屬百合科。

圓筒形的花穗上開滿了鐘形花朵，散發著甜甜的香氣，花姿美妍豪華，並能綻放兩三星期之久，為近年栽培最廣的球根植物之一。

風信子自然花期為春季，但以盆栽或水栽培法在冬季開花的更吃香。尤其水栽培法極容易，連小朋友都可以自己動手呢！

水栽法

在初冬以前，將球根攔於種植風信子的特製容器內（大型花市、花店等均有出售），加水到球根底部邊緣，但絕不可把球根弄溼，此後每週換水一次，待根向下長，伸入水中時，將水位略降低一些。為了促進發根良好，以錫紙或黑布等裹住容器四週，保持器中黑暗，並將它放在水溫攝氏十度左右的涼爽處，直到水中的根長成，花芽出現，即可移至有光照的溫暖室內觀賞。



風信子 三

水栽培的風信子，能比一般土栽的提早一個多月開花。

盆栽法

十一月中旬，在十至十二公分大的花盆中，裝進二分之一的川沙及二分之一的田土混合壤土，植入風信子球根一個。球根的前端需要露出土面。過了一個月後，再追加十公分的覆土以防乾燥。經大約兩個月後萌芽寸餘高時再將覆土除去，並把花盆移到明亮處，使芽接觸到光照及少許直射陽光。花莖抽出後就需要適量的澆水及施少量稀薄液肥，大約一個月就能開花。

開完花後，繼續澆水施肥，直到莖、葉都完全枯黃後再將球根挖去，冷藏，以備下次栽培之用。




家庭盆栽

春節雅客

水仙花

水仙花屬石蒜科，原產地為地中海沿岸。水仙花素有「春節雅客」之美稱。室內品種可



以受人工控制提早開花。我國產的水仙花通常以水盤培養，來裝飾室內，增加年節氣氛。

購買乾球根時，要選擇母球大如女人拳頭，芽口有去年的花莖，表皮光滑，球體重的為佳。

如購買已發芽的，要挑球體有彈性，芽狀直立，芽色深綠無黃斑，根部雪白，根尖完整，葉苞肥大的才是健康球根。

養殖方法

(一)若購買已發芽的球根，直接栽入水盤中即可。若購買乾球根就要用利刀切開鱗莖頂部外皮成為十字形，刀痕深入三、四層，切勿損傷到花芽。浸水一天後拭去切口淌出的黏液，栽植於盛有石卵的水盤中，並在球根周圍放置石子以固定支撐，加水至鱗莖基部。將水盤置於陰涼處，經常加水以保持一定的水量，待發根後一週左右把水盤逐步移至向陽處。水仙花球根一旦適應環境後就需要大量直射陽光，以促其發芽、開花。

(二)發芽後的水仙，不可急於移至室內，以防日照不足，未開花就傾斜、倒伏，破壞株姿的端莊感。
(三)水仙花從浸水到開花，大約卅天左右。但它對環境的適應性很廣。通常在攝氏十五度左右才能正常開花，如果以人工控制，加溫水（攝氏卅度—四十度）即提早開花，反之可給予冰塊，延緩其開花。



報春小捧花

西洋櫻草

西洋櫻草又名報春花，屬櫻草科，原產地為中國、歐洲。

報春花是在英國由野生品種改良為園藝交配種，然後再經過西歐到達亞洲。花期很長，花色鮮美，花蕾都長在筆直花莖上端，綻放時成傘狀，花瓣精緻，花姿秀氣，由深綠色的葉片襯托著，每株都好似清新可愛的捧花，因此極受世界各地人們的喜愛。長在深綠色葉叢中央的花莖要粗、花朵大、花蕾多、無蟲害跡象的植株為健康品種。

栽培方法

(一)性喜明亮的光照（包括短暫的直射陽光）及低溫的環境。性質強健，容易栽培，但不耐高溫。白晝要保持攝氏十到十五度，夜間在五—八度的氣溫下才能延長花期，如果高於十六度以上，花朵較快凋謝。補救的方法是將花盆放置於有碎石卵的淺盤中，經常用水噴灑植株。

(二)需要大量澆水，維持盆土溼潤，但墊盤的積水務必倒掉；待盆土表面稍微乾燥時才進行澆水，時間在上午十到十二點之間為理想，以免留水在盆中過夜而引起腐根病。

(三)從花莖抽出至花期結束止，每兩週施一次花寶八百倍稀釋液肥，夏季不必施肥。

(四)如果花朵一謝就摘除，植株為求結籽，就會賣力繼續開花，能將花期延長。

繁殖的方法有播種及插種（分株）等。

鮮艷動人

鬱金香

鬱金香屬百合科，原產地在歐洲、北非及亞洲。

鬱金香的品種繁多，花姿、花色及葉面都鮮豔動人。大多數是由原種交配而成，其中公認小葉、短花莖和大花朵的為最優良雜種。

極適合在室內培養的是冬季開花的矮性品種，一般分為早花單瓣和早花重瓣兩大類。不過花均晝開夜閉，陰天或雨天則半開或不開。因此在選購時若逢低溫花朵仍未關閉，即表示花朵已經相當老化，再中意也應該放棄才好。

鬱金香的根是線狀而又多又長且不分根，一旦被移植，根部難免受損，開花狀態就會欠佳。想避

免買到移植過的植株，先觀察盆土的表面是否緊密，再由盆底觀察根部情況是否完整。


若發現葉片有油漬斑或花朵有小斑點等，都是不健康或已罹患病蟲害的植株，不應購買。

栽培方法

(一) 鬱金香性喜比較寒冷的環境，花朵在攝氏十至十五度之間才能保持三到四週之久的鮮豔狀態，倘若溫度高於攝氏廿度以上就會導致花朵迅速凋謝。原則上，日照充足的室內是最好的放置場所。不過室內有暖氣時花朵的壽命將會縮短。

(二) 澆水要適量，待表土泛白時才可充分灌水。自盆底流出的積水，務必倒掉。

(三) 足夠生長的養份儲蓄在球根中，故不必施肥。
(四) 繁殖法除播種及分球法之外，也有水養法，方法和「風信子」相同。



千嬌百媚

西洋杜鵑花

杜鵑花屬杜鵑花科，原產地為中國南部及日本中部以西，但西洋杜鵑花為園藝交配育成。自然開花期在春季，由於花農調配培育時間有差別，所以綻放時間也不同，從初冬到春天都可買到正在盛開的植株。花朵雖然缺香氣卻千嬌百媚，極為濃豔，觀賞期又長，故漸受人們喜愛。

植株矮壯而枝粗，葉色深綠而有光澤，花蕾多且幾乎半開的為佳品。

栽培方法

(一)西洋杜鵑花性喜冷涼、潮溼，卻忌霜害。需明亮光照卻不耐高溫、乾燥的環境。其理想室溫為攝氏五度至十五度，如果高出廿一度又乾燥時，根部很快就會枯乾，花朵凋萎。最好能放置隔著玻璃接受二、三小時陽光的窗邊培養。

(二)澆水要大量地從根基處灌入，但須用不含石灰質的軟水，否則就會得黃萎病，葉子變黃（簡易的治療法是以分離劑澆灌）。花盆應放在有溼石卵的淺盤中，增加溼度。花期過後把植株移到陰涼處，適量澆水維持盆土溼潤，五月起就可選擇通風良好，而無西晒的戶外培養。

(三)施肥從晚春到初秋之間，每兩週施不含石灰質的肥料一次，開花期間不必施肥。

四繁殖法有播種、扦插、壓條、嫁接等。

注意事項

大多數的幼株在未成熟時就被花農移離苗床，並以大部份為粘土的不良排水用土包紮或植入小花盆中出售。故購回後應用優良培養土自行換植。



西洋杜鵑花
七

可愛的鈴鐺

燈籠花



燈籠花又名吊鐘花，屬於柳葉菜科，原產地為中南美。

花蕾幾乎都長在枝頭上的燈籠花，萼與花瓣的色彩有相同的，也有對比的，豔麗非凡。盛開時花朵下垂，花型如嬌小玲瓏的一盞盞小燈籠，格外可愛動人，通常多種植於吊盆觀賞。

莖粗而節間緊湊，花蕾數多，葉片有光澤而不帶病害斑點、紋的為佳品。

雖然來自熱帶，卻不耐熱，祇要有攝氏五度就能安然過冬；如果保持十度以上即可持續開花，但超過卅度時，植株就會衰弱、掉花、落葉，甚至枯死。

栽培方法


(一)不能直接曝曬，但也不能長久放置於日照不足的地方，最好是置於遮陽設備及通風良好的冷涼處。總之，春秋季應有陽光充足的半日曬，夏季應移到蔭涼處，冬季則使其每日能接受三小時日照的地方為理想。

(二)維持適度的溼氣是栽培上很重要的一環。過乾、過溼都會引起落葉或立枯病。炎熱的夏天，需常噴葉水，冬天應稍微保持乾燥。

(三)生長旺期需肥量比一般花草多些，每兩週施一次花寶五百倍稀釋液，酷暑或開花期間則每月施一次一千倍花寶稀釋液，冬天氣溫特低時停止施肥。

(四)每年春天時進行換盆，將植株逐一分開後，植於換過新培養土的大一號花盆中，並剪過長或過密的枝條，九月起就會開始開花。

燈籠花以扦插法繁殖，適期為五月六月之間。



豪華盆栽

君子蘭

君子蘭又名紅花君子蘭，屬石蒜科，原產地為南非。

花色並不多，國內一般常見的是橙紅或鮮紅色和黃色相雜。初春，肥厚的花莖由葉片中間抽出，頂端能綻放十五到廿朵喇叭狀的美麗花朵，形成極豪華的盆栽，帶狀的寬葉片和其他球根植物不相同，休眠期間不枯萎，終年長青，是眾所周知的家庭觀賞植物。

株基粗、花形大、葉片短而寬，色澤深，左右排列的葉基整齊等都是健康的象徵。

栽培方法

(一) 春秋之間，可置於戶外通風良好的半日陰處栽培，如放置室內，應選擇照不到直射陽光的明亮處。冬季可放置於東邊窗台，使它接觸早上的陽光。中午的陽光會灼傷葉子，但光照太少又會使植株不能開花。

(二) 在一般室溫生長良好，但在初冬必須休眠六到八週，理想的溫度為攝氏五至十度，不可少於三度。

(三) 春、夏季要大量澆水，進入秋季後，漸減水量，休眠時祇要維持盆土微溼，冬末長出花莖時再開始增加水量及次數，千萬小心過溼。

(四) 從花莖長成一半到休眠一個月前為止，每兩週施一次標準液肥。

(五) 最好每年在五月間換盆一次（播種的不在其限），移到大一號花盆裡栽培，換到廿五公分的大盆後就不必再換，祇作表土追肥即可。

(六) 繁殖法有播種及分株兩種，通常採用由母球上拔下來的子球，以分株法進行。

豐紅繡球

仙丹花



仙丹花又名紅繡球、龍船花、賣子木等，屬茜草科，原產地為印度、馬來西亞及中國南部的常綠灌木。

花色呈鮮紅色（園藝品種的有黃、深紅、橙及白色等，但市面上不多見），花姿華麗，無數的小花密集成團著生於莖頂，形成喜氣洋洋、豔麗動人的繡球。葉片為深綠色，不過枝端的嫩葉卻是美麗的淡紅色。故在花期過後，將植株修剪、施肥，促其長出新芽，就能變成極有觀賞價值的室內觀葉植物之一。

此花很少發生嚴重的病蟲害，祇要葉片色深，莖、枝粗，花、蕾數目多等，具備一般應有的優良條件即可購買。

栽培方法

(一)性喜明亮光照及高溫多濕、排水良好的環境。生長適度為攝氏十八~廿二度之間，冬天祇要不低於五度即可過冬。開花期間的花盆應放置於日照充足、溼度適量的窗台、陽台等，花蕾方不會掉落。花期後，將花盆移至戶外栽培，可使植株長得更強健。

(二)生長活躍期間澆水要適量；每天或隔天澆水一次。但是天氣炎熱時，祇要盆土表面乾燥就得澆水。開花期間若是盆土及空氣過度乾燥，將會影響開花量。冬季的水量要減少。

(三)需肥不太多，生長期間每月施稀薄液肥一次，九月以後則不可施肥。

(四)每年需要換盆一次。盆要逐年加大，並更換新培養土栽培。

(五)在六~七月之間，以扦插法繁殖。

滿室艷麗

猩猩花



猩猩花屬葵科，原產地為巴西，高可達一公尺的常綠灌木。盆栽的以交配種為多。

昔日是為了利用它的纖維製造布或繩索等而種植於野外，現在卻為了碧綠葉片及動人的美妙花朵，大都因觀賞為目的，以盆栽、吊盆等栽培而走入家庭。花形嬌小、鮮紅色下垂的鐘狀花蕾前端，綻放裙子狀的黃色花瓣，形成紅黃對比，豔麗非凡的花朵，頗受大眾喜愛。

植株穩健、花色鮮美、葉色深綠、葉片呈水平生長而葉背無粉虱或紅蜘蛛等蟲害痕跡的為佳品。

栽培方法

(一)性喜強光與高溫、排水良好的環境。在夏季，假如能在戶外栽培，有助於開花、生長。如果置於室內栽培，應放在向陽的窗台，接受直射日光，並經常轉動花盆，方能促進著花及良好的生長。冬天休眠期間，需要保持攝氏十度以上方能順利過冬。若是溫度低於十度以下，葉片會下垂且失去光澤，甚至枯萎、落葉。

(二)開花期間澆水要適量，每隔一、兩天充分澆水一次。若溫度低於攝氏十度就要減少澆水量，不使盆土完全乾涸即可。

(三)開花期間需肥較多，一旦缺肥，葉片會泛黃，同時也會影響開花量。因此六到九月之間應使用緩效性肥料，以防缺肥（使用量請詳閱附帶盒內說明書）。

(四)根部糾結、排水欠佳或植株太大時，可在夏季進行換盆移植。

(五)繁殖法有播種及扦插兩種。

綻放不絕

火焰花

火焰花，屬茜草科，原產地為南美洲的蔓性常綠灌木；莖、葉背的葉脈及花冠都有絨毛。

花容嬌小可愛，花梗自葉腋處長出，豔紅色花冠前端，點綴著一小部分金黃色四裂的花瓣，形成紅黃相稱，美麗可人的花朵。修長的莖，一般盤繞插在盆土內的細木條向上生長，極適於盆栽。花期相當長，自春季到晚秋綻放不絕。花量多、對土壤的選擇不嚴、栽培容易、生長強健等的優點良多，為大眾喜愛的室內植物之一。

植株穩健、花色鮮美，花蕾、花數多，葉色碧

綠而無病蟲害痕跡者為佳品。

栽培方法

(一) 性喜明亮的光照及排水良好的環境，但忌直射陽光。在生長活躍期間正常室溫很適宜，在冬季休眠期間的理想溫度為攝氏十二度至十五度，不管室內或室外，若能滿足此要求，就會生長良好。

(二) 在生長旺盛期間，大量澆水，保持盆土徹底滋潤，但不能讓花盆浸在水中。在休眠期間需減少水量，祇要盆土不乾涸即可。

(三) 在生長旺盛期內，每兩星期施標準液肥一次，休眠期間內不必施肥。

(四) 如果發現根露出土面，就要將植株移入大一號的花盆中栽培。換到最大的合適花盆後就不必再換，每年春季用新鮮培養土作一次表土追肥，同時也要適當修剪和整形，以保持良好外型。

(五) 利用扦插法繁殖；三、四月為適期。



艷陽嬌客

非洲菊



非洲菊又名太陽花、大丁草、嘉賓菊等，屬菊科，原產地為南非的宿根草本植物；盆栽大多為園藝改良品種。

品種繁多，有單瓣、重瓣。花型、花色亦依品種不同而各異；目前已有巨大朵的重瓣花出現。花期很長，尤其盆栽的如果條件得當，全年都能開花，但主要花期為夏季。若將顏色不同的品種混植在一盆，盛開時會形成五彩繽紛，鮮美悅目的盆栽，更令人喜愛。

花色鮮明、花朵大、花蕾多之外，葉片要硬而不易掉落的植株方為佳品。倘若葉片有扭曲現象，即表示已有害蟲（紅蜘蛛）寄生；此蟲以一般農藥也不易驅除，不得不小心。

栽培方法

(一) 性喜充分的光照及排水、通風良好的環境。故宜將花盆放置於向陽的窗台、陽台或有遮雨設備的屋頂花園。此花的耐寒力亦強，雖然花莖會因氣溫而伸縮，長短不定，但祇要維持攝氏八度以上，冬天也能開花。

(二) 生長旺盛期和開花期間都要適量澆水，使盆土經常保持濕潤；盆土過份乾旱及過度潮濕都會影響到開花。最標準的澆水法是待盆土泛白時再澆水。水份不可灑在花朵上，會傷及花朵。

(三) 由於生長、開花期間極長，應兩週施一次稀薄液肥；肥份不可過量，植株才不會徒長。

(四) 發現根部已長滿了盆中，而引起開花減少或生長遲鈍時，應移植至較大的花盆栽培。

(五) 繁殖法有播種、分株等；祇要溫度夠，全年均可播種，分株適期為春末初夏。

