

2006年全国各类成人高考（专科起点升本科）

医学综合应试模拟

陈 燕 主编

2006最新版

 高等教育出版社

2006年全国各类成人高考（专科起点升本科）

医学综合应试模拟

主 编	陈 燕	李效义
副主编	许永照	于则利
	黄捷英	

2006最新版

 高等教育出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

医学综合应试模拟/陈燕主编. —北京:高等教育出版社, 2006. 4

2006 年全国各类成人高考. 专科起点升本科

ISBN 7 - 04 - 018845 - 7

I. 医... II. 陈... III. 医学 - 成人教育: 高等教育 - 习题 - 升学参考资料 IV. R - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 017682 号

策划编辑 田晓兰 责任编辑 薛 玥 封面设计 王 唯
版式设计 马静如 责任印制 陈伟光

出版发行	高等教育出版社	购书热线	010-58581118
社 址	北京市西城区德外大街 4 号	免费咨询	800-810-0598
邮政编码	100011	网 址	http://www.hep.edu.cn
总 机	010-58581000		http://www.hep.com.cn
		网上订购	http://www.landracom.com
经 销	蓝色畅想图书发行有限公司		http://www.landracom.com.cn
印 刷	涿州市星河印刷有限公司	畅想教育	http://www.widedu.com

开 本	787×1092	1/8	版 次	2006 年 3 月第 1 版
印 张	10.5		印 次	2006 年 3 月第 1 次印刷
字 数	230 000		定 价	16.00 元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 请到所购图书销售部门联系调换。

版权所有 侵权必究
物料号 18845-00

出版前言

2005年年末,教育部高校学生司和教育部考试中心重新修订颁布了《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲》。为了满足广大考生复习备考的需求,我们组织长期从事成人高考复习辅导的专家、教授以及参加过大纲编写修订的专家和考试命题研究人员,编写了政治、英语、教育理论、大学语文、艺术概论、民法、高等数学(一)、高等数学(二)、生态学基础和医学综合十门课程的复习考试辅导教材。

本套书是与辅导教材配套的复习备考强化冲刺阶段用书。书中的模拟试卷严格按照2006年版考试大纲中规定的试卷内容比例、试卷题型比例、试卷难易比例编制,按考试科目独立编装成册,每册包含10套左右试卷,同时根据不同科目的特点,部分用书编写了“解题指导”等内容。

本套书的作者为“专升本”复习辅导教材的原班人马,对成人高考的教学与辅导均有深入研究,对成人高考的命题思路也多有所了解。相信本套书的问世,将会对各类成人高考“专升本”考生检验自己的复习效果,进行考前“实战演练”提供更多帮助。

高等教育出版社
2006年2月

目 录

模拟试卷(一)	1
模拟试卷(一) 参考答案	7
模拟试卷(二)	9
模拟试卷(二) 参考答案	16
模拟试卷(三)	17
模拟试卷(三) 参考答案	23
模拟试卷(四)	25
模拟试卷(四) 参考答案	31
模拟试卷(五)	33
模拟试卷(五) 参考答案	39
模拟试卷(六)	41
模拟试卷(六) 参考答案	47
模拟试卷(七)	49
模拟试卷(七) 参考答案	55
模拟试卷(八)	57
模拟试卷(八) 参考答案	63
模拟试卷(九)	65
模拟试卷(九) 参考答案	71
模拟试卷(十)	73
模拟试卷(十) 参考答案	79

模拟试卷(一)

一、A 型题:共 84 小题。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 骨是一种器官,它的构造包括

- A. 骨髓、骨密质、骨膜及血管淋巴管和神经
- B. 骨质、骨膜、骨髓及血管淋巴管和神经
- C. 骨质、红骨髓、骨膜及血管淋巴管和神经
- D. 骨松质、骨密质、骨膜及血管淋巴管和神经
- E. 红骨髓、黄骨髓、骨质及血管淋巴管和神经

2. 肋

- A. 由肋骨和肋软骨组成
- B. 分为真肋和浮肋
- C. 第 8~12 对肋形成肋弓
- D. 第 2 对肋骨与胸骨角侧面的肋切迹形成关节
- E. 无上述情况

3. 下列哪个结构在体表摸不到

- A. 髭岬
- B. 髭角
- C. 耻骨结节
- D. 髭前上棘
- E. 髭结节

4. 不属于咀嚼肌的是

- A. 咬肌
- B. 翼内肌
- C. 翼外肌
- D. 颞肌
- E. 颊肌

5. 股四头肌麻痹时,其主要运动障碍是不能

- A. 内收大腿
- B. 伸大腿
- C. 伸小腿
- D. 屈小腿
- E. 外展大腿

6. 小肠的描述,错误的是

- A. 是消化管最长的一段
- B. 成人全长约 5~7 m
- C. 是消化吸收最旺盛的部位
- D. 全部被肠系膜固定于腹后壁,活动性较大

E. 分十二指肠、空肠和回肠

7. 胰的描述,不正确的是

- A. 分头、体、尾三部
- B. 在第 1、2 腰椎水平横卧于腹后壁
- C. 胰头被十二指肠环抱
- D. 胰尾抵达左肾门

E. 胰既是消化腺也含内分泌细胞

8. 肾的构造

- A. 肾髓质由肾锥体和肾柱构成
- B. 肾乳头开口于肾盂
- C. 相邻的几个肾小盏汇成一个肾大盏
- D. 肾柱是肾髓质伸入肾皮质内的部分
- E. 肾大盏出肾门汇合成输尿管

9. 下列哪个结构不位于精索内

- A. 射精管
- B. 睾丸动脉
- C. 蔓状静脉丛
- D. 神经和淋巴管
- E. 输精管

10. 会阴的描述,错误的是

- A. 广义会阴是指封闭骨盆下口的所有软组织
 - B. 狭义的会阴是指肛门与外生殖器之间的软组织
 - C. 其前界为耻骨联合下缘
 - D. 盆膈封闭肛门三角
 - E. 尿生殖三角内女性只有尿道通过
11. 窦房结
- A. 结内为神经细胞
 - B. 其功能是传导冲动
 - C. 位于下腔静脉与右心耳交界处的心外膜深面
 - D. 为心的正常起搏点
 - E. 通过房室束将冲动传至房室结
12. 腹腔干和肠系膜上动脉的直接分支不包括
- A. 肝总动脉
 - B. 胃左动脉
 - C. 回结肠动脉
 - D. 胃右动脉
 - E. 脾动脉
13. 关于上腔静脉系的描述,错误的是
- A. 由左、右头臂静脉合成
 - B. 沿升主动脉右侧下行
 - C. 走行中穿过腔静脉孔
 - D. 入右心房前收纳奇静脉
 - E. 收集头颈、上肢、胸壁和部分胸腔脏器的静脉血
14. 巩膜静脉窦位于
- A. 角膜内
 - B. 巩膜内
 - C. 虹膜根部
 - D. 巩膜与角膜连接处的深部
 - E. 巩膜与睫状体连接处
15. 听觉感受器位于
- A. 前庭膜
 - B. 基底膜
 - C. 壶腹嵴
 - D. 椭圆囊斑
 - E. 球囊斑
16. 骶副交感核位于脊髓
- A. 第 1~3 骶节
 - B. 第 2~4 骶节
 - C. 第 1~4 骶节
 - D. 第 2~5 骶节
 - E. 第 3~5 骶节
17. 支配咀嚼肌的纤维起于
- A. 面神经核
 - B. 三叉神经中脑核
 - C. 三叉神经脑桥核
 - D. 三叉神经脊束核
 - E. 三叉神经运动核
18. 从脑干背面出脑的神经是
- A. 动眼神经
 - B. 三叉神经
 - C. 滑车神经
 - D. 展神经
 - E. 视神经
19. 下列哪个核团属内脏感觉核?

- A. 迷走神经背核 B. 泌涎核 C. 孤束核
D. 薄束核 E. 疑核
20. 脐周围感觉神经来自
A. 第4肋间神经的前皮支 B. 第6肋间神经的前皮支 C. 第8肋间神经的前皮支
D. 第10肋间神经的前皮支 E. 第12肋间神经的前皮支
21. 舌下神经
A. 支配舌骨上、下肌群的运动 B. 传导舌的味觉 C. 支配舌内、外肌的运动
D. 一侧损伤,舌尖偏向对侧 E. 传导舌的黏膜感觉
22. 正常人体内环境的理化特性经常保持何种状态?
A. 固定不变 B. 相对恒定 C. 随机多变
D. 绝对平衡 E. 在一定时间内绝对不变
23. 下列哪种离子的膜内外浓度之比决定锋电位的高度?
A. K^+ B. Na^+ C. Ca^{2+} D. Mg^{2+} E. Cl^-
24. 有机磷农药中毒时,骨骼肌痉挛主要是由于
A. ACh释放减少 B. ACh释放增多
C. 胆碱酯酶活性降低 D. 胆碱酯酶活性增强
E. 终板膜上的受体增多
25. 正常人血浆的 pH 为
A. 6.35 ~ 6.45 B. 6.50 ~ 7.05 C. 7.10 ~ 7.30
D. 7.35 ~ 7.45 E. 7.50 ~ 7.65
26. 当心脏处于全心舒张期时
A. 心室达到最大充盈 B. 房室瓣关闭 C. 心室容积不变
D. 动脉瓣关闭 E. 心室内压略高于心房内压
27. 影响心搏出量的因素不包括
A. 心室舒张末期充盈量 B. 动脉血压 C. 心肌收缩能力
D. 心率 E. 心室肌细胞动作电位跨膜离子流动的种类
28. 当血浆蛋白显著减少时水肿的主要原因是
A. 血浆晶体渗透压下降 B. 血浆胶体渗透压下降 C. 心肌收缩能力
D. 毛细血管壁通透性增加 E. 有效滤过压下降
29. 心迷走神经对心脏的作用可被下列哪一种受体的拮抗剂所阻断?
A. M胆碱能受体 B. N_1 胆碱能受体 C. N_2 胆碱能受体
D. β_1 肾上腺素受体 E. β_2 肾上腺素受体
30. 维持胸内负压的必要条件是
A. 吸气肌收缩 B. 呼气肌收缩 C. 胸膜腔密闭
D. 胸廓扩张 E. 呼吸道存在一定的阻力
31. 正常成年人安静时,通气/血流比值的正常值是
A. 0.48 B. 0.64 C. 0.84 D. 1.4 E. 0.58

32. 低氧对呼吸的刺激作用是通过
A. 直接兴奋延髓吸气神经元
B. 直接兴奋脑桥调整中枢
C. 外周化学感受器所实现的反射性效应
D. 刺激中枢化学感受器而兴奋呼吸中枢
E. 直接刺激呼吸中枢
33. 消化道共有的运动形式是
A. 蠕动 B. 蠕动冲 C. 集团运动 D. 分节运动 E. 容受性舒张
34. 关于头期胃液分泌的叙述,正确的是
A. 只有食物直接刺激口腔才能引起 B. 是纯神经调节
C. 不包括条件反射 D. 传出神经是交感神经
E. 酸度高、消化力强
35. 测定基础代谢率的条件,错误的是
A. 清醒 B. 静卧 C. 餐后2h D. 室温25℃ E. 肌肉放松
36. 重吸收 Na^+ 能力最强的部位是
A. 近球小管 B. 髓袢降支 C. 髓袢升支
D. 远曲小管 E. 集合管
37. 下述哪种情况下尿量增多与抗利尿激素无关?
A. 大量饮水 B. 血浆晶体渗透压降低 C. 循环血量增加
D. 静脉输入低渗液体 E. 静脉输入甘露醇
38. 远处物体平行光线聚焦于视网膜之前是
A. 近视 B. 远视 C. 老视 D. 散光 E. 斜视
39. 兴奋性突触后电位是指在突触后膜上发生的电位变化为
A. 极化 B. 超极化 C. 后电位
D. 复极化 E. 去极化
40. 叩击跟腱引起相连的同块肌肉收缩,属于
A. 肌紧张 B. 腱反射 C. 屈肌反射
D. 姿势反射 E. 多突触反射
41. 在中脑上、下丘之间切断脑干的动物将出现
A. 肢体麻痹 B. 去皮质强直 C. 脊髓休克
D. 腱反射加强 E. 动作不精确
42. 下列哪个激素不是腺垂体分泌的?
A. 促甲状腺激素 B. 黄体生成素 C. 催产素
D. 催乳素 E. 促肾上腺皮质激素
43. 瞳孔扩大是由下列哪种神经调节的?
A. 副交感神经 B. 交感神经 C. 视神经
D. 展神经 E. 三叉神经

44. 下列哪一项属于脑膜刺激征?
A. 巴宾斯基征 B. 肱二头肌反射 C. 凯尔尼格征
D. 霍夫曼征 E. 跖反射
45. 呼吸深大见于
A. 肺纤维化 B. 原发性高血压 C. 急性肺炎
D. 支气管扩张 E. 酮症酸中毒
46. 男性,64岁。既往冠心病病史15年。昨日突然出现心悸伴呼吸困难。查体:Bp 120/90 mmHg,心率130次/min,听诊心律不规则,第一心音强弱不等,最可能的诊断是
A. 频发房性期前收缩 B. 频发室性期前收缩 C. 心房颤动
D. 三度房室传导阻滞 E. 阵发性室上性心动过速
47. 全身神经系统检查不包括
A. 脑神经检查 B. 运动神经检查 C. 感觉神经检查
D. 自主神经检查 E. 意识状态
48. 体格检查的基本方法不包括
A. 视诊 B. 触诊 C. 叩诊 D. 问诊 E. 听诊
49. 男性,18岁。右侧呼吸运动减弱,语颤消失,右下叩诊实音,实音区上方闻及支气管呼吸音。首先应考虑为
A. 支气管哮喘 B. 大叶性肺炎 C. 肺不张
D. 胸腔积液 E. 支气管肺癌
50. 胸痛、咳嗽、呼吸困难,下列哪项有助于气胸和胸腔积液的鉴别?
A. 呼吸运动 B. 叩诊音 C. 气管位置 D. 呼吸音 E. 摩擦音
51. 心房颤动的患者可出现下列哪一项体征?
A. S₁、S₂同时减弱伴奇脉 B. A₂减弱伴水冲脉 C. S₁强弱不等伴短绌脉
D. S₁减弱伴无脉 E. P₂增强伴交替脉
52. 有关步态的描述下列哪一项是错误的?
A. 蹒跚步态 走路时身体左右摇摆似鸭状步态
B. 醉酒步态 移步时,下肢内收过度,两腿交叉如剪刀状
C. 共济失调步态 行走时将足高抬,骤然落下,双目向下注视,两脚间距较宽,闭目时摇晃不稳
D. 慌张步态 起步后小步急速行走,身体前倾的慌张步态
E. 跨阈步态 患足下垂,行走时必须高抬患侧下肢
53. 第二心音固定分裂最常见于何种疾病?
A. 室间隔缺损 B. 动脉导管未闭 C. 房间隔缺损
D. 右束支传导阻滞 E. 左束支传导阻滞
54. 下列组合哪一项是正确的?
A. 左侧卧位——主动脉瓣关闭不全的舒张期杂音明显
B. 坐位前倾位——二尖瓣狭窄的舒张期杂音明显
C. 深吸气时——左心发生的杂音增强

- D. 深呼气时——右心发生的杂音增强
E. 左侧卧位——二尖瓣狭窄的舒张期杂音明显
55. 下列哪项不是引起慢性腹痛的常见原因?
A. 肝癌 B. 克罗恩病(节段性回肠炎) C. 肠蛔虫病
D. 溃疡穿孔 E. 肝淤血
56. 中毒性呼吸困难难见于下列各项,但除外
A. 尿毒症酸中毒 B. 一氧化碳中毒 C. 吗啡中毒
D. 碱中毒 E. 糖尿病酮症酸中毒
57. 粪便外带鲜血,表示出血可能在
A. 上消化道 B. 小肠 C. 升结肠
D. 回盲部 E. 乙状结肠
58. 血尿伴剧烈腹痛最常见于
A. 膀胱结核 B. 肾炎 C. 肾肿瘤
D. 泌尿系结石 E. 以上都不是
59. 搏动性头痛常见于
A. 高热引起头痛 B. 血管性头痛 C. 青光眼引起的头痛
D. 中耳炎引起的头痛 E. 三叉神经痛
60. 白细胞分类中,淋巴细胞百分比为
A. 10%~30% B. 20%~40% C. 30%~50% D. 10% E. 25%
61. 尿沉渣计数(Addis计数)中管型的参考值为
A. <1 000/12 h B. <2 000/12 h C. <3 000/12 h
D. <4 000/12 h E. <5 000/12 h
62. 腰椎穿刺鞘内给药时,正确的方法是
A. 放出的脑脊液量>给药量
B. 放出的脑脊液量<给药量
C. 先注入药物,然后再留取脑脊液送检
D. 放出的脑脊液量应与注入药物量相等
E. 以上均错误
63. 下列哪项不是预激综合征的特点?
A. QRS增宽 B. 心房起始部有δ波 C. PR间期缩短
D. A型V₁~V₆导联QRS群均向上 E. B型V₁以S波为主,V₆以R波为主
64. 关于肥厚型心肌病,错误的是
A. 非梗阻型者室壁均匀增厚或心尖部增厚
B. 梗阻型者心肌肥厚以室间隔特别是基底部最为明显
C. 梗阻型者出现二尖瓣前叶SAM征
D. 脉冲及连续多普勒检查显示左室流出道高速射流频谱
E. 只要出现室间隔心肌肥厚均可确定是肥厚型心肌病

65. 符合溶血性黄疸的是

- A. 总胆红素:170 $\mu\text{mol/L}$, 直接胆红素:60 $\mu\text{mol/L}$, 间接胆红素:110 $\mu\text{mol/L}$
- B. 总胆红素:17.1 $\mu\text{mol/L}$, 直接胆红素:6.8 $\mu\text{mol/L}$, 间接胆红素:10.2 $\mu\text{mol/L}$
- C. 总胆红素:170 $\mu\text{mol/L}$, 直接胆红素:10.0 $\mu\text{mol/L}$, 间接胆红素:160 $\mu\text{mol/L}$
- D. 总胆红素:1.7 $\mu\text{mol/L}$, 直接胆红素:0 $\mu\text{mol/L}$, 间接胆红素:1.7 $\mu\text{mol/L}$
- E. 总胆红素:34.0 $\mu\text{mol/L}$, 直接胆红素:24.0 $\mu\text{mol/L}$, 间接胆红素:10.0 $\mu\text{mol/L}$

66. 维持体液平衡,保持内环境稳定,机体主要通过下面哪个系统或器官?

- A. 神经 B. 内分泌系统 C. 下丘脑 - 垂体后叶 - 抗利尿激素系统
- D. 肾 E. 肾素 - 醛固酮系统

67. 外科患者最易发生哪种体液代谢失调?

- A. 等渗性缺水 B. 低渗性缺水 C. 高渗性缺水
- D. 急性水中毒 E. 慢性水中毒

68. 在休克监测中,哪项观察结果表示预后极差,甚至死亡率可达 100%?

- A. 中心静脉压低于 0.49 kPa B. 肺动脉楔压超过 4.0 kPa
- C. 乳酸盐浓度超过 8 mmol/L D. 动脉二氧化碳分压高于 5.33 kPa
- E. 血小板计数低于 $8.0 \times 10^9/\text{L}$

69. 休克患者代偿期的主要表现为

- A. 脉细速、血压低、脉压显著缩小
- B. 脉细速、血压低、脉压轻度缩小
- C. 脉细速、血压正常、脉压无变化
- D. 脉稍快、血压正常或稍高、脉压缩小
- E. 脉细速、血压轻度降低、脉压无变化

70. 疖病皮肤感染常见于

- A. 糖尿病患者 B. 肝炎患者 C. 胃癌患者
- D. 胃溃疡患者 E. 血管病患者

71. 指甲下脓肿应采取的最佳措施是

- A. 理疗 B. 热敷 C. 抗生素
- D. 拔除指甲 E. 在甲沟处切开引流

72. 多系统器官衰竭是指

- A. 三个系统或(和)器官的急性衰竭
- B. 一个系统的两个器官的急性衰竭
- C. 一个系统的三个器官的急性衰竭
- D. 一个系统或(和)器官病变为另一个系统或器官的发病原因
- E. 一个以上系统或(和)器官在急性疾病过程中相继出现衰竭

73. 多系统或(和)器官衰竭最常见的是

- A. 胃肠、心、肺 B. 脑、肺、血液 C. 心、肺、肾
- D. 肝、肾、胃肠 E. 血液、心、胃肠

74. 男性患者,右大腿刀刺伤 16 h,伤口红肿并有渗出血,目前最适当的治疗是

- A. 清创缝合 B. 抗生素治疗 C. 理疗
- D. 换药 E. 局部固定

75. 女性患者,30 岁,面部刀刺伤 12 h,最恰当的治疗是

- A. 清创缝合 B. 延期缝合 C. 换药
- D. 理疗 E. 热敷

76. 受伤肢体严重肿胀,组织广泛破坏、出血和坏死,应诊断为

- A. 扭伤 B. 挫伤 C. 挤压伤 D. 冲击伤 E. 创伤性窒息

77. 女,65 岁,背部有一 4 cm $\times$ 3 cm 大小肿块,质软,呈分叶状,边界不太清楚,活动度较小,无压痛,表面皮肤无红肿,未见静脉扩张,最可能的诊断是

- A. 皮肤癌 B. 平滑肌瘤 C. 神经纤维瘤
- D. 皮脂腺囊肿 E. 脂肪瘤

78. 有关浅部血管瘤的描述错误的是

- A. 毛细血管瘤多见于婴儿,女性占多数
- B. 血管瘤由血管组织构成
- C. 海绵状血管瘤由较粗的迂曲血管构成
- D. 蔓状血管瘤大多数为静脉构成,有的为动静脉并存
- E. 浅部血管瘤的三种类型均为良性

79. 一肝癌患者,术中输血几毫升后,突然咳嗽、面色潮红、腹泻,疑发生了变态反应和过敏反应,其处理宜

- A. 立即减慢输血速度 + 肌内注射异丙嗪
- B. 立即停止输血、半坐位、吸氧
- C. 四肢轮流扎止血带
- D. 停止输血 + 口服阿司匹林
- E. 立刻中止输血并保持静脉输液畅通 + 抗过敏药物

80. 一患者,男,43 岁,因胃溃疡行胃大部切除术,术后切口血肿,但尚未化脓,则该患者的切口为

- A. I 类切口/丙级愈合 B. II 类切口/乙级愈合
- C. II 类切口/丙级愈合 D. III 类切口/乙级愈合
- E. III 类切口/丙级愈合

81. 一民工在工地干活,踩到一生锈铁钉,刺破右足,来院就诊。见伤口血已自止,边缘略肿胀,伤处及周围有泥土等污物,宜进行的处理是

- A. 清洁去污并清理伤口,行一期缝合
- B. 注射破伤风抗毒素
- C. 选用抗生素
- D. 减少活动、抬高患肢
- E. 以上各项均正确

82. 一小儿,8 岁,因倒开水时不慎摔倒,双上肢被烧伤,创面渗出明显,创底肿胀发红,摸之温度较

高,有疼痛,则对该患者烧伤面积和深度的诊断是

- A. 9%, I°烧伤 B. 10%, 深 II°烧伤 C. 10%, 浅 II°烧伤
D. 18%, 浅 II°烧伤 E. 18%, 深 II°烧伤

83. 有效的口对口人工呼吸可使患者的动脉血氧分压达到

- A. 9.8 kPa B. 10.6 kPa C. 11.5 kPa D. 11.2 kPa E. 7.8 kPa

84. 治疗 ARDS 的有效措施是

- A. 鼻导管吸氧 6~8 L/min
B. 限制输液量和速度
C. 应用支气管扩张药
D. 早期人工正压通气
E. 以上都不是

二、**B 型题**:共 24 小题。A、B、C、D、E 是其下 2~3 道小题的备选项,每小题只能从中选择一个最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或多次。

- A. 上鼻道 B. 中鼻道 C. 下鼻道 D. 上鼻甲 E. 下鼻甲

1. 属面颅骨的是

2. 筛窦的后群开口于

- A. 角膜 B. 虹膜 C. 脉络膜 D. 晶状体 E. 玻璃体

3. 调节射入眼内光线的结构是

4. 不含血管,具有丰富感觉神经末梢的结构是

- A. 桡神经 B. 肌皮神经 C. 尺神经
D. 腋神经 E. 正中神经

5. 支配肱桡肌的神经是

6. 支配喙肱肌的神经是

- A. 刺激外周化学感受器
B. 刺激中枢化学感受器
C. 直接抑制呼吸中枢
D. 直接刺激呼吸中枢
E. 直接刺激脑桥呼吸调整中枢

7. 动脉血中 $P(\text{CO}_2)$ 升高时引起呼吸加强主要机制是

8. 低 O_2 时对呼吸的刺激作用完全是通过

- A. 每搏输出量 B. 心率 C. 外周阻力
D. 主动脉和大动脉 E. 循环血量

9. 收缩压的高低主要反映以上哪项的多少?

10. 舒张压的高低主要反映以上哪项的大小?

- A. 去甲肾上腺素 B. 乙酰胆碱 C. 肾上腺素
D. 多巴胺 E. 5-羟色胺

11. 心迷走神经末梢释放的递质是

12. 心交感神经末梢释放的递质是

13. 副交感神经节前纤维释放的递质是

- A. 平卧位腹壁松弛,呈蛙腹状
B. 腹部膨隆呈球形
C. 腹部外形如舟状
D. 腹部外形略呈凸起状
E. 腹部外形局限性膨隆

下列疾病,腹部视诊可见哪项体征?

14. 肝硬化腹腔积液

15. 巨大卵巢囊肿

16. 消耗性疾病晚期

- A. 肺尖部前后 B. 腋窝下部 C. 胸骨两侧第 1、2 肋间隙
D. 肩胛间区第 3、4 胸椎水平 E. 背部第 6、7 颈椎附近

上述各项是正常人哪种呼吸音听诊的常见部位?

17. 支气管呼吸音

18. 肺泡呼吸音

- A. 疼痛放射至左腰部
B. 疼痛放射至左上臂及前臂尺侧
C. 疼痛放射至腹股沟
D. 疼痛放射至右肩部
E. 疼痛放射至下腹部

19. 泌尿系结石

20. 心绞痛

21. 胰腺炎

- A. 低钾血症 B. 高钾血症 C. 高渗性缺水
D. 等渗性缺水 E. 低渗性缺水

22. 肌无力为最早临床表现的疾病是

23. 可致心脏骤停的是

24. 出现肌痉挛性抽搐,肌腱反射减弱或消失的疾病是

三、**X 型题**:共 12 小题。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,至少有一项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案,多选或少选均不得分。

1. 肋膈隐窝

- A. 是胸膜腔的一部分
B. 由肋胸膜与膈胸膜反折形成
C. 在深吸气时,肺下缘也不能伸入其间
D. 是胸膜腔位置最低的部分
E. 每侧呈半环形

2. 腹主动脉成对的脏支有
- A. 肾动脉 B. 腹腔干 C. 肾上腺中动脉
- D. 睾丸动脉 E. 肠系膜上动脉
3. 对内脏运动神经的描述,正确的是
- A. 不受意志直接控制
- B. 支配心肌、平滑肌和腺体
- C. 包括交感神经和副交感神经
- D. 从中枢发出后直达所支配的器官
- E. 在大脑皮质和皮质下中枢的控制之下
4. 左心室泵血时
- A. 室壁心肌的收缩和舒张是造成室内压力变化的原因
- B. 压力梯度是推动血液在腔室之间流动的主要动力
- C. 瓣膜的活动可控制血流方向
- D. 瓣膜的活动与室内压的变化无关
- E. 心房收缩对于心室充盈只起锦上添花的作用
5. 对非特异投射系统的叙述,错误的是
- A. 它与经典感觉传导路无关
- B. 在脑干网状结构内经单个突触传递
- C. 由丘脑发出纤维弥散地投射到大脑皮质
- D. 容易受药物影响
- E. 具有维持和改变大脑皮质兴奋状态之功能
6. 有关皮疹的描述,下列哪些是正确的?
- A. 斑疹 局部皮肤发红,界限分明,一般不凸出皮面
- B. 玫瑰疹 为直径 2~3 mm 的鲜红色圆形斑疹,压之褪色
- C. 丘疹 局部皮肤发红,不凸起于皮面
- D. 斑丘疹 隆起的丘疹伴有周围皮肤发红的底盘
- E. 荨麻疹 为稍隆起皮面的苍白或红色的局限性水肿,有奇痒
7. 下列哪些病变叩诊出现鼓音?
- A. 近胸壁处肺囊肿 B. 胸腔积液 C. 纵隔积气
- D. 肺内大空洞 E. 左下胃泡区
8. 淋巴细胞病理性增多可见于
- A. 急性粒细胞性白血病 B. 风疹、水痘等病毒感染 C. 传染性单核细胞增多症
- D. 结核病和病毒性肝炎 E. 淋巴瘤
9. 少尿可因下列哪几项引起?
- A. 休克 B. 肾动脉血栓形成 C. 隐匿性肾小球肾炎
- D. 急性肾小球肾炎 E. 一侧输尿管结石
10. 下列哪项可出现肝浊音界扩大?

- A. 急性肝炎 B. 肝癌 C. 急性肝坏死
- D. 肝脓肿 E. 肝囊肿
11. 呼吸道疾病患者术前准备应注意
- A. 麻醉前给药剂量的酌情增加
- B. 术前严格禁烟 1~2 周
- C. 鼓励练习深呼吸及咳嗽
- D. 术前应用抗生素
- E. 给予支气管扩张药或祛痰药
12. 下列哪种血液不应输用?
- A. 血浆与血细胞之间有一层黄白色物 B. 血浆呈淡红色
- C. 血浆混浊有絮状物 D. 库存 2 周以上
- E. 血瓶标签模糊

模拟试卷(一) 参考答案

一、A 型题

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. B | 2. A | 3. A | 4. E | 5. C | 6. D | 7. D | 8. C | 9. A | 10. E |
| 11. D | 12. D | 13. C | 14. D | 15. B | 16. B | 17. E | 18. C | 19. C | 20. D |
| 21. C | 22. B | 23. B | 24. C | 25. D | 26. D | 27. E | 28. B | 29. A | 30. C |
| 31. C | 32. C | 33. A | 34. E | 35. C | 36. A | 37. E | 38. A | 39. E | 40. B |
| 41. B | 42. C | 43. B | 44. C | 45. E | 46. C | 47. E | 48. D | 49. D | 50. B |
| 51. C | 52. B | 53. C | 54. E | 55. D | 56. D | 57. E | 58. D | 59. B | 60. B |
| 61. E | 62. D | 63. B | 64. E | 65. C | 66. C | 67. A | 68. C | 69. D | 70. A |
| 71. D | 72. E | 73. C | 74. D | 75. A | 76. C | 77. E | 78. C | 79. E | 80. B |
| 81. E | 82. D | 83. B | 84. D | | | | | | |

二、B 型题

- | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. E | 2. A | 3. B | 4. A | 5. A | 6. B | 7. B | 8. A | 9. A | 10. C |
| 11. B | 12. A | 13. B | 14. A | 15. E | 16. C | 17. E | 18. B | 19. C | 20. B |
| 21. A | 22. A | 23. B | 24. E | | | | | | |

三、X 型题

- | | | | | | | |
|----------|---------|----------|----------|---------|---------|--------|
| 1. ABCDE | 2. ACD | 3. ABCE | 4. ACE | 5. AB | 6. ABDE | 7. ADE |
| 8. BCDE | 9. ABDE | 10. ABDE | 11. BCDE | 12. BCE | | |

模拟试卷(二)

一、A 型题:共 82 小题。在每小题给出的 A、B、C、D、E 五个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1. 骨的构造

- A. 颅盖骨的外层为骨密质,内层为骨松质
- B. 除关节面外,新鲜骨的表面都覆有骨膜
- C. 成人长骨髓腔内充满了红骨髓
- D. 黄骨髓失去造血功能,不可重新转化为红骨髓
- E. 老年时期骺软骨全部骨化,并可见融合的痕迹即骺线

2. 胸骨角

- A. 位于胸骨柄和胸骨体的结合处
- B. 位于胸骨体和剑突的结合处
- C. 微向后凸出
- D. 侧方与第 3 肋软骨连接
- E. 向后对应第 2、3 胸椎体之间

3. 对关节的描述,正确的是

- A. 关节面、关节囊、关节腔是关节的基本结构
- B. 关节面表面覆盖一薄层骺软骨
- C. 关节囊的滑膜层与纤维膜之间的间隙称关节腔
- D. 关节窝周围均附有关节唇
- E. 每个关节都有囊内和囊外韧带加强

4. 胸锁乳突肌

- A. 起于胸锁关节,止于乳突
- B. 一侧收缩使头屈向同侧面转向对侧
- C. 两侧同时收缩使头前屈
- D. 属舌骨上肌群
- E. 由颈神经前支配

5. 属于上消化道的器官是

- A. 空肠
- B. 回肠
- C. 盲肠
- D. 十二指肠
- E. 阑尾

6. 空肠

- A. 主要位于腹腔的右下部
- B. 是小肠的起始段,与回肠分界明显
- C. 有系膜连于腹后壁,活动性较大
- D. 占空、回肠全长的 3/5
- E. 管壁较薄,管腔较小,血管较少

7. 呼吸系统的组成和功能

- A. 呼吸系统只有进行气体交换的功能

B. 主支气管及其在肺内的分支称为呼吸道

C. 由呼吸道和肺两部分组成

D. 肺由肺泡组成

E. 喉、气管、支气管为下呼吸道

8. 肾柱

- A. 位于肾皮质内
- B. 呈锥体形
- C. 是肾皮质伸入肾锥体之间的部分
- D. 是肾髓质伸入肾皮质内的部分
- E. 被肾大盏围绕

9. 射精管开口于尿道的

- A. 前列腺部
- B. 膜部
- C. 尿道球部
- D. 海绵体部
- E. 舟状窝部

10. 体循环终止于

- A. 全身各毛细血管
- B. 左心房
- C. 右心房
- D. 右心室
- E. 肺泡周围的毛细血管网

11. 胸导管

- A. 起始部位于腹主动脉前方和膈脚之间
- B. 由左、右腰干和左、右肠干汇合而成
- C. 收纳下半身及左侧上半身的淋巴
- D. 经主动脉裂孔入胸腔,沿脊柱左前方上行
- E. 行于胸主动脉后方

12. 不属于肠系膜上动脉的分支是

- A. 空、回肠动脉
- B. 回结肠动脉
- C. 左结肠动脉
- D. 中结肠动脉
- E. 右结肠动脉

13. 头臂静脉由以下哪两种静脉汇合而成?

- A. 颈外静脉与锁骨下静脉
- B. 颈外静脉与颈内静脉
- C. 锁骨下静脉与颈内静脉
- D. 左、右头臂静脉
- E. 锁骨下静脉与头静脉

14. 虹膜

- A. 位于眼球血管膜的中部

- B. 可以调节晶状体的曲度
C. 从房水中获得营养
D. 分隔眼前房和眼后房
E. 后方紧连脉络膜

15. 头部旋转运动的感受器位于

- A. 前庭膜
D. 椭圆囊斑
B. 基底膜
E. 球囊斑

16. 成人脊髓圆锥下端平齐

- A. 第1腰椎下缘
D. 第12胸椎下缘
B. 第2腰椎下缘
E. 第1骶椎下缘

17. 支配眼部上斜肌的纤维起于

- A. 动眼神经核
D. 三叉神经运动核
B. 滑车神经核
E. 面神经核

18. 舌的味觉纤维走行在

- A. 面神经和舌下神经
D. 舌下神经和迷走神经
B. 面神经和舌咽神经
E. 舌咽神经和迷走神经

19. 支配旋后肌的是

- A. 正中神经
D. 桡神经
B. 肌皮神经
E. 尺神经

20. 关于坐骨神经的描述哪项是错误的?

- A. 发自骶丛
B. 穿梨状肌下孔出盆腔

C. 经臀大肌深面至大腿后面,发出分支支配该肌

D. 在胭窝上角处分为胫神经和腓总神经

E. 分支支配大腿后群肌

21. 视觉性语言中枢位于

- A. 两半球中央前回
D. 优势半球颞上回后部
B. 两半球中央后回
E. 优势半球额下回后部

22. 在人体生理功能的调控过程中,控制部分的功能活动随受控部分发出的信息加强而减弱,这样调控的过程称之为

- A. 自身调节
D. 负反馈调节
B. 反射调节
E. 神经分泌调节

23. 组织兴奋性降低,组织的

- A. 静息电位值减小
D. 阈值增加
B. 动作电位减小
E. 反应性增加

24. 细胞膜在静息情况下,对下列哪种离子通透性最大?

- A. K^+
D. Ca^{2+}
B. Na^+
E. Mg^{2+}
C. Cl^-

25. 心肌不会产生强直收缩,其原因是

- A. 心肌是功能上的合胞体
B. 心肌肌质网不发达, Ca^{2+} 贮存少
C. 心肌的有效不应期特别长
D. 心肌有自律性,能自动节律收缩
E. 心肌呈“全或无”收缩

26. 兴奋在心脏内传导速度最慢的部位是

- A. 窦房结
B. 房室束
C. 左右束支
D. 浦肯野纤维
E. 房室交界

27. 在心室等容收缩期时

- A. 房内压 > 室内压 > 主动脉压
B. 房内压 < 室内压 > 主动脉压
C. 房内压 = 室内压 > 主动脉压
D. 房内压 < 室内压 < 主动脉压
E. 房内压 > 室内压 < 主动脉压

28. 迷走神经对心脏的作用是

- A. 心率减慢,传导加快,而不应期缩短
B. 心率减慢,传导慢,而不应期延长
C. 心率减慢,传导慢,而不应期缩短
D. 心率加快,传导慢,而不应期缩短
E. 心率加快,传导加快,而不应期缩短

29. 呼吸频率加倍,潮气量减半时,将使

- A. 每分通气量增加
D. 每分通气量减小
B. 肺泡通气量增加
E. 肺泡通气量减少

30. 体内 CO_2 分压最高的是

- A. 静脉血液
D. 组织液
B. 毛细血管血液
E. 细胞内液

31. 基本呼吸节律产生于

- A. 脊髓
D. 间脑
B. 延髓
E. 大脑皮质

32. 胃液中的酶能消化的营养物质是

- A. 脂肪
D. 蛋白质
B. 糖类
E. 无机盐

33. 胆汁中参与脂肪消化和吸收作用的成分是

- A. 碳酸氢盐
D. 胆色素
B. 胆盐
E. 磷脂酰胆碱

34. 呼吸商是指同一时间内

- A. 耗 O_2 量/混合食物
B. 混合食物/耗 O_2 量

- C. 耗 O_2 量/ CO_2 产生量 D. CO_2 产生量/耗 O_2 量
E. CO_2 产生量/非蛋白质食物

35. 肾小球滤过率是指

- A. 两侧肾脏每分钟生成的原尿量
B. 一侧肾脏每分钟生成的原尿量
C. 两侧肾脏每分钟生成的尿量
D. 一侧肾脏每分钟生成的尿量
E. 两侧肾脏每分钟的血浆流量

36. 关于 H^+ 分泌的描述,错误的是

- A. 近球小管、远曲小管和集合管均可分泌
B. 分泌过程与 Na^+ 的重吸收有关
C. 有利于 HCO_3^- 的重吸收
D. 可阻碍 NH_3 的分泌

37. 内耳感觉换能作用发生在

E. H^+ 的分泌对维持血液的酸碱平衡有重要意义

38. 关于抑制性突触后电位的产生,正确的叙述是

- A. 鼓膜 B. 卵圆窗膜 C. 圆窗膜 D. 前庭膜 E. 基底膜
A. 突触前轴突末梢超极化
B. 突触后膜对 Ca^{2+} 、 K^+ 通透性增大
C. 突触后膜去极化
D. 突触后膜出现超极化
E. 突触后膜出现复极化

39. 下列哪一项不属于脊髓休克的表现?

- A. 大小便失禁
B. 血压下降
C. 断面以下脊髓支配的骨骼肌肌紧张降低
D. 发汗反射消失
E. 断面以下脊髓反射活动消失

40. α 受体的阻断剂是

- A. 筒箭毒 B. 阿托品 C. 普萘洛尔
D. 酚妥拉明 E. 西咪替丁

41. 糖皮质激素分泌的调节主要是通过

- A. 交感神经 B. 副交感神经
C. 促肾上腺皮质激素释放激素 D. 下丘脑-腺垂体系统 E. 自身调节

42. 一女性患者,40岁,既往有风湿性心脏病史,近一周出现咳嗽、咳痰,双下肢浮肿,不能平卧。该患者还可能出现下列哪项体征?

- A. 呼吸过缓 B. 陈-施(Cheyne-Stokes)呼吸 C. 潮氏呼吸

- D. 呼吸过速 E. 叹息样呼吸

43. 肝门静脉阻塞门脉高压时,腹壁静脉血流方向正确的是

- A. 脐以上静脉血流方向自上而下,脐以下则自下而上
B. 脐以上静脉血流方向自上而下,脐以下也自上而下
C. 脐以上静脉血流方向自下而上,脐以下则自上而下
D. 脐以上静脉血流方向自下而上,脐以下也自下而上
E. 与正常时静脉血流方向相反

44. 判定腹部膨隆时的体位是

- A. 立位 B. 左侧卧位 C. 坐位 D. 仰卧位 E. 右侧卧位

45. 腹膜刺激征的发生机制为

- A. 壁层腹膜受到刺激 B. 内脏神经受到刺激 C. 壁腹膜和脏腹膜刺激
D. 胃肠道痉挛 E. 腹膜外血管收缩

46. 一胸腔积液患者,胸部X线片显示右侧肋膈角变钝,该侧胸部的叩诊音应为下列哪一项?

- A. 清音 B. 浊音 C. 实音 D. 浊鼓音 E. 空瓮音

47. 高调金属音的肠鸣音亢进最常见于

- A. 消化道出血 B. 腹泻 C. 急性胃肠炎
D. 机械性肠梗阻 E. 服泻药后

48. 胸膜摩擦感可于下列哪个时相触及?

- A. 吸气早期 B. 呼吸两相均可 C. 呼气末
D. 屏气时 E. 咳嗽时

49. 第三心音产生是由于

- A. 心房收缩的振动 B. 舒张早期血流冲入心室引起心室壁的振动
C. 二尖瓣开放 D. 心室舒张受限产生振动
E. 二、三尖瓣关闭不同步所致

50. 主动脉瓣听诊区第二心音增强,最常见于下列何种疾病?

- A. 二尖瓣狭窄 B. 二尖瓣关闭不全 C. 原发性高血压
D. 左心功能不全 E. 主动脉瓣关闭不全

51. 下列是关于心脏叩诊的描述,其中哪一项是错误的?

- A. 先叩左界,后叩右界
B. 由下而上、由外向内叩诊
C. 叩出的绝对浊音界反映心脏的大小

D. 患者坐位时,检查者左手叩诊板指与心缘平行

E. 患者仰卧位时,检查者左手叩诊板指与心缘垂直

52. 局部视诊包括下列各项,但应除外哪一项?

- A. 胸廓 B. 腹形 C. 包块硬度 D. 关节外形 E. 骨骼

53. 男性,36岁,早年有风湿性关节炎史,近二周有心悸、气促、不能平卧。查体:心尖部第一心音减弱,有3/6级全收缩期吹风样杂音和舒张期隆隆样杂音伴震颤,最可能诊断为

- A. 二尖瓣狭窄伴器质性关闭不全
B. 二尖瓣狭窄伴相对性关闭不全
C. 二尖瓣狭窄伴主动脉瓣狭窄
D. 二尖瓣关闭不全伴相对性二尖瓣狭窄
E. 二尖瓣狭窄伴主动脉瓣关闭不全
54. 慢性上腹痛, 呕吐后缓解, 可见于
A. 胆石症 B. 反流性食管炎 C. 幽门梗阻
D. 慢性阑尾炎 E. 溃疡病
55. 混合性发绀可见于
A. 全心衰竭 B. 局部静脉病变 C. 严重受寒
D. 高原地区 E. 缩窄性心包炎
56. 促胃液素瘤引起的腹泻属于
A. 吸收不良性腹泻 B. 动力学腹泻 C. 渗出性腹泻
D. 渗透性腹泻 E. 分泌性腹泻
57. 全身肌肉松弛, 对各种刺激全无反应, 深浅反射均消失属于
A. 中度昏迷 B. 浅昏迷 C. 深度昏迷
D. 嗜睡 E. 昏睡
58. 下列哪项咯血不是肺淤血引起的?
A. 二尖瓣狭窄
B. 高血压左心功能不全
C. 先天性心脏病房间隔缺损
D. 肺栓塞
E. 先天性肺动脉高压
59. 正常成人血清钾的参考值为
A. 3.5 ~ 5.0 mmol/L B. 3 ~ 5 mmol/L C. 4 ~ 5.0 mmol/L
D. 4.1 ~ 5.6 mmol/L E. 3 ~ 6 mmol/L
60. 关于腰椎穿刺正确的是
A. 穿刺针以平行脊部方向缓慢进入
B. 穿刺针与脊部成 30°角缓慢进入
C. 术后患者应去枕平卧 36 h
D. 放脑脊液前应先接测压管测压
E. 任何人均应做 Queckenstedt 试验
61. 异常 Q 波可见于下列各项, 但除外
A. 心肌梗死 B. 右室肥大 C. 心肌病
D. 肺梗死 E. 预激综合征
62. 关于正常人体温下列哪项是错误的?
A. 口测法(舌下温度)正常值为 36.0 ~ 37.5 °C

- B. 腋测法为 36 ~ 37 °C
C. 肛测法为 36.5 ~ 37.7 °C
D. 妇女在月经前及妊娠期体温稍高
E. 老年人因代谢率减低, 其体温低于青少年
63. 除下列哪项外, 均与水肿有关?
A. 继发性醛固酮增多导致钠与水的潴留
B. 淋巴或静脉回流受阻
C. 慢性肝病时球蛋白增高
D. 急性肾炎时毛细血管通透性增高
E. 右心功能不全时毛细血管小静脉端静水压升高
64. 总胆固醇增高不会出现在
A. 糖尿病 B. 肾病综合征 C. 甲状腺功能减退
D. 胆总管阻塞 E. 甲状腺功能亢进
65. 单纯二尖瓣狭窄 M 型超声心动图不出现
A. 二尖瓣前叶舒张期呈“城墙样”改变
B. 二尖瓣后叶为中间位或同向
C. 二尖瓣瓣膜活动曲线增粗、回声增强
D. 左室增大
E. 左房增大
66. 幽门梗阻的患者, 因长期呕吐常易发生
A. 低钾低氯性碱中毒 B. 低钾高氯性碱中毒
C. 高钾高氯性碱中毒 D. 高钾低氯性碱中毒
E. 高钾高氯性酸中毒
67. 血清钾 3.0 mmol/L, 血清钠 134 mmol/L 考虑为
A. 低血钾, 高渗性缺水
B. 低血钾, 低渗性缺水
C. 低血钾, 血钠过高
D. 低血钾, 等渗性缺水
E. 低血钾, 入量不足
68. 如未发生休克, 休克指数应是
A. 0.1 B. 0.5 C. 1.0 D. 1.5 E. 2.0
69. 休克患者中心静脉压和血压低, 表明
A. 血容量不足 B. 心功能不全
D. 血容量严重不足 E. 容量血管过度收缩
70. 关于丹毒, 下列哪项不正确?
A. 由 β -溶血性链球菌引起
B. 丹毒属于网状淋巴管炎

- C. 疖肿、足癣等可为诱发因素
D. 除下肢好发外,面部亦常见
E. 丹毒蔓延快,常伴有组织坏死
71. 破伤风最早出现强烈收缩的肌肉是
A. 上肢肌 B. 背肌 C. 颈项肌 D. 嚼肌 E. 下肢肌
72. 下列哪项疾病可作为 MSOF 的发病基础?
A. 严重的损伤如大面积烧伤和外科手术
B. 严重的急腹症如出血坏死性胰腺炎
C. 腹外其他部位的化脓性病变如脓毒血症
D. 心跳呼吸复苏后,产后大出血
E. 以上都是
73. 关于输血的作用,下列哪项是错误的?
A. 可补充血容量 B. 改善循环能力
C. 增加血浆蛋白,促进伤口愈合 D. 输入抗体可杀灭细菌
E. 改善凝血功能,有助于止血
74. 有关溶血反应的治疗,下列哪项是错误的?
A. 5% 碳酸氢钠 250 mL 静脉滴注
B. 20% 甘露醇静脉快速滴注
C. 减慢输血速度至每分钟 10 滴
D. 肝素治疗
E. 输血浆
75. 复苏后治疗的主要内容是
A. 维持良好的呼吸功能
B. 确保循环功能的稳定
C. 防治肾衰竭
D. 脑复苏
E. 防治感染
76. 循环骤停时,对缺氧最敏感的是
A. 大脑皮质 B. 心肌 C. 延髓呼吸中枢
D. 皮质下中枢 E. 血管运动中枢
77. 一成年男子,被烧伤部位有面部、颈部、双手、双前臂、双足及双小腿,则该患者烧伤面积为
A. 24% B. 30% C. 40% D. 37% E. 47%
78. 对烧伤创面的处理,下列说法中不正确的是
A. 宜先行烧伤清创术
B. 小面积的 II° 烧伤者,如水疱完整,宜先在表面涂碘附,再吸出疱内液体,包扎
C. 创面涂抗生素软膏,以防止细菌感染
D. 头部、颈部创面宜用暴露法

- E. 全身多处烧伤可用包扎和暴露相结合的方法
79. 下列哪一项不属于临界性肿瘤?
A. 良性肿瘤位于两个脏器交界处
B. 包膜不完整的纤维瘤
C. 生物学行为介于良恶性之间
D. 切除后易复发
E. 唾液腺混合瘤
80. 下列哪一项不是良性肿瘤的特征?
A. 有包膜 B. 生长慢 C. 不转移
D. 浸润性生长 E. 细胞分化好
81. 深 II° 烧伤的烧伤深度可达
A. 表皮层 B. 真皮层 C. 真皮深层 D. 皮肤全层 E. 皮下组织
82. 下述哪一个不是烧伤浅 II° 的临床表现?
A. 局部呈现红肿,有疼痛和烧灼感,皮温稍增高
B. 渗出较多,水疱较饱满,创底肿胀发红,有剧痛和感觉过敏,皮温增高
C. 水疱较小或较扁薄,感觉稍迟钝,皮肤湿度稍低,去表皮后创面呈浅红或红白相间,可见网状栓塞血管
D. 创面无水疱,蜡白或焦黄,可见树枝状栓塞血管,感觉消失,皮温低
E. 以上各项都不是
- 二、B 型题:共 24 小题。A、B、C、D、E 是其下 2~4 道小题的备选项,每小题只能从选择一个最符合题目要求的,每个选项可以被选择一次或多次。
- A. 肩关节 B. 肘关节 C. 拇指腕掌关节 D. 膝关节 E. 踝关节
1. 具有关节唇的关节是
2. 具有囊内韧带的关节是
3. 眼前房与眼后房的分界是
4. 产生房水的部位是
A. 泪腺 B. 腮腺 C. 汗腺 D. 胃腺 E. 肠腺
5. 交感神经支配
6. 面神经支配
A. 等容收缩期 B. 等容舒张期 C. 快速充盈期
D. 减慢射血期 E. 快速射血期
7. 室内压大幅度升高是在
8. 室内压大幅度下降是在
9. 大部分血液进入心室是在
10. 室内压最低是在
A. 肾小球 B. 近球小体 C. 近球小管