

# 中国野生花卉图谱

## WILD FLOWERS OF CHINA

程绪珂 主编

上海文化出版社

### Cruciferae

*Cardamine tangutorum*(Cruciferae)

**Description:** Perennial herb, 20-40 cm high; rhizome, slender stems upright, rarely branching, lower part often leafless, 3-6 leaves at upper part, stem leaves pinnate, leaflets oblong-lanceolate, margin toothed. Raceme terminal, flowers 12-15, reddish purple. Long pods, strip shape; Blooming from April to May.

**Range:** Hebei, Shanxi, Gansu, Qinghai Sichuan and Yunnan.

**Habitat:** Mountain slopes or moist valleys, under woods.

**Use:** Ornamental.

### 十字花科

#### 紫花碎米荠

科属 十字花科、碎米荠属

**形态** 多年生草本，高20-40厘米。

根状茎细长。茎直立，不分枝或少分枝，

下部通常无叶，上部有

3-6片叶。茎生叶为

羽状复叶，小

叶片矩圆状披

针形，边缘有锯

齿。总状花序顶生，开花时近伞房状，

有花12-15朵。花红紫色，长约1



厘米。长角果条形。花期4-5月。

**产地分布** 河北、山西、陕西、甘

肃、青海、新疆、四川、云南。

**生境** 山坡林下或沟谷湿润处。

**用途** 观赏。



# 中国野生花卉图谱

责任编辑：何聿光  
封面设计：周艳梅

---

中国野生花卉图谱

程绪珂主编

---

上海文化出版社出版、发行 上海绍兴路74号

新华书店经销 深圳中华商务联合印刷有限公司印刷

开本 889 × 1194 1/16 印张 13.25 插页 4 图、文 196 面

1998 年 9 月第 1 版 1998 年 9 月第 1 次印刷

印数 1-3,000 册

---

ISBN 7-80511-778-0/S · 24 定价： 98 元

# 序

中国风景园林学会理事长

中国建设部原副部长 周干峙

中国科学院院士

中国幅员辽阔,复杂的地形、地貌,特别是自西向东巨大的垂直高差和自南向北纬度的跨越,加上气候与土壤的变化,形成多种多样的自然条件,从而使各种不同生态要求的植物都能各得其所,生长繁育。野生花卉是自然植被群落中的重要部分,它们各自顽强地生长于严酷的自然环境,有的生于雪山峻岭,有的长在悬崖峭壁,有的藏于密林峡谷,有的布于田间溪畔,作为丰富多彩的地球生态环境中不可缺少的环节。野生花卉花色艳丽,花姿多变,是大自然留给人类的一笔巨大的财富和珍贵的遗产。

中国的野生花卉资源,种类丰富,绚丽多彩,是珍贵的植物种质资源。我国栽培花卉的历史源远流长,是多种世界名贵花卉的起源中心。中国的梅花、莲花、菊花有三千多年的栽培历史;山茶、兰花、芍药有二千多年的栽培历史;牡丹、海棠、水仙等也有一千年以上的栽培历史。它们的“祖先”均是野生种。

中国的野生花卉不但是花卉育种的原始材料,而且还是药物、食品、油料、香料、纤维、工业制品等不可缺少的原料,应该深入地调查,切实地保护,进行合理利用,并使其繁衍。

中国的野生花卉又是一种景观资源、旅游资源。自然风景和植被可形成不同的景点和景观,是自然保护区和风景名胜区的的重要组成部分。它既是科学研究的对象,又是美不胜收的游览场所。

《中国野生花卉图谱》所介绍的野生花卉,是一批为自然资源保护和研究繁育而无私奉献的科学工作者、园林专家,在对全国野生花卉资源进行深入调查、整理和总结的基础上,从云南、四川、广西、浙江、新疆、甘肃、内蒙、山西、吉林等省、自治区的野生花卉中精选出来的,既可作为自然资源调查研究的一项丰硕成果,又可作为进一步研究、利用、育种、驯化等工作的珍贵资料。《中国野生花卉图谱》的问世,必将引起海内外园林界和物种多样性保护工作者的重视,并促进对野生花卉的保护、研究和利用,为保护生态环境,丰富人们的生活作出贡献。

# 中国的野生花卉

中国风景园林学会副理事长

上海市绿化委员会顾问 程绪珂

教授级高级工程师

花,给人类带来了五彩缤纷的大千世界。中国的花卉,争妍斗艳,种类繁多。中国是奇花异木的王国。

## 一、野生花卉的历史

所谓野生花卉,就是未经人工驯养和栽种的花草。野生花卉在漫长的岁月里,经历了从无到有,从少到多,从简单到复杂,从低级到高级的发展过程。它们是三十多亿年中进化的产物。这是全人类的财富。

我国领土广阔,自然条件复杂,蕴藏着极为丰富的植物资源,有野生花卉近三万种,居世界第三位。我国有一部分地区,未遭受冰川的破坏,故保留了在北半球一些地区早已灭绝的古老的孑遗植物。我国具有丰富的植被类型,从低纬度的雨林、季雨林至高纬度的寒温带针叶林及草原、荒漠,从低海拔的阔叶林至高海拔的暗针叶林及高山灌丛与高山草甸应有尽有。这多种多样的植被类型,孕育了多姿多彩的野生花卉。这些野生花卉的根、茎、叶、花、果实和种子,既有观赏价值,又有经济价值。

中国的野生花卉在大自然中经受了生存竞争,有的被淘汰灭绝,有的顽强地生存下来,并“传宗接代”。在我国新石器时代的仰韶文化遗物中,有一块刻有花卉等图案花纹的陶块。在距今约七千年前的河姆渡遗址中,有稻谷和花卉的遗迹,其中还有荷花的花粉化石。这说明从很早的时候起,我们的祖先就已将野生花卉栽培成家养花卉而欣赏了。

## 二、野生花卉的现状

现在,有些地方对植物资源开发不当,森林大量被砍伐,草原因过度放牧而退化,湿地因大量围垦而消退,这使野生花卉的生境遭到破坏,有些野生花卉已处于濒临灭绝的境地。据国际自然和自然资源保护部门的统计,现在企业界已有10%的高等植物种类其生存受到威胁。并估计到2000年,全世界受威胁的植物种类将达到六千种。据估计,我国现有三千种高等植物处于受威胁的状态。具有重要科学、经济、文化、观赏价值的植物种类,现已急剧减少,有的物种甚至已经灭绝。

1993年6月欧洲各国在芬兰赫尔辛基开会,提出了森林持续经营的要求,其中强调要“保持住森林中的生物多

样性,包括种内基因的多样性、物种的多样性、生物群落及生态系统的多样性和自然景观的多样性……。”野生花卉是自然植被中各种植物群落的重要组成部分,有了野生花卉,就有千变万化的植物群落,如植被遭破坏,类型繁多的植物群落及其中的野生花卉也将随之消失。我们要共同努力,使中国的森林全面达到持续发展的理想境界,为人类的生存和发展提供优质的资源 and 环境。

### 三、野生花卉的应用价值

野生花卉有广泛的用途,有些花卉,不但可以观赏,还可食用、入药、提取香精、作工业原料等。野生花卉极大地丰富了城市景观,而且起着保持水土、净化空气、促进生态平衡等作用。野生花卉是育种的种质资源和原始材料,有的还是珍稀的种质资源。

### 四、野生花卉的研究

对于我国的野生花卉资源,必须进行全面深入的调查研究,采取就地保护、迁地保护的措施,进行引种繁育,建立引种圃和繁殖园,并将经人工引种繁殖的花卉种群“归化自然”,再返还到原来的生境中去,使其逐渐恢复到野生状态。我国有些地方的植物园,建立了保存植物种质资源的基因库,已引种保存植物种类一万三千多种。如广西南宁建立了金花茶基因库,收集和人工栽培了金花茶组的二十个种和变种,这对保护自然生长的金花茶种质资源和开展金花茶的全面研究,具有重要作用。又如上海植物园已引入栽培国家珍稀濒危保护植物一百零一种,其中属一级重点保护植物六种,二级保护植物三十八种,三级保护植物五十七种。湖北省保康野生腊梅自然保护区对野生腊梅资源进行了调查,为合理开发腊梅资源提供了科学依据,建立了引种驯化培育基地,驯化腊梅及其他树种五万多株,还利用腊梅花提取香精等。

我国野生花卉资源丰富,为了防止野生花卉资源破坏,必须坚决贯彻《环境保护法》、《森林法》、《草原法》、《野生药材资源保护管理条例》和《自然保护纲要》。对破坏野生植物的行为,必须严肃处理。

### 五、野生花卉的发展前景

中国是多种世界名贵花卉的起源中心,是世界的植物资源宝库之一。深受世界人民赞赏的月季、杜鹃、报春、菊花、牡丹、兰花、茶花、荷花等,其“祖先”有不少是我国的野生种花卉。

今后,我们要将生物技术应用到花卉育种与品质改良上,通过远缘杂交育成各种花卉新品种,使其具有好看、实惠、抗病虫、抗寒、耐热、抗旱、耐湿、耐瘠薄、抗盐碱、适应性强、可粗放管理等特性。我们还要应用花药培养,单倍体育种,体细胞无性系变异、突变筛选及染色体工程,研究发展花卉业。同时,也要应用我国传统的花卉育种栽培技术。我们要培育出更多更好的既有经济价值又有观赏价值的花卉新品种,形成自己独特的花卉新种优势,满足国内外市场的需要,为我国国民经济的发展做出贡献。

# 目次

|         |     |        |    |
|---------|-----|--------|----|
| 序       | 周千峙 | 天南星    | 13 |
| 中国的野生花卉 | 程绪珂 | 石柑子    | 14 |
| 爵床科     |     | 狮子尾    | 14 |
| 黄花假杜鹃   | 2   | 大叶崖角藤  | 15 |
| 小驳骨     | 2   | 犁头尖    | 15 |
| 火焰花     | 3   | 马兜铃科   |    |
| 多花钩粉草   | 4   | 广西马兜铃  | 16 |
| 大花老鸦嘴   | 4   | 耳叶马兜铃  | 16 |
| 猕猴桃科    |     | 萝藦科    |    |
| 狗枣猕猴桃   | 4   | 小叶眼树莲  | 17 |
| 铁线蕨科    |     | 翅果藤    | 17 |
| 掌叶铁线蕨   | 5   | 三分丹    | 18 |
| 石蒜科     |     | 蛇菰科    |    |
| 西南文殊兰   | 5   | 印度蛇菰   | 18 |
| 罗裙带     | 6   | 小檗科    |    |
| 水鬼蕉     | 6   | 金花小檗   | 19 |
| 番荔枝科    |     | 紫葳科    |    |
| 假鹰爪     | 7   | 毛叶猫尾木  | 20 |
| 云南假鹰爪   | 7   | 单叶菠萝花  | 20 |
| 夹竹桃科    |     | 多小叶鸡肉参 | 21 |
| 白麻      | 8   | 火烧花    | 21 |
| 尖山橙     | 8   | 乌毛蕨科   |    |
| 帘子藤     | 9   | 苏铁蕨    | 22 |
| 天南星科    |     | 蜡梅科    |    |
| 菖蒲      | 9   | 夏蜡梅    | 22 |
| 越南万年青   | 10  | 桔梗科    |    |
| 海芋      | 10  | 石沙参    | 23 |
| 疣柄魔芋    | 11  | 聚花风铃草  | 23 |
| 魔芋      | 11  | 紫斑风铃草  | 24 |
| 东北天南星   | 12  | 桔梗     | 24 |
| 灯台莲     | 13  |        |    |

白花菜科

刺山柑 25

忍冬科

猬实 25

山银花 26

桦叶荚蒾 27

天目琼花 27

石竹科

石竹 28

瞿麦 29

大花剪秋萝 29

葫芦草 30

变黑女娄菜 30

长白米努草 31

膨萼蝇子草 31

卫矛科

粉背南蛇藤 32

异色假卫矛 32

金粟兰科

及己 32

使君子科

使君子 33

菊科

千叶蓍 33

牛蒡 34

菊苣 35

绒背蓟 35

小红菊 36

野菊 36

小苧菊 37

毛山菊 37

蓝刺头 38

火绒草 38

佩兰 39

鳢蓟 39

雪莲花 40

绵头雪兔子

(绵头雪莲花) 40

水母雪兔子 41

苞叶雪莲 41

毡毛雪莲 42

叉枝鸦葱 42

桃叶鸦葱 43

天山千里光 43

水飞蓟 44

莲座绢毛菊 44

旋花科

田旋花 45

山茱萸科

狭叶四照花 45

景天科

落地生根 46

狼爪瓦松 46

小丛红景天 47

对叶景天 47

费菜 48

长药景天 48

藏瓦莲 49

十字花科

紫花碎米荠 49

双脊荠 50

长瓣高河菜 50

葫芦科

盆子草 51

木鳖子 52

骨碎补科

肾蕨 52

珙桐科

|             |    |              |    |
|-------------|----|--------------|----|
| 光叶珙桐        | 53 | <b>龙胆科</b>   |    |
|             |    | 达乌里龙胆        | 70 |
| <b>川续断科</b> |    | 白山龙胆         | 70 |
| 华北蓝盆花       | 53 | 鳞叶龙胆         | 71 |
| 大花刺参        | 54 | 扁蕾           | 71 |
|             |    | 大钟花          | 72 |
| <b>槲蕨科</b>  |    |              |    |
| 皇冠蕨         | 54 | <b>牻牛儿苗科</b> |    |
|             |    | 藏西老鹳草        | 72 |
| <b>麻黄科</b>  |    |              |    |
| 中麻黄         | 55 | <b>苦苣苔科</b>  |    |
|             |    | 长茎芒毛苣苔       | 73 |
| <b>杜鹃花科</b> |    | 大花芒毛苣苔       | 73 |
| 美丽马醉木       | 55 | 华丽芒毛苣苔       | 74 |
| 腺房杜鹃        | 56 | 牛耳朵          | 74 |
| 白雪杜鹃        | 57 | 条叶唇柱苣苔       | 74 |
| 朱砂杜鹃        | 58 | 石花           | 74 |
| 革叶杜鹃        | 58 | 瑶山苣苔         | 76 |
| 楔叶杜鹃        | 59 | 长檐苣苔         | 76 |
| 马缨杜鹃        | 59 | 圆唇苣苔         | 77 |
| 金顶杜鹃        | 60 | 异裂苣苔         | 77 |
| 密枝杜鹃        | 60 |              |    |
| 乳黄叶杜鹃       | 60 | <b>藤黄科</b>   |    |
| 露珠杜鹃        | 61 | 金丝桃          | 77 |
| 薄叶马银花       | 61 |              |    |
| 照山白         | 62 | <b>鸢尾科</b>   |    |
| 亮毛杜鹃        | 62 | 射干           | 77 |
| 迎红杜鹃        | 63 | 西南鸢尾         | 78 |
| 山生杜鹃        | 63 | 蝴蝶花          | 78 |
| 魁斗杜鹃        | 64 | 长白鸢尾         | 79 |
| 陇蜀杜鹃        | 64 | 紫花鸢尾         | 79 |
| 腋花杜鹃        | 65 | 鸢尾           | 80 |
| 苞叶杜鹃        | 65 | 粗根鸢尾         | 80 |
| 大王杜鹃        | 66 |              |    |
| 多色杜鹃        | 66 | <b>唇形科</b>   |    |
| 锈叶杜鹃        | 66 | 白苞筋骨草        | 81 |
| 单色杜鹃        | 66 | 多花筋骨草        | 81 |
| 川滇杜鹃        | 67 | 紫荆芥          | 82 |
| 糙毛杜鹃        | 67 | 独一味          | 82 |
| 黄杯杜鹃        | 69 | 异叶青兰         | 83 |
| 异色杜鹃        | 69 | 香青兰          | 83 |
|             |    | 野芝麻          | 84 |



|            |    |             |     |
|------------|----|-------------|-----|
| 益母草        | 85 | <b>亚麻科</b>  |     |
| 草原糙苏       | 85 | 亚麻          | 100 |
| 夏枯草        | 86 |             |     |
| 新疆鼠尾草      | 86 | <b>半边莲科</b> |     |
| 雪山鼠尾草      | 87 | 大将军         | 100 |
| 舌瓣鼠尾草      | 87 |             |     |
| 荔芝草        | 88 | <b>马钱科</b>  |     |
| 艾叶黄芩       | 88 | 互叶醉鱼草       | 100 |
| 百里香        | 88 | 断肠草         | 100 |
| <b>木通科</b> |    |             |     |
| 木通         | 88 | <b>石松科</b>  |     |
|            |    | 灯笼草         | 102 |
| <b>玉蕊科</b> |    |             |     |
| 云南梭果玉蕊     | 89 | <b>千屈菜科</b> |     |
|            |    | 千屈菜         | 102 |
|            |    | 虾子花         | 103 |
| <b>豆科</b>  |    |             |     |
| 相思子        | 89 | <b>木兰科</b>  |     |
| 深裂叶羊蹄甲     | 90 | 山玉兰         | 103 |
| 鬼箭锦鸡儿      | 90 | 红花木莲        | 104 |
| 槲藤子        | 91 | 拟单性木兰       | 104 |
| 多花木蓝       | 91 |             |     |
| 仪花         | 92 | <b>野牡丹科</b> |     |
| 香花崖豆藤      | 92 | 野牡丹         | 105 |
| 间序油麻藤      | 93 | 多花野牡丹       | 105 |
| 蓝花棘豆       | 93 | 尖子木         | 105 |
| 葛藤         | 94 |             |     |
| 无忧花        | 94 | <b>楝科</b>   |     |
| 披针叶黄华      | 95 | 鹧鸪花         | 105 |
| 长穗猫尾草      | 95 |             |     |
| <b>百合科</b> |    | <b>芭蕉科</b>  |     |
| 梭砂贝母       | 96 | 地涌金莲        | 106 |
| 宝兴百合       | 96 |             |     |
| 尖被百合       | 96 | <b>桃金娘科</b> |     |
| 山丹         | 97 | 桃金娘         | 106 |
| 岷江百合       | 97 |             |     |
| 大理百合       | 98 | <b>柳叶菜科</b> |     |
| 滇蜀豹子花      | 98 | 柳兰          | 108 |
| 多斑豹子花      | 99 |             |     |
| 藜芦         | 99 | <b>木犀科</b>  |     |
|            |    | 云南黄素馨       | 109 |

|             |     |             |     |
|-------------|-----|-------------|-----|
| 红丁香         | 109 | 多刺绿绒蒿       | 127 |
|             |     | 总状绿绒蒿       | 128 |
|             |     | 全缘绿绒蒿       | 128 |
| <b>兰科</b>   |     | 轮叶绿绒蒿       | 129 |
| 多花脆兰        | 110 | 长叶绿绒蒿       | 129 |
| 坛花兰         | 110 | 红花绿绒蒿       | 130 |
| 黄花鸟舌兰       | 111 | 美丽绿绒蒿       | 130 |
| 白芨          | 111 | 橘黄罂粟        | 131 |
| 密花石豆兰       | 112 | 山罂粟         | 131 |
| 长茎虾脊兰       | 112 |             |     |
| 三褶虾脊兰       | 112 | <b>西番莲科</b> |     |
| 梳帽卷瓣兰       | 112 | 龙珠果         | 132 |
| 蜜蜂兰         | 114 |             |     |
| 虎头兰         | 114 | <b>蓝雪科</b>  |     |
| 莲瓣兰         | 115 | 金色补血草       | 132 |
| 白玉素         | 115 |             |     |
| 碧玉兰         | 116 | <b>蓼科</b>   |     |
| 硬叶吊兰        | 116 | 刺木蓼         | 133 |
| 迪庆杓兰        | 117 | 沙拐枣         | 133 |
| 黄花杓兰        | 117 | 网脉大黄        | 134 |
| 毛杓兰         | 118 |             |     |
| 大花杓兰        | 118 | <b>水龙骨科</b> |     |
| 鼓槌石斛        | 119 | 抱石莲         | 134 |
| 流苏石斛        | 119 |             |     |
| 美花石斛        | 120 |             |     |
| 石斛          | 120 | <b>报春花科</b> |     |
| 盆距兰         | 121 | 珍珠菜         | 135 |
| 飘带兰         | 121 | 山丽报春        | 135 |
| 鹤顶兰         | 122 | 假报春         | 136 |
| 绶草          | 122 | 玉荃报春        | 136 |
| 萼脊兰         | 122 | 球花报春        | 137 |
| 算兰          | 123 | 岩报春         | 137 |
| 香荚兰         | 124 | 无粉头序报春      | 138 |
|             |     | 胭脂花         | 138 |
| <b>露兜树科</b> |     | 垂花报春        | 139 |
| 露兜树         | 124 | 多脉报春        | 139 |
|             |     | 偏花钟报春       | 140 |
| <b>罂粟科</b>  |     | 翠南报春        | 140 |
| 白屈菜         | 125 | 锡金报春        | 141 |
| 囊距紫堇        | 125 | 莖叶脆蒴报春      | 141 |
| 狭裂珠果紫堇      | 126 | 滇北球花报春      | 142 |
| 荷青花         | 126 | 高穗报春        | 142 |

**凤尾蕨科**

- 三色凤尾蕨 143  
三轴凤尾蕨 143

**毛茛科**

- 展毛乌头 144  
北乌头 144  
云岭乌头 145  
罂粟莲花 145  
大火草 146  
长白耧斗菜 146  
尖萼耧斗菜 147  
驴蹄草 147  
铁线莲 148  
褐紫铁线莲 148  
粉绿铁线莲 149  
黄花铁线莲 149  
东北铁线莲 150  
大花铁线莲 150  
准噶尔铁线莲 151  
齿叶铁线莲 151  
西伯利亚铁线莲 153  
甘青铁线莲 153  
宝兴翠雀花 153  
天山翠雀花 153  
赤芍药 154  
川赤芍 154  
白头翁 155  
毛茛 155  
金莲花 156

**红树科**

- 红树 156

**蔷薇科**

- 贴梗海棠 157  
水栒子 157  
毛叶水栒子 158  
橘红山楂 158  
山里红 159  
甘肃山楂 159  
宽叶仙女木 160

- 银露梅 160  
华中樱桃 160  
美蔷薇 161  
黄蔷薇 161  
刺梨 161  
藏边蔷薇 162  
甜茶 162  
白花地榆 163  
北京花楸 163  
陕甘花楸 164

**茜草科**

- 凤箱树 164  
蓬子菜 165  
狭叶巴戟 165  
玉叶金花 166

**无患子科**

- 栾树 166

**三白草科**

- 蕺菜 166

**虎耳草科**

- 东陵八仙花 168  
梅花草 168  
山梅花 169  
光茎虎耳草 169  
齿叶虎耳草 170  
虎耳草 170  
绣球钻地风 171

**玄参科**

- 肉果草 171  
新疆柳穿鱼 172  
弹刀子菜 172  
穗花马先蒿 172  
天目地黄 173  
包唇马先蒿 174  
长花马先蒿 174  
长毛婆婆纳 176

|            |     |           |     |
|------------|-----|-----------|-----|
| <b>卷柏科</b> |     | <b>狼毒</b> | 183 |
| 翠云草        | 176 |           |     |

|           |     |            |     |
|-----------|-----|------------|-----|
| <b>茄科</b> |     | <b>伞形科</b> |     |
| 天仙子       | 177 | 高山芹        | 183 |
| 乳茄        | 177 | 鸭巴前胡       | 184 |

|             |     |            |     |
|-------------|-----|------------|-----|
| <b>省沽油科</b> |     | <b>越橘科</b> |     |
| 省沽油         | 177 | 白花树萝卜      | 184 |
|             |     | 泡泡叶越橘      | 185 |

|            |     |            |     |
|------------|-----|------------|-----|
| <b>百部科</b> |     | <b>败酱科</b> |     |
| 对叶百部       | 179 | 黄花龙牙       | 185 |

|            |     |             |     |
|------------|-----|-------------|-----|
| <b>梧桐科</b> |     | <b>马鞭草科</b> |     |
| 火索麻        | 179 | 蓝香草         | 186 |
| 苹婆         | 179 | 莠           | 186 |
| 昂天莲        | 179 | 海州常山        | 187 |

|            |     |            |     |
|------------|-----|------------|-----|
| <b>山矾科</b> |     | <b>堇菜科</b> |     |
| 老鼠矢        | 179 | 东北堇菜       | 188 |

|             |     |            |     |
|-------------|-----|------------|-----|
| <b>蒟蒻薯科</b> |     | <b>葡萄科</b> |     |
| 蒟蒻薯         | 180 | 扁担藤        | 188 |
| 水田七         | 180 | 六方藤        | 189 |

|             |     |           |     |
|-------------|-----|-----------|-----|
| <b>红豆杉科</b> |     | <b>姜科</b> |     |
| 南方红豆杉       | 180 | 益智        | 189 |

|           |     |            |     |
|-----------|-----|------------|-----|
| <b>茶科</b> |     | <b>草豆蔻</b> | 190 |
| 尖萼红山茶     | 181 | 疣果豆蔻       | 190 |
| 木荷        | 181 | 九翅豆蔻       | 191 |
|           |     | 艳山姜        | 191 |
|           |     | 海南三七       | 192 |

|            |     |           |     |
|------------|-----|-----------|-----|
| <b>瑞香科</b> |     | <b>郁金</b> | 192 |
| 尖瓣瑞香       | 182 | 莪术        | 193 |
| 黄瑞香        | 182 | 红球姜       | 193 |


主编 程绪珂

# 中国野生花卉图谱





1



2

## 爵床科

### ● 黄花假杜鹃 1

科属 爵床科、板蓝属

形态 多年生亚灌木。穗状花序，苞片叶状。萼深裂，其中一裂片特大。花冠黄色，管短筒状，喉部近钟状。蒴果。花期5月。

产地分布 西南至台湾。

生境 海拔650~2100米的山坡、路旁、草丛、林边较潮湿处。

用途 观赏。全株可入药，制有板蓝根。

### ● 小驳骨 2

科属 爵床科、驳骨草属

形态 小灌木。株高1~1.5米，无毛。茎直立，丛生性。叶对生，披针形，顶端渐尖。穗状花序，顶生或生上部叶腋。唇形花冠，白色、粉红色，具紫斑。蒴果。花期4~6月。

产地分布 亚热带地区，台湾、广东、广西、云南。

生境 林下、灌丛或草地。

用途 全草可药用，或作园林中的绿篱。

## Acanthaceae

### *Baphicathus cursia* (Acanthaceae) 1

**Description:** Perennial sub-shrub. Spike, leafy bracts, calyx deeply lobed, one of sepals extremely big, corolla yellow with a short tube, base near bell shape; capsule. Blooming in May.

**Range:** Southwest of China.

**Habitat:** Mountain slopes, at 650~2100m altitude, roadsides, thickets, moist woodsides.

**Use:** Ornamental, whole plant used in medicine.

### *Gendarussa vulgaris* (Acanthaceae) 2

**Description:** Small shrub, height of 1~1.5m, glabrous. Upright stems, with ramifications. Leaves opposite, lanceolate, apex acuminate. Spikes terminal or upper axillary, labiate, white, pink with purple blotched. Flowering April-June. Capsule.

**Range:** Subtropical area, Taiwan, Guangdong, Guangxi and Yunnan.

**Habitat:** Growing under forests, thickets or grasslands.

**Use:** Whole plant can be medicinally used, or as hedge in garden.

● 火焰花<sup>3</sup>

科属 爵床科、火焰花属

形态 灌木。株高1~3米。茎直立,粗壮,近无毛。叶对生,椭圆形或倒卵形,长12~30厘米,两端均渐尖,两面被小点,近无毛。聚伞圆锥花序顶生,长14~18厘米。花冠管状,长约5厘米,砖红色。花期10~12月。

产地分布 云南南部西双版纳和西南部盈江。

生境 海拔400~1600米的热带雨林中。

用途 观赏。

*Phlogacanthus curviflorus* (Acanthaceae)<sup>3</sup>

Description: Evergreen shrub. Height: 1-2 m. Leaves elliptical, 12-30 cm long, 5-10 cm broad. Cymose panicle spicate, terminal, 14-18 cm long, 6-7 cm thick; purplish red. Blooming from November to December.

Range: South Yunnan, as well as Viet Nam to India.

Habitat: Growing beside gullies in tropical rainforests, at 400-800 m altitude.

Use: Used as garden ornamental.







4

*Pseuderanthemum polyanthum* (Acanthaceae) 4

**Description:** Small shrub, 1 m high. Tender branches covered with short pubescence. Opposite leaves, oblong with wavy margins. Inflorescence spike, corolla white, calyx five deep-lobed, tubulose corolla about 3 cm long, five-lobed; developed stamens 2 and undeveloped ones 2. Flowering August-September.

**Range:** Guangxi, Yunnan.

**Habitat:** Rocky places.

**Use:** The roots, leaves used in medicine.

*Thunbergia grandiflora* (Acanthaceae) 5

**Description:** Evergreen liana. Climbing up to 6-8 m high. Leaves broad-ovate, 4-10 cm long, with 3-5 palmate veins. Raceme drooped, with many florets, flowerlets 5-8 cm in diameter, blue. Blooming from March to May.

**Range:** Yunnan, Guangdong.

**Habitat:** Climbing on trees in sparse forests.

**Use:** For making screen-like landscape.

Actinidaceae

*Actinidia kolomikta* (Actinidiaceae) 6

**Description:** Deciduous climbing vine, 7-15 m long, branches brown, with flaky pith. Leaves oval or elliptical-oval, apex acutely pointed, papery, leaf tips often white or pink. Flowers white or pink, fragrant, petals oblong, anthers yellow, sepals oval, persistent; Blooming from May to June. Berries oval-oblong, maturing in September.

**Range:** Northeast, Hebei, Shanxi, Hubei, Jiangxi, Sichuan, Yunnan.

**Habitat:** Warm places of thickets or woods at 3000 m altitude.

**Use:** Beautiful climber.

● 多花钩粉草 4

**科属** 爵床科、山壳骨属

**形态** 小灌木。株高约1米。嫩枝被短柔毛。单叶对生，长椭圆形，边缘微波状。穗状花序。花白色，萼5深裂，花冠管长约3厘米，5裂。花期8~9月。

**产地分布** 广西、云南。

**生境** 石山林中。

**用途** 根、叶可药用。

● 大花老鸦嘴 5

**科属** 爵床科、山牵牛属

**形态** 常绿藤本，攀援高度达6~8米。叶宽卵形，长4~10厘米，具3~5条掌状脉。总状花序下垂，具多数小花，小花直径5~8厘米，蓝色。花期3~5月。

**产地分布** 云南、广西、广东。

**生境** 山地疏林内攀援树上。

**用途** 垂直绿化。

猕猴桃科

● 狗枣猕猴桃 6

**科属** 猕猴桃科、猕猴桃属

**形态** 攀援落叶藤本，长7~15米。枝具片状髓，褐色。叶卵形或椭圆状卵形，端尾渐尖，质薄，上半部常变白色或粉红色。雌雄异株或杂性。花白色或粉红色，有芳香。花瓣长圆形。花药黄色。萼片卵圆形，宿存。花期5~6月。浆果卵状长圆形，9~10月果熟。

**产地分布** 产我国东北、河北、陕西、湖北、江西、四川、云南；在朝鲜、日本等国亦有分布。

**生境** 林中或灌丛中，暖地海拔约3000米处。

**用途** 美化墙面、棚架或攀附于树上。



5



6





7



8

## 铁线蕨科

### ● 掌叶铁线蕨 7

科属 铁线蕨科、铁线蕨属

形态 株高 40~80 厘米。根状茎斜升,顶部有褐棕色阔披针形鳞片。叶为羽状复叶,近簇生,草质,无毛;小羽片近三角形,背面灰绿色,上缘浅裂并有钝齿,叶脉扇状分叉。叶柄栗红色,基部具密鳞片。孢子囊群生于由裂片顶部反折的囊群盖下面。

产地分布 广布于我国东北、华北、西南。朝鲜、日本、俄国远东地区、尼泊尔及北美也有分布。

生境 山地林下、林缘、沟旁较阴湿处。

用途 室内盆栽观赏、切花、露地阴生植物。

### *Adiantum pedatum* (Adiantaceae) 7

**Description:** Plant 40-80 cm high. Rhizomes tilted, maroon, wide-lanceolate scales on its top. Pinnately compound leaves, fascicled, herbaceous, glabrous; petioles maroon-red densely scaly at base, pinnules triangle, grey-green beneath, apex lobed and toothed, veins flabellate dichotomous. Spores grow on the top beneath.

**Range:** Widely in Northeast, Southwest and Northern China, Korea, Japan, Russia, the Far East areas.

**Habitat:** Shade and moist sites under mountain forests.

**Use:** Pot plant, cutflowers or grow in shade places outdoor.

## 石蒜科

### ● 西南文殊兰 8

科属 石蒜科、文殊兰属

形态 粗壮草本。鳞茎卵球形。叶带状,长约 70 厘米,渐尖,全缘。花葶直立,高约 80 厘米。伞形花序,有花数朵至 10 朵。总苞片 2,披针形,苞片多数。花被近漏斗形高脚碟状,白色,有红晕,有芳香。花被筒长约 9 厘米。花期 6~8 月。

产地分布 云南、广西、贵州、四川。

生境 河床沙地上。

用途 叶可药用。

## Amaryllidaceae

### *Crinum asiaticum* var. *sinicum* (Amaryllidaceae) 8

**Description:** A strong herbaceous perennial. 20-30 leaves, multi-lobed, linear-lanceolate, acuminate, with wavy margins. Umbels of 10-24 flowers each, bracts spathe-like, lanceolate in form. Flowers hypocrateriform, fragrant, greenish-white; Blooming June-August.

**Range:** Widely growing in the provinces of Fujian, Taiwan, Guangdong, Guangxi.

**Habitat:** Seashores or sandy area by rivers.

**Use:** The leaves and bulbs used in medicine.