



MINGGUI WANSHANGNIAO

JIANSHANG YU YANGHU

名贵玩赏鸟鉴赏与养护

王增年 李树忠 安 宁 编著




江苏科学技术出版社

IVT JINGGUI WANSHANGNIAO
JIANSHANG YU YANGHU

名贵玩赏鸟鉴赏与养护

王婉年 李树忠 安 宁 编著

江苏工业学院图书馆
藏书章



江苏科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

名贵玩赏鸟鉴赏与养护 / 王增年, 李树忠编著. — 南京: 江苏科学技术出版社, 2003.3

ISBN 7—5345—3853—X

I. 名… II. ①王…②李… III. 玩赏鸟—驯养
IV. S865.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2003) 第 011422 号

名贵玩赏鸟鉴赏与养护

编 著 王增年 李树忠 安 宁
责任编辑 郁宝平

出版发行 江苏科学技术出版社
(南京市湖南路 47 号, 邮编: 210009)

经 销 江苏省新华书店
制 版 南京人民印刷厂制版分厂
印 刷 扬州鑫华印刷有限公司

开 本 890mm×1240mm 1/32
印 张 3.25
版 次 2003 年 4 月第 1 版
印 次 2003 年 4 月第 1 次印刷
印 数 1—5 000 册

标准书号 ISBN 7—5345—3853—X / S · 619
定 价 22.00 元

图书如有印装质量问题, 可随时向我社出版科调换。



目 录

● 灰文鸟	1	● 深红玫瑰鹦鹉	31
● 金山珍珠	3	● 鲜红胸鹦鹉	32
● 十姐妹	4	● 超级鹦鹉	32
● 七彩文鸟	6	● 红腰鹦鹉	33
● 黑喉草雀	9	● 红额鹦鹉	34
● 梅花雀	10	● 横斑鹦哥	35
● 环喉雀	12	● 红额绿鹦鹉	35
● 大锦花雀	13	● 红腹鹦哥	36
● 横纹雀	15	● 金丝翅鹦哥	37
● 虎皮鹦鹉	16	● 掘穴鹦哥	38
● 绯胸鹦鹉	18	● 金丝雀	38
● 牡丹鹦鹉	20	● 金翅雀	45
● 小五彩鹦鹉	23	● 北朱雀	46
● 鸡尾鹦鹉	25	● 黄雀	47
● 黄化鸡尾鹦鹉	26	● 黄胸鹀	48
● 花头鹦鹉	27	● 黑头蜡嘴雀	49
● 和尚鹦鹉	28	● 百灵鸟	51
● 公主鹦鹉	29	● 沙百灵	54
● 青绿鹦鹉	29	● 凤头百灵	55
● 金披凤玫瑰鹦鹉	30	● 云雀	56



- | | | | |
|---------------|----|--------------------|----|
| ● 画眉鸟 | 57 | ● 八哥 | 76 |
| ● 文须雀 | 61 | ● 丝光棕鸟 | 80 |
| ● 黑喉噪鹛 | 61 | ● 灰棕鸟 | 81 |
| ● 红嘴相思鸟 | 62 | ● 暗绿绣眼鸟 | 82 |
| ● 银耳相思鸟 | 63 | ● 黑枕黄鹂 | 83 |
| ● 红点颏 | 64 | ● 红耳鹎 | 84 |
| ● 蓝点颏 | 66 | ● 白头鹎 | 85 |
| ● 鹈鹕 | 66 | ● 灰喜鹊 | 86 |
| ● 白喉矶鹬 | 67 | ● 红嘴蓝鹊 | 87 |
| ● 红尾伯劳 | 68 | ● 戴胜 | 88 |
| ● 大山雀 | 69 | ● 薄雪鸠 | 89 |
| ● 沼泽山雀 | 70 | ● 苍鹰 | 90 |
| ● 棕头鸦雀 | 71 | ● 雀鹰 | 91 |
| ● 太平鸟 | 72 | ● 鸬鹚 | 92 |
| ● 鹩哥 | 73 | ● 附:鸟笼的种类与制作 | 94 |

灰文鸟



品种特点

灰文鸟属雀形目文鸟科。原产于马来半岛、苏门答腊、爪哇等地。

灰文鸟体长 14 厘米左右，与麻雀等同大小，红嘴大而呈圆锥状，红眼圈，红眼，上体灰色，头和尾黑色。



养 护

灰文鸟喜吃带壳的种子，如谷子、麻子等，一般可用稻谷、稗子、黍子按 6:3:1 的比例混合

喂给。除以上主要饲料外，还要经常加喂青绿饲料，如油菜、白菜、马齿苋等。蛎壳粉和墨鱼骨也是不可缺少的补充饲料。主要饲料要随季节而变更，如繁殖期增加鸡蛋米，冬季补充苏子或麻子。笼底的沙土每周更换 2 次。



灰文鸟(一)

夏季要注意室内通风，防止阳光直晒。冬季要保持室温在 20℃ 左右，低于 15℃ 则影响鸟的孵化

灰文鸟(二)



白文鸟



和育雏。灰文鸟喜水浴，洗浴时间，夏天可在上午9点和下午4点各1次，冬季可1日1次。

灰文鸟在每年的10月到翌年的6月可连续繁殖3~5窝，所以在8月、9月份要给鸟增喂发情饲料——鸡蛋米，并在人工巢内添加棉花、棕丝、碎干草等材



灰文鸟(三)

料。灰文鸟的孵化期一般为16~18天，由雌、雄鸟轮流担任。在孵化过程中，要尽量保持环境安静，不去惊扰，不去窥视，更不能随意移动鸟笼。还要注意观察亲鸟有无啄蛋现象，如果有此现象，则应立即在饲料



灰文鸟(四)

中加喂蛋壳（将鸡蛋壳烘干、压碎）或骨粉（将猪骨、牛骨或羊骨烘干、压碎，使其成粉状），补充钙质，就可解决问题。

金山珍珠



品种特点

金山珍珠又叫锦花鸟、锦华鸟、小珍珠、珍珠鸟,属雀形目文鸟科。原产于澳大利亚东部,现已培育成人们非常喜爱饲养的家鸟。

金山珍珠体长约 10 厘米,头部灰色,嘴基及眼下方有黑纹,两条黑纹中间呈白色,颊后有红褐色块斑。喉至上胸白色而有波状黑纹,胸中部呈黑色带。这种鸟上体暗褐色,腹部黄白色,腹侧红褐色并有珍珠般的白色斑点。嘴红色,脚淡红色。尾黑色,尾上覆羽白色且具黑色横纹。雌鸟颊后无红褐色块斑,胸部无波状纹。



养 护

金山珍珠的饲料以小米、谷子、黍子、稗子为主。家庭饲养,日



金山珍珠(一)

常可用小米 6 份、稗子 4 份混合喂给,发情期喂鸡蛋米,砂粒、牡蛎粉常备,青绿饲料酌情喂给。

日常管理比较简单,除保证食、水充足和用具卫生外,每周清扫 1 次笼底的沙土和粪便。在北方的冬季,室温最好在 10~15℃。

金山珍珠一年四季都可繁殖,但夏季最好停止繁殖,以利于换羽和恢复体力。在北方,一到秋季天气凉爽时,应清刷繁殖笼和巢箱,安置新栖杠,提供巢材,饲料中补充鸡蛋米,做好繁殖准备。

雌鸟产蛋后,由雌、雄鸟共同孵化,孵化期 14 天左右。这期间应勤观察,若发现亲鸟不孵蛋或不育雏,应立即让其他鸟代为孵育,同时淘汰种鸟。孵化和育雏期间,要保持环境安静,光线不要太强,室温在 15℃ 以上。在饲料方面,应增加鸡蛋米中鸡蛋的比例。



金山珍珠(二)

十姐妹



品种特点

十姐妹又名白腰文鸟、鱼鳞雀,属雀形目梅花雀科。原种遍布我国南方各省区。

十姐妹体长约 11 厘米,原种上体及喉胸等处都是栗褐色,有淡色羽干纹,腰部羽毛白色,腹部灰白色,尾羽黑色。

十姐妹性情温顺,耐粗饲,繁殖率高,母性强,抱窝育雏好,因而常被养鸟者作为繁殖七彩文

鸟、黑喉草雀、大锦华等较为珍贵鸟的代孵育雏保姆鸟。

十姐妹体格强壮,喜欢结群,常常 10 多只在一起栖息。如大笼



十姐妹(一)

饲养,夜间会出现三四只如叠罗汉样地在栖杠上栖息,非常有趣。它天性聪明,常被驯成手玩鸟。

十姐妹(二)



十姐妹从外形和羽毛上很难区分雌雄。通常雌鸟的体形大于雄鸟，且胸部耻骨较短，裆宽腹软，如用手摸其泄殖腔，感觉较平缓。雄鸟胸部耻骨略长，裆腹较窄，泄殖腔呈突起状。现养鸟者多以其鸣叫声区分雌雄，雌鸟叫声单调，不会啁鸣，雄鸟善鸣唱，叫声清亮，并可连续发出不同的音阶。雄性求偶炫耀时，会全身羽毛蓬松呈球状，尾部连续扇动，不断跳动并连续鸣叫。



养 护

十姐妹很容易饲养，平时可喂谷子、小米、碎玉米渣、稻米渣，发情饲料为鸡蛋米。其环境适应性



十姐妹(三)

十姐妹爱清洁，喜水浴，应经常提供清洁的浴水。

十姐妹的雏鸟 21 天长成全羽，开始离巢学着吃食。这期间要供给充足的鸡蛋米，并添加骨粉或牡蛎粉，适当补充一些维生素和微量元素，并每天喂些青菜。一般幼鸟 35 天左右即可与亲鸟分窝，分离后雏鸟仍需喂一定量的鸡蛋米，逐渐换成以谷物为主。在换羽期要适当多

喂一些鸡蛋米和青菜，并注意喂蛋壳以补钙，促其生长发育，使其顺利换羽。



强，冬季在 5℃ 的低温环境中可正常生活。

十姐妹(四)



十姐妹(五)

十姐妹3月龄就开始换羽,随着换羽的结束,一般4个月便性成熟,可选种配对进行繁殖。其繁殖率高,除换羽期外,可终年繁殖,一年可繁殖五六窝。

十姐妹的繁殖笼大小为30厘米×30厘米×30厘米,内设栖杠2根,栖杠的直径以鸟爪能抓住2/3、留有1/3余量,即“抓二露一”为宜。还要设草巢或巢箱1个。一般来说,十姐妹每窝产蛋4~6枚,产第2枚蛋后就开始孵化。在孵化第5天时要验蛋,剔除无精蛋。为了提高孵化率,可把2窝蛋合在一起孵化,每窝可孵化育雏6只以上,甚至可4个不同品种的鸟蛋一起孵化。孵化期间应停喂鸡蛋米。这一期间,清扫卫生最好在晚上进行,以免影响亲鸟喂雏。

由于十姐妹孵化育雏能力强,多作为代孵育雏其他鸟的保姆鸟。养鸟者最好到种鸟场和一

些信誉好的专业户那儿去购买保姆鸟。用于代孵七彩文鸟的十姐妹最好先令其繁育一窝十姐妹,如育雏效果好再让其当保姆鸟。如果购进的十姐妹种源好,也可直接用作保姆鸟。

代孵换蛋时最好把四五枚蛋同时换上入孵,以便同时出壳,否则最先孵出的鸟可能独占食物,使后孵出的鸟挨饿。

七彩文鸟




品种特点

七彩文鸟别名五彩文鸟、胡锦鸟、五彩芙蓉,属文鸟科。野生的七彩文鸟分布在澳大利亚北部及附近的岛屿上,是生活在热带森林和开阔草原上的美丽的小型鸟类,它们常常依溪流或小塘而栖,在阳光下鸣唱和飞舞。



七彩文鸟(一)

七彩文鸟(二)



七彩文鸟在草原或森林的树洞内营巢,巢以羽毛、软草及纤维等筑成。其食物较杂,包括植物种子、嫩芽、果类及虫类。人工繁育的红头七彩文鸟与澳大利亚野生七彩文鸟相似,体长约 11 厘米,全身羽毛有红、玫瑰红、绿、蓝、黄、黑、紫等颜色,上体绿色,下体黄色,头、脸颊部为蓝色,并一直延伸至颈下形成环状,后颈及背部为绿色,胸部为葡萄紫色(雌性

略浅),腹部为金黄色(雌性为淡黄色),跗、趾为肉粉色。

七彩文鸟平均寿命可达 7 年。它喜干不喜湿,喜高温,在环境温度达 35℃ 时仍能保持安静,甚至不影响产蛋。

七彩文鸟可以用以下方法来鉴别雌雄:在雏鸟的针羽和片羽期,从鸟的胸腹部拔掉几根羽毛,促使其在幼鸟时在拔毛处直接长出艳羽,羽色艳的为雄性,羽色浅的为雌性。



七彩文鸟(三)



养 护

经过秋冬至春的七彩文鸟种鸟,应该注意保持营养均衡,鸡蛋

米可以在原来加蛋黄的基础上增加一个鸡蛋黄，并注意补充多种维生素和钙、磷等矿物质，供足墨鱼骨和鸡蛋皮，每天必须适当喂青菜和野菜。春季昼夜温差大，对尚不能归巢的幼鸟危害较大，养鸟者此时应每天检查，将不能归巢的幼鸟放回巢箱，由亲鸟用体温来保证其安全度夜。春季是鸟易发病的季节，因此应加强鸟舍的消毒防病工作。

盛夏天气炎热，饲养管理的重点是防暑降温。夏季气温较高，湿度较大，是螨虫等寄生虫繁殖最快的时期，要及时发现并及时打药消灭，保证鸟能安全度夏。



七彩文鸟(四)

秋季可适当增加鸡蛋米的比例，一般鸡蛋米占日粮的 30% 左

七彩文鸟(五)



右。另外,要增加油脂性饲料。七彩文鸟不喜欢吃苏子,因此应增喂花生米,将花生米切碎拌入谷物或鸡蛋米之中,任其采食。花生米含大量的植物蛋白和维生素,是促使鸟长膘的理想饲料。



七彩文鸟(六)

鸟笼应当放在阳光充足的地方,挂好巢箱,垫好絮物。遇到阴天应用白炽灯补充光照,以刺激和促进鸟性腺的发育,使之尽快产蛋。

冬季寒冷,时有大风和降雪,鸟舍要注意保温,使其温度达到 $15\sim 20^{\circ}\text{C}$ 。此时对鸟的防病工作也要重视。冬季七彩文鸟容易发生呼吸道感染病,其主要原因是鸟舍内换气不良,灰尘增加,鸟吸入尘埃,刺激呼吸道黏膜。因此冬季只注意保温是不够的,还要注意通风换气。

黑喉草雀



品种特点

黑喉草雀又名巴森雀、牧师鸟,属雀形目文鸟科。分布在澳大利亚东部和东北部。

黑喉草雀体长 $11\sim 12$ 厘米,眼与嘴间有一黑带,头部银灰色,腮、喉、上胸一带有领带状黑斑。上体灰褐色,腰白尾黑,胸腹为灰褐色,腰至下腹呈一黑带。嘴黑色,脚红褐色。雌雄同色,雌鸟体形较小。

黑喉草雀栖息在森林或疏林地带,有时也在草原旁的水流周围活动。



养 护

黑喉草雀的饲料为稗子、谷子,外加鸡蛋米、各种叶菜(油菜、白菜等)、墨鱼骨。

其观赏笼可用金丝雀、黄雀笼。繁育笼的大小为 50 厘米 $\times 40$ 厘米 $\times 40$ 厘米,前面为笼栅,其余四面为木板。笼内放置水罐、食罐各



黑喉草雀(一)

黑喉草雀(二)



1个,栖杠2根,水浴盆1个。人工巢宜为壶状草巢。

黑喉草雀每窝产蛋4~8枚,孵化期为15天,可用十姐妹或金山珍珠代为孵育。孵化育雏期间,室内温度以20℃为宜。

梅花雀



品种特点

梅花雀又叫珍珠鸟、红珍珠、红梅花雀、红雀,属雀形目文鸟科。我国云南、海南以及印度、斯

里兰卡和南洋一带都有分布。

梅花雀体长约10厘米。雌雄羽色明显不同:雄鸟除翼羽、尾羽稍带暗褐色外,全身均为深红色,只是翼、腹的两侧有明显的白点;雌鸟从头到双翼为暗褐色,尾羽黑褐色,覆羽暗赤色,胸、腹部褐黄色而无白斑,翼上仅有双列白点。

梅花雀喜群居,生活在潮湿的



梅花雀(一)



梅花雀(二)

芦苇丛、草丛中及林区，主要食谷物种子和一些植物种子。繁殖期从8月到翌年2月，大多数在9~10月产蛋。通常用细草营巢，巢内铺柔软植物纤维。

梅花雀(三)



养 护

梅花雀的饲料是由小米（谷子）6份、稗子3份、黍子1份组成的混合饲料，骨粉和砂粒要经常保持供给，还要喂一些叶菜和水果，繁殖期补充鸡蛋米。

梅花雀体形小，因而笼条间距要小，不能超过1.2厘米。观赏笼宜为精制的小型竹笼，也可用山雀

梅花雀(四)



笼或绣眼鸟笼。繁殖需用箱形笼，尺寸以 40 厘米×30 厘米×40 厘米为宜，笼内放入小型壶状草巢，供鸟休息和繁殖。壶状草巢可用草绳缠、铅丝固定而成，口的直径在 5 厘米左右，全长 15 厘米。编巢的草要洗净、消毒、晒干后再用。

梅花雀原产于热带地区，对寒冷的气候适应性较差，故冬季繁殖时室温要保持在 20℃ 以上。梅花雀只产蛋，不孵化，不育雏，因此常用金山珍珠或十姐妹代为孵育。

梅花雀(五)



环喉雀



品种特点

环喉雀又叫红带雀、红头雀、鳞雀，属雀形目文鸟科。原产于非洲的西南部。

环喉雀体长约 12 厘米。全身以灰黄褐色为主，头部有细黑横斑，背部灰褐色，有黑横斑。翼有淡黑色横斑，尾灰黑色，尖端发白。胸有白斑，腹面淡黄褐色，腹中央红褐色。雄鸟从颊至颈间有一条红色带，雌鸟无红色带，所以雌雄鸟很容易区别。



养 护

环喉雀的主要饲料有稗子、黍子、谷子、小米等。这种鸟还喜欢吃水果和叶菜，很少吃昆虫。

环喉雀一般用金属丝笼饲养。观赏笼为 40 厘米×30 厘米×30 厘米的长方形笼，繁殖笼为 60 厘米×70 厘米×80 厘米的笼。

环喉雀在人工饲养下可以繁殖，人工巢为巢箱或草编壶状巢。每窝产蛋 3~5 枚，雌雄鸟共同抱窝，抱窝期为 12~13 天，育雏期为 24~25 天。也可用十姐妹代为孵育，这期间要加强十姐妹的营养，