

張豐榮／編著

家庭 園藝 栽培




平洲
PDC



家庭 園藝的 栽培

張豐榮／編著



目錄



椰子	蓮葉蕉	彩葉草	變葉木	文竹	朱蕉	鱗角蕨	非洲堇	斑葉鳳梨	山蘇花	虎斑單葉花	喜蔭花	蔓綠絨	蘆薈	秋海棠	豬籠草	彩葉芋	天堂鳥花	黛粉葉	黃金葛	吊蘭	鵝掌藤	火鶴花	馬拉巴栗	聖誕紅
50	49	48	46	44	42	40	39	36	34	32	30	28	26	24	22	20	19	16	14	12	10	8	6	4



瓶瓶罐罐的彩色花園	玻璃花房	礫耕栽培	裝飾壁面的綠意花籃	裝飾壁面的花籃	富貴菊	橡膠樹	竹芋	鐵線蕨	吊竹草	龍血樹	冷水花	虎尾蘭	紫錦草	椒草	金魚花	密葉竹蕉	黃紋合果芋	腎蕨	網紋草	酒瓶蘭	豹紋竹芋	常春藤	粗肋草
94	92	90	89	88	87	84	82	80	79	76	74	73	70	68	66	64	62	60	58	57	56	54	52



↑ 聖誕紅一種 (Natary) ↓ Ecke's Elaming Sphere



↑ White Magic ↓ 斑葉聖誕紅



聖誕紅

〔大戟科〕

聖誕紅又名猩猩木，原產於墨西哥，鮮明的紅色花苞是聖誕節不可缺乏的花卉。花朵很小，在莖頂呈總苞狀開放。

● 放置場所 白天放在窗邊曬太陽，夜間儘量放在暗處，並應避免放在冷氣房。

● 澆水 待盆土乾燥後，再充分澆水。寒流來襲致使溫度低於10度C時，應保持乾燥，才能增加耐寒力。

● 施肥 4、5、9月之間，每週施用1次液肥。5月、6月和7月共計3次，用豆餅、骨粉拌成的固體肥料或化成肥料置於盆鉢中。

● 選購要領 宜選擇莖幹粗壯、莖葉大小整齊、顏色平均者為最佳。莖葉中央最好已開出2、3朵小花。

另外，應避免購置放在日照不佳或寒風侵襲的地點所出售的植株。

● 修剪 春天時開始抽長新芽，另用大一號的盆鉢種植。

● 繁殖 7月左右採用扦插法繁殖。

首先切莖頂約10公分之處，用水洗淨切口流出的白色汁液，再插入蛭石、珍珠岩混合成的土中，經常噴霧水以提高空中濕度，3週即會發根。



↑ Gutbier V-10 Amy Pink

↗ Gutbier V-10 White

聖誕紅





馬拉巴栗屬於員綠植物



粗大的樹幹別具情趣



剛盛開的馬拉巴栗



馬拉巴栗盆栽是家庭園藝新寵兒。

馬拉巴栗

木棉科

● 放置場所 光線不足時容易徒長，很難長得結實壯碩，所以春、秋之際應放在戶外充分接受直射光線，才能長得十分強壯。

● 澆水 馬拉巴栗喜好水分，但仍應避免過度潮濕。春秋兩季應等盆土表面乾燥後再澆水，夏天則天天澆水，冬天則等盆土乾燥後再澆水。

此外，尚應勤於噴葉水，來保持空中濕度。

● 施肥 在5、9月的生長旺盛期，每2個月施用1次緩效性的化成肥料或油粕。

● 病蟲害 5、9月會發生葉蟬為害，如果葉背出現斑點狀，就表示已受葉蟬侵害，此時須噴佈開生藥劑來防治。

● 換盆 當植株生長過度茂密，致使植株與盆鉢顯得失調時，就必須另行換盆。

● 換盆時期 5、9月進行換盆。

● 種植材料 應選用排水性良好的土壤來種植。栽培用土的混合比例是紅土粒3、腐葉土3、河沙1。

● 繁殖 若能找到種子，可用播種法來繁殖，不過，一般都是在5、9月以扦插法繁殖。

● 其他 馬拉巴栗俗稱「美國土豆」，是目前很受歡迎的綠色植物。

下葉脫落成光禿狀

馬拉巴栗的生命力，在觀葉植物中是數一數二的。當植物取得平衡生長而變大時，只要能確保放置的場所，那變大本身就沒有問題。可是，若經常掉葉子，會損害其觀賞價值。

老化的植物很自然地會掉葉子，而水分不足也是落葉的原因。可自適當的部分切除，維持十五度以上的生長溫度，約一個月可抽出新芽。

切除的位置分為葉根、葉落處或枝樑的基部等；由於這些地方有隱芽，故需在芽上二、三公分抽出新芽。

分處切除。新生的芽數，因切除枝樑的生長力而有不同；一般若切在枝樑中間，可有一、二個新芽，切在枝樑基部，則有二、三個新芽。

等新芽長至某一程度，便移至戶外，接受充足的日照，約經一、二個月，即可恢復極具觀賞價值的英姿。

此外，可在四、七月，將切除的部分作扦插。把切成適當長度的枝樑，插入裝水的容器中，即可長根；然後再植入排水良好的用土中。

下葉掉落光禿植株的再生法



①下葉掉落的植株，缺乏觀賞價值



②自有隱芽的枝樑基部2、3公分上切除。

④放在水瓶中長根後，再插入用土中。



〔栽培急診室〕

葉片紛紛掉落

葉片掉落的主要原因有①葉子老化，②缺水，③根部堵塞等。其中①是自然的生理現象，無可避免；但是②是平常管理時，最易被忽略的一點。一般放在室內的盆栽，常有水分不足的現象，因盆土表面潮濕的澆水量，不

能讓水分滲入盆中的根部。

所以，等盆土泛白乾燥後，再澆大量的水，直到水自盆底流出。若澆水時水不會滲出來，表示根部堵塞，可在五、七月，取排水良好的用土進行換盆。

枝樑中途彎曲

購買只有單枝的盆栽栽培後，或經過切除的枝樑，常會出現枝樑從中彎曲的現象。這種姿態不太美觀，也不具觀賞價值。就算數度切除，減少枝樑也無法再

恢復曼妙的姿態。但若還可殘留下枝樑的基部時，可加以切除，讓它抽出新芽恢復生命力。（切除方法與葉尖掉落時相同）

枝幹彎曲植株的再生法



②自彎曲的枝樑基部之隱芽上面切除。

③插入土中，約1、2個月即抽出新芽。



①枝幹從中彎曲的植株。





↓花燭 (Album)



↑花燭 (Compacta Cristal)

←花燭



火鶴花

天南星科

- 放置場所 放在不受直射日光照射之處，秋、春應隔著紗簾接受陽光，夏天放在半日陰之處。
- 澆水 避免盆土過度乾燥。5、9月的生長期間應勤於澆水，以免盆土過度乾燥。此外，本植物喜好多濕，夏天應勤於噴灑霧水，其他季節也應勤於噴葉水。
- 施肥 5、9月之間，每個月施用2、3次緩效性的化成肥料或油粕。
- 病蟲害 夏天可能會發生葉蟬，可用水清洗葉片，再噴佈殺蟬劑。4、10月發生介殼蟲，一發現介殼蟲可以噴佈加福松。
- 換盆時期 5、8月進行換盆。當植株長滿整個盆鉢，葉色欠佳而且又不開花的話，表示必須換盆了。
- 種植材料 可單用水苔種植，亦可使用




↑ 火鶴花

← 火鶴花

↓ 花燭 (魔鬼)

↓ 花燭一種



泥炭苔 4、珍珠岩 2、蛭石 1 的比例混合使用。

● 換盆方法 拔出植株，解開糾結的根部，用利刀切除子株，種植在大小適中的盆鉢中。

● 換盆後的管理 置於不受風吹的半日陰之處，等盆土泛白變乾後再澆水，千萬不可過度潮濕。

此外，並應勤於噴霧水。

● 繁殖 5、8 月採分株、壓條、播種等繁殖方法。



↑ 鵝掌藤 (Renata) ↓ 香港→香港



鵝掌藤

五加科

● 放置場所 春→秋應儘量放在戶外，充分接受直射日光，才能長成結實壯碩的植株。

本植物的耐寒性強，可以放在室內，隔著玻璃窗接受日照。

● 澆水 本植物喜好水分，也耐缺水。但是，水分過多時容易發生徒長，所以，春秋兩季應等盆土表面泛白變乾後再澆水，夏天時則應天天澆水。

冬天應減少澆水量來增強耐寒性，最好是盆土完全乾燥後再澆水。

● 病蟲害 5→9月之間，葉、莖會發生介殼蟲，可用牙刷加以刷除，或噴佈加福松來防治。

● 換盆 下葉掉落，或是自盆鉢上下長出許多根，澆水時，水分總是停滯不洩，這就表示植株必須換盆了。

● 換盆時期 4→9月進行。

● 種植材料 選用排水良好的土壤，混合比例為紅土粒3、腐葉土1、河沙1。

● 換盆後的管理 應置於半日陰，等盆土表面乾燥後再澆水，經過1個月長出新芽後，可以放回原來的地點。

● 繁殖 5→9月採扞插法繁殖。

● 其他 不宜長期放在陰暗處，以免發生徒長。

下葉脫落莖部光亮

老化的下葉掉落，乃十分自然的生理現象。鵝掌藤雖是常綠樹，但每片葉子一、二年即會掉落，而長出新葉。

但是，未老化的綠葉卻脫落，表示水分不足。一旦下葉脫落，莖部呈光禿貌，影響觀賞價值時，只有切除使其再生，長出新芽。若枝幹數量多，可作高低調

配以切除，以培育出富於變化的植株。

切除的部分可用於插穗；將長著三、四片葉子的頂芽部分，以及四、五節的莖部，插於排水良好的土壤中。

若將母株放在半日陰處，待盆土表面乾了再澆水的話，約過一個月即可抽出新芽。

下葉掉落植株光禿的再生法

③ 切除的部分可當作插穗。



① 因缺水而使下葉脫落，光禿的植株。



④ 切除的部分扦插的情形。



② 依高低變化，切除莖部。

莖部彎曲

鵝掌藤的莖部不具有直立生長的特性，若不用支架加以固定

，就會長得歪斜彎曲。所以，若一直保持購同時的

〔栽培急診室〕

莖部彎曲植株的再生法

樣子，比支架高出的莖會彎曲，因此要配合莖部的生長情況，添上支架。

萬一彎曲情形嚴重，即使加上支架，彎度還是很大時，唯有

壓條或去皮使它再生。

此外，若因某原因導致莖部從中折斷，剩下的枝幹之彎度會令人覺得更明顯。此時要不斷剪枝，以塑造直立的姿態。

① 因沒架上支柱而使莖部彎曲的植株。



② 用速黏膠帶黏在支柱上，加以矯正。



③ 注意莖部以後生長的方向，增加支柱的長度。

葉子變黃紛紛脫落

鵝掌藤具有耐陰性，是十分受歡迎的室內盆栽，但若突然由日照良好的地點，移入沒有日照的室內，老葉會陸續變黃掉落。

此外，根部堵塞也會造成下

葉掉落。因其生長旺盛，二年要換盆一次，約在四、七月或九月進行。

若下葉嚴重掉落，在換盆的同時要切除枝梗，以便其再生。

↓吊蘭 (Vittatum)



↑吊蘭 (Picturatum)

吊蘭

百合科

● **放置場所** 吊蘭具耐陰性，但是，春秋之間最好放在戶外充分接受日照，才能培育出強壯的植株。

冬天時，隔著玻璃接受日照是最理想的放置場所。

● **澆水** 吊蘭擁有多肉根，而且又耐乾燥。春秋兩季應等盆土表面乾燥後再澆水。

冬天則等盆土完全乾燥後再澆水。但是，冬天期間仍置於戶外的話，澆水方面就須更加小心。

● **施肥** 在5～9月的生長旺盛期，宜每個月施用1次緩效性化成肥料或油粕，更能促進生長。

● **病蟲害** 很容易發生介殼蟲，必須特別注意防治。

● **換盆時期** 4～9月是換盆的理想時期。當植株長滿整個盆鉢，葉片相繼變黃時，表示根部已發生糾結，必須在適當時期進行分株換盆。

● **種植材料** 選用排水良好的土壤，混合比例是紅土粒3、腐葉土1、珍珠岩1。

● **繁殖** 5～9月之間，以子株進行扦插繁殖。

● **其他** 吊蘭的耐寒性極強，是最受人們喜愛的觀葉植物之一。但是若光線不足就容易發生徒長，故應放在日照充足處。

子株太多影響外觀

吊蘭是十分強壯的植物，幾乎沒有任何病蟲害，只要仲夏也放在避免直射日光的亮處，即可順利生長，冒出許多子株。

而且它也相當耐乾燥，即使二、三天忘記澆水，也不會枯萎。當枝梗末端長出子株後，會使母株長不大，進而影響其觀賞的價值。

所以，要經常篩選較大的子

株，進行疏苗。可選擇葉色濃、葉子短、結實的子株二、三株，直接種入已放入用土的五號盆中。用土的材料，可在同量的腐粒和川砂中，混入二成左右的腐葉土。

種完後放在亮處，約二、三個月，即可成為頗具觀賞價值的盆栽。

子株太多時的再生法



②在茂密的子株部分進行疏苗的工作。



①匍匐枝太多，太茂密的植株。



④把3棵子株種入5號鉢成為新盆栽。



③選擇葉子挺拔的子株（左）重新栽種。

葉片變黑枯萎發育不良

強烈的日照引起葉片曬傷，會造成上述的病徵。在出梅或突

然將植株由室內移至戶外時，特別容易引起葉片曬傷。

〔栽培急診室〕

葉片變黑植株



①因西曬等因素，使葉片變黑的植株。



②切除變黑、枯萎的部分

在包括陽台的戶外栽種觀葉植物時，需要遮掩西曬。對吊蘭之類有斑點的植物來說，西曬過強會妨礙健全的生長；而且陽台

特別乾燥，更要注意補充水分。萬一出現上述病症時，只好切除枯葉，多澆水放在可避開西曬的地點，才能重新展現生機。

完全抽不出匍匐莖

如果吊蘭順利成長，就會抽出匍匐莖，在前端長出子株；萬一不長匍匐莖，可能是植株發育不良，或種了不易抽出或不會長匍匐莖的品種。和吊蘭相較之下，葉片薄的泰國吊蘭，雖是外形相似，但完全抽不出匍匐莖。此

外，寬葉吊蘭除非有七、八棵以上的植株，否則也抽不出匍匐莖。因此，選購前先確定吊蘭的品種，才能欣賞到匍匐莖的美姿。





↑萊姆→黃金葛



黃金葛

天南星科

●放置場所 光線不足時，葉片上的斑紋會變得不太鮮明。春秋兩季可放在陽台或室內的窗邊，充分接受日照。

夏天則應放在半日陰之處。

●澆水 春秋兩季宜等盆土乾燥再澆水，夏天是天天澆水，冬天則等盆土乾燥後，選在晴朗的上午澆水。

●施肥 在5～9月的生長旺盛期，每個月施用1次緩效性化成肥料或油粕。

●病蟲害 採用蛇木種植時，應連同蛇木柱一起澆水。

葉背若出現葉蟬的話，應噴佈克氯苯來防治。

●換盆 發生下葉掉落、葉色不良、節間太長等現象時，應另行換盆種植，才能改善上述狀況。

●換盆時期 5～8月。

●種植材料 宜用排水性良好的土壤，栽培用土的混合比例為紅土粒3、腐葉土1、河沙1。採吊盆栽培時，混合比例為泥炭苔3、珍珠岩1、蛭石1。

●繁殖 5～8月採用扦插法繁殖。

首切切取莖的前端做為插穗，插植於水苔鋪成的苗床，或是在基部包紮水苔。

●其他 黃金葛也可以採用吊盆或吊籃來種植，讓莖蔓向下垂。

吊盆的下葉枯萎

黃金葛的過冬溫度至少要八度以上，否則容易使下葉枯萎；此外，缺水也會出現這種症狀。

因枯萎的部分無法再生，只能把沒有葉子的部分切除，當作插穗，以形成新的植株。選擇整片葉子出現斑點的枝段，即可種出有斑點的品種。

取二、四節的莖部當作插穗，由底部切除下面的葉子，插入排水良好的用土中，置於半日陰處，等盆土乾了再澆水，約一個月即可長根。扦插的適當時期在四、九月。

把插穗放入水瓶中也很容易長根。此時的插穗要有五、六節，並常換水以防水分腐敗，約二、三週即長根。然後再移植於排水良好的用土中。

黃斑變少

黃金葛受充足日照後，葉綠素會增加；若光線不足，葉上的黃斑變的不明顯。不過，水分不足，也會使葉片變黃。

所以，春至秋天要放在戶外

下葉枯萎吊鉢植株的再生法



③ 去除下面的葉子，插入新土中。



② 剪下2~4節有葉子的莖部，當作插穗。

① 下葉枯萎的吊鉢植株。



植株再生法

〔栽培急診室〕

① 下葉掉落，底部稀疏的黃金葛。



② 切除有葉子的藤蔓當作插穗。



③ 把插穗插在稀疏的底部。



老葉變黃、掉落，乃自然的生理現象。但下葉泛黑、腐爛而枯萎，乃是因太濕形成腐根而造成的結果，需用排水良好的用土換盆栽種。

當發現種在蛇木上的植株，下葉掉落情形嚴重時，可把往上伸展的藤蔓，拉到沒有葉子的部分，或在底部作扦插，以補充生命力。

用蛇木種植下葉掉落

葉，不及早摘除的話，斑葉的數量會越來越少。

仔細觀察藤蔓的部分，會發現在長出斑葉的藤蔓上，出現與斑紋相同的直紋；而綠葉的藤蔓無此現象，所以應將綠藤自根部

完全切除。

綠葉增多的植株



① 儘早切除長綠葉的藤蔓。

② 把較長的藤蔓拉向稀疏的底部，固定於盆土中。

③ 自底部去除綠葉，保留斑葉。



↑白黛粉葉（魯道夫·羅爾斯）↓白黛粉葉→變紋黛粉葉



黛粉葉

天南星科

● 放置場所 黛粉葉厭惡強烈光線，春秋應放在半日陰之處。冬天則放在室內隔著玻璃窗接受日照。

本植物的葉子柔軟，喜好空中濕氣，所以絕對不可放在開放暖氣的室內。

● 澆水 盆內不宜過度潮濕。春秋兩季應等盆土乾燥後澆水，夏天時則等盆土表面乾了再澆水；冬天則等完全全乾燥之後再澆水。

黛粉葉喜好濕氣，一年四季皆應勤於噴霧水。

● 施肥 5～9月應每2個月施用1次緩效性化成肥料或油粕。

● 病蟲害 5～9月會發生葉蟬，一經發現，可噴灑強力的霧水將其噴除，另外亦可噴佈開生藥劑。

● 換盆 葉尖變黃枯萎時，表示根部糾結，必須換盆。

換盆的適當時期為5～8月。

● 種植材料 栽培用土的混合比例為紅土粒3、腐葉土1、河沙1。

● 換盆後的管理 放在不受風吹的半日陰之處，等盆土乾燥後再澆水。經1個月長出新芽後，再放回原來的地方。

● 繁殖 5～8月以扦插繁殖；大型種可採用壓條；叢生種可採用分株。