

青
堂
醫
論

灵
兰
要
覽



中國
醫藥
叢書
第二輯

序 言

中国医药学是一个伟大的宝库，在数千年历史发展过程中，积累了丰富的医疗实践经验，形成了自己独特的理论体系。

认真学习中医原著，是继承和发扬中医学的传统方法，也是较好地掌握中医理论的基本途径。建国三十多年来，出版过数百种中医原著的影印本、点校本，满足了广大中医工作者的需求，促进了中医学的普及和提高。但是，这些中医原著的影印本或偏重于善本、孤本、秘本，或部头较大，印数不多，一些排印本也大多出版较早，久已脱销。有鉴于此，我们编选了这部《中医基础丛书》，以满足当前三十多万中医工作者和中医函授、科授学员自修进修之需要，该丛书由北京市中国书店影印出版，全国新华书店发行。

中国医学发展到明清时期，较唐宋以前有了明显的提高，特别是在注疏阐释古典医著，丰富临床实践经验、重视医学普及等方面，都大大超过前代，因此，本丛书选题以明清医家撰著为主，其收录原则为通俗易懂、切合实用、理论与临床并重，注意发挥小科优势等。收录的范围是：（一）在中医学史上有较高价值，建国以来从未出版者；（二）在中医发展史上起过较大普及作用，建国以来未曾出版或虽出版而供不应求者；（三）富有中医特色，属于当前

中医短线而已面临失传之著述。本丛书暂定100种，分五辑影印出版。为保持原貌，本丛书均择较好的版本影印，不予删节。各书中有些现代科学尚不能解释的内容，或因受历史条件限制而夹杂的一些不当内容，尚希读者以辨证唯物主义的观点正确对待，取其精华，去其糟粕，用科学方法进行整理和提高，以推动中医学的进一步发展和繁荣。

医学的发展进步同其他任何科学学术水平的提高一样，都遵循着一个共同的规律，即是既要重视提高，又要重视普及，在普及的基础上提高，既要强调发扬，又要强调继承，有继承才能更好地发扬。我们编选这一部丛书，就是在这一思想指导下，力求使系统阅读者获得双重效果。我们希望《中医基础丛书》的出版，能为当前中医学的普及和提高，发挥一定的作用。

编者

一九八五年十月

肯
堂
医
论

肯堂醫論目錄

卷上

痘疹發微

驚風

卷中

論望色

論扎脈

論人參

論犀角

雜記

卷下

肯堂醫論 目錄

三癰治驗

神水治驗

製神水秘法

婦科驗方

肯堂醫論目錄終

肯堂醫論卷上

明史氏金壇字泰王肯堂著

雒舉晚瀾顧金齋評點

明後學方叔嚴仲春校訂正

紹興吉生裘慶元校刊

痘疹發微

溯源 痘疹之症不著先秦古書故溯流窮源類多未定之見有謂在母腹中時食穢血而致者有謂在交媾時慾火所鍾者蓋皆胎毒也宋元以來醫家或說太抵皆然而近又有天行疫厲與傷寒同則是外感丁癘胎毒無干不知傷寒之病人有不急之者而痘則人人不得而免傷寒則既病之後不能保其不再病而痘疹則一出之後永不復出如此則所謂胎毒者是也然食穢之於毒火自有男女以來即有之何此不見於漢以前而特於建武以後始有之豈建

武以前獨無胎毒耶曰痘疹之症其始也未有本於胎毒而其既也未始不成於外感惟其本於胎毒故人人不得而免惟其成於外感故特見於建武之後而建武以前無見也經不云平之溫熱者瘡蓋上古之時風氣未漓稟受素厚卽有胎毒自能內消寒涼之地腠理閉秘疫厲難侵溫熱之方風氣平安瘡亦不作故未聞有患痘者至建武時胡虜輒西北之人到南方溫熱之地腠理開通偶感時行疫厲之氣觸動在胎時所受溫熱毒發爲此瘡所傳染無一得免而痘症著矣卽如俗所云楊梅瘡者亦起近代亦能傳染其一發之後不復再出又與痘同蓋人在氣交之中故痘疹由外感而成者類能傳染惟莫開其端則其症不著要未可以執一論也惟內染外感相搏而成故欲發之初未見紅點之際以微汗散之未有不愈者失此不汗至於將出未出之時其勢已成更欲汗之虛者不能成漿實者必成斑爛矣可不審哉

痘疹始於胎毒繼感瘟疫外邪引動伏毒勢若燎原危險萬分互相傳染爲害閭閻所以喻氏爲之痘因溫疫而發按外感六經而治所以擇無疫之時宜潰可收十全萬密齋言之最精管糧亦良痘疹定論補方尤妙近有引種法由占拿氏發明原理百無一失僅行於粵東尙未廣佈宇內江浙之人疑信相半惜乎不能開通奈何能治外感疫屬即能療痘瘡喻氏創之於前是濟世之苦心奈庸俗不知何（接近牛苗引種之法已普遍）

預防 預防之藥如古方油飲子辰砂散龍骨膏之類人多用之未有效者痘固不可以預治耶然不治已病治未病亦醫所宜知故凡值天時不正鄉邑瘟疫盛發或遇冬溫陽氣暴潰至春夏之時瘡必大行宜預以涼血降火之藥治之則多者可少少者可無亦或有此理今以經驗一方附於後 代天宣化丸人中黃（屬土甲巳年爲君）黃芩（屬金乙庚年爲君）黃柏（屬水丙辛年爲

君（梔子（屬木丁壬年爲君）黃連（屬火戊癸年爲君）苦參（佐）荆芥穗（佐）防風（去蘆佐）連翹（去心酒洗佐）紫蘇葉（佐）牛蒡子（酒淘炒佐）山豆根（佐）先視其年所屬取其藥以爲君其餘主歲者爲臣爲君者倍之爲臣者半之爲佐者如臣四分之三於冬至日修合爲末取雪水煮升麻和竹瀝調神麴爲丸外用辰砂雄黃爲衣竹葉湯送下（按此方即無效亦無損）製人中黃法 取甘草大者不拘多少用新竹一節納入甘草仍緊塞無節空處尿缸中浸七七日取出晒乾聽用 消毒丹 辰砂（飛過）絲瓜（近蒂者三寸燒存性爲末）右各等分

周歲以下一錢一歲以上者二錢蜜調下 或將鷓鴣子及雄者炙熟以辰砂擦上令兒服之亦可 右二方大抵以涼血爲主余友孫允博又以生地黃金銀花川山甲主之亦妙蓋二藥能涼血而川山甲能水能陸又可以引二

藥貫通經絡而無闕也

若人脾胃素弱者更宜調其胃氣適其寒溫節其乳食間以六君子湯加枳實砂仁木香之類與之使胃氣和暢榮衛流通其瘡易出亦易斂也如或裏受元虛則又宜以滋補化源爲主微兼涼血之藥如生地金銀花之類氣血既旺雖即毒盛亦自無妨不宜過服涼解之劑要在融通而已

當痘疫未起之年或天時不正溫疫流行之際預服涼血降火之藥清滯伏毒自能減輕伏邪確有此理余在京師旅館有滇南普洱莫君亦來會試談及該處有神皇豆能迎養供奉之其所過之街痘疹不作作者可免天壤真神物也相傳係神農手植並蒙贈一粒試之果驗此言世人罕知今特記述論痘起足太陽痘疹之症大抵自足太陽經傳變中來蓋痘疹雖非外感却是因外感而發故陽經先受病與傷寒同錢氏謂五臟各有一證呵欠伸悶肝

也時發驚悸心也乍涼乍寒手足涼者脾也面目頰赤咳嗽時嚏者肺也惟腎獨無症以其位在下不受穢也此說似是而非夫痘固毒甚然亦自經絡中受病苟非壞症豈有徑爾入臟之理至於腎獨無症耳尻足稍加冷之故則以痘本火毒而腎爲水藏水能克火故火不敢侵之非以其不受穢也子在母胎之時腎實係之徹始徹終皆腎用事設有穢毒腎當先受矣然則緣何而知其自足太陽起也曰靈樞口問篇治欠伸及嚏俱補足太陽是知欠嚏皆太陽候也素問又曰歲水太過寒氣流行病煩心燥悸寒水夾脊逆流上逆丙火正寒氣流行之謂也寒水逆丙火於面上故面頰俱赤是驚悸頰赤又太陽候也至難咳嗽寒熱則傷寒初起之時亦多有之未聞其以此而遽謂爲藏病也曰既與傷寒同自太陽來則何以無頭痛項強骨節痛之症曰此屬溫熱受病既殊辨症亦異也

痘因外感引動伏毒而發太陽通體之經故陽經先受其始必由太陽亦自然之理也西士占拿氏發明引種法以泄手少陽之毒引種後永不復出是良法也

論汗下 痘瘡未出疑似之間不可妄用汗下之藥蓋妄汗則虛其表而難成忘下則虛其裏而易倒陷也然亦語其平示人精審耳若語風寒外襲應出不出則汗劑亦可用也如大便連日不行煩悶狂躁不與下之寧不夭人生命哉是下劑亦可用也況有不止於此者（明表裏別虛實在表宜汗在裏宜下補偏救弊轉危而安亦治法之權衡虛實之妙用也）體仁彙編云痘瘡逆者宜以保元湯加牛旁子芩連玄參絲瓜灰芎歸連翹各五分陳皮桂三分白芍藥一錢防風羌活荊芥前胡各三分薑蔥煎服取汗以泄其毒開其滯滯若七八日內病勢沉重色白毒深又用保元湯兼大黃芒硝枳實朴芎歸水煎大下之

則裏虛而毒反內攻在裏而汗之則表虛而毒益難出氣血既實毒雖盛而不足以勝其氣血則汗下以泄其毒而病自去矣若氣血虛而毒反勝之則不惟虛人禁汗即毒盡泄去亦決不能存活徒負殺人之謗耳要當精審也

辨虛實 不食氣促腹脹吐利爲裏虛四君子湯加減甚者木香散反此則實不必服藥 若臟腑熱甚大便秘小便赤腹滿而喘掌心并腋下汗出麤言妄語渴飲水漿能食而不結痼宜以承氣湯下之 身涼痘瘡根窠不紅頂陷爲表虛黃芪建中湯加減甚者異功湯反此則實不必服藥矣

吐利氣促腹脹爲裏虛腹滿而喘二便秘譫狂口渴爲裏實細心討論虛實判然矣

驗輕重 發熱輕則毒氣輕故報痘亦輕發熱重則毒氣重故報痘亦重輕者不必言治重者宜先解表涼血解毒次之及痘既出便當溫補氣血以助其成

漿收醫失此不治六日之後無能爲矣審之慎之 又有兩耳後紅筋起明潤者其痘必輕若紫紅筋起而晦暗者其痘必重若大紅雖微帶紫而色明潤者痘雖重無事二者急用解毒涼血之藥投之亦重而變輕矣

察驗耳後紅筋以辨輕重最爲明顯易從

驚風

治法心要云常見一老醫言小兒驚搐多是熱症若先使用驚風藥白附子全蝎薑蠶川烏之類便有壞症後有醫幼科藥只作導赤散加地黃防風進三服導去心經邪熱其搐便止次服寧神膏神效 治幼心書序云五苓散在諸家止用之解傷寒溫濕暑毒霍亂而德顯於驚風痰搐瘡疹等疾通四時而用之前同知衡州府事胡省齋因其子驚風得疾問之曰五苓散何必愈此疾乎德顯曰此劑內用茯苓可以安此心之神用澤瀉導小便小腸利而心氣通木得

桂而枯足能抑肝之氣而風自止所以能療驚風施之他症亦皆有說省齋深然之此其善用五苓散也 小兒驚風搐掣醫者視爲一病輒以金石片腦麝香蜈蚣蠲蠶蛇蝎等劑非徒無益反增他症德顯則謂有驚風而搐者有風鬱而搐者驚屬心風屬肝而鬱於氣者亦有搐陳氏所謂蓄氣而成搐者是也但未著其方余因驚風則隨症施治若氣鬱而搐者則用寬氣治之以枳壳枳實爲主嘗因患搐者倉卒求藥教服鋪家散而搐亦止病家深感之此又治搐之特見也

驚者瘕也瘕有虛實之分剛柔之別急者宜清汗滌痰世俗名曰急驚緩者宜扶脾益氣俗謂慢驚切忌妄用鍼刺并悞投金石毒烈之品粵省錢樹滋回春丹馳名中外然僅能治急症若慢症誤用立見危殆其仿單誇耀專治急慢驚風者是欲一藥統治諸病欲廣招徠豈不知無心殺人已干天譴奉