

江西中药

(上集)

江西省中医药研究所编
江西人民出版社

71



江 西 中 藥

(上 集)

江西省中醫藥研究所編

江 西 人 民 出 版 社

江 西 中 藥

(上 集)

江西省中醫藥研究所編

•

江西人民出版社出版

(南昌市三緯路11号)

(江西省書刊出版業營業許可証出字第一号)

江西印刷公司印刷 江西省新华書店发行

•

書号: 01852

开本: 787×1092 1/25 • 印張: 9³/₈ • 字數: 195,330

1959年11月第一版

1959年11月第一版第一次印刷

印數: 1—2,298

統一書号: 14110•33

定价: (7) 八角四分

前 言

中藥是中医用以和疾病作斗争的必需武器，数千年来，我国广大劳动人民依靠它防治疾病，保护身体健康。它对我国人民的生存与繁衍起了巨大的作用。

解放后，党提出了除四害、讲卫生、消灭疾病的震古铄今的伟大号召，于是它更成了重要的物质力量，对增强人民体质，提高劳动生产率，加速我国社会主义建设更有着极其重大的意义。

大家知道，我国药材资源之富，是世界第一的。仅就本省来说，通过这几年的调查，全省出产药材计有 370 余种，而新品种尚在不断地发现。此外，有待发掘的民间药，为数尤多。再从中药材的经营、管理、加工、炮制等经验技术来讲，我省有历史悠久、名闻全国的药材集散地——樟树镇。俗传“药不过樟树不灵”，这是广大人民给予我省药工同志一句意味深长的评价。

我省党政首长，有鉴于此，省卫生厅在一九五五年成立了中藥整理委员会，并组织了调查小组深入各产药地区重点地进行了摸底工作，发现了许多新的优良品种，如黄连、贝母、丰城鸡血藤等。

翌年邵式平省长提出研究江西药材，订定规格标准，发展药材生产的正确指示。我们接受这一光荣任务后，旋即展开了工作，蒐集了许多实践经验，通过整理、研究，写出了“江西中藥”，分期在《江西中医药》月刊发表，借以交流经验。

一九五八年本所成立后，把这项任务列为中心工作。值得提出的是这篇东西的取材，如产地、来源、植物形态、生药性状、栽培与采

制、商品規格、炮制、貯藏等項，都是根据我省實踐經驗，通过整理写出的，对今后发展葯材生产和中葯的研究工作，提供了現實資料。

在社会主义建設总路綫的光輝照耀下，我們今后当更緊密地依靠群众，鼓足干劲，按照原訂計劃，把这项工作作好。但由于我們学識經驗有限，缺略在所难免，尚希讀者多予指正。

江西省中医藥研究所編輯小組謹識

一九五九年三月

目 录

小茴香.....	(7)	白 芷.....	(54)
大 戟.....	(9)	白 朮.....	(57)
三 稜.....	(11)	白 芨.....	(63)
土茯苓.....	(13)	半 夏.....	(64)
山雞椒.....	(15)	半边蓮.....	(67)
楊 子.....	(17)	玄 参.....	(69)
山 楮.....	(20)	仙鶴草.....	(72)
山 菊.....	(22)	地 榆.....	(74)
木 通.....	(25)	艾.....	(76)
木 瓜.....	(27)	百 合.....	(79)
木 蘭子.....	(29)	辛 夷.....	(81)
牛黃子.....	(31)	貝 母.....	(83)
牛 膝.....	(34)	沙 参.....	(86)
丹 參.....	(36)	防 己.....	(88)
天南星.....	(38)	車前子.....	(90)
天 冬.....	(40)	何首烏.....	(93)
半枝蓮.....	(42)	吳茱萸.....	(96)
石 斛.....	(44)	安石榴.....	(99)
石 菖蒲.....	(46)	青 蒿.....	(101)
白 薇.....	(49)	青 蒿.....	(103)
白 茅.....	(51)	金櫻子.....	(105)
白花茵陳.....	(53)	金錢草.....	(108)

金銀花.....	(110)	淫羊藿.....	(176)
芡 实.....	(112)	麦 冬.....	(178)
使君子.....	(114)	問 荆.....	(180)
枇 杷.....	(117)	貫 众.....	(181)
苦 参.....	(119)	高良姜.....	(184)
前 胡.....	(122)	黃 精.....	(185)
枳 壳.....	(124)	黃 連.....	(188)
厚 朴.....	(128)	黃葯子.....	(190)
威灵仙.....	(131)	黃荊子.....	(192)
香附子.....	(133)	萎 蕤.....	(194)
香 薷.....	(135)	鉤 藤.....	(196)
桂 皮.....	(139)	棟.....	(199)
茜 草.....	(140)	楓 楊.....	(201)
烏 药.....	(142)	葛 根.....	(203)
草 烏.....	(144)	补骨脂.....	(205)
桔 梗.....	(146)	槐 花.....	(208)
荆 芥.....	(149)	蒼 耳.....	(210)
栝 楼.....	(152)	蒼 朮.....	(213)
海金沙.....	(155)	蓖 麻.....	(216)
馬兜鈴.....	(157)	樟.....	(217)
益母草.....	(159)	撫 芎.....	(219)
骨碎补.....	(162)	蔓荊子.....	(222)
夏枯草.....	(164)	独 活.....	(224)
桑寄生.....	(166)	龙 胆.....	(226)
茵陈蒿.....	(168)	薄 荷.....	(229)
淡竹叶.....	(170)	薏苡仁.....	(234)
望江南.....	(173)	薺.....	(236)
牽牛子.....	(174)	藜 蘆.....	(237)

小 茴 香

俗 名：蒔蘿子。

概 說：本品載唐本草。本草綱目載，古方有去鈴丸：用茴香二兩，連皮生姜四兩，同入坩器內淹一伏時，慢火炒之，入鹽一兩為末，糊丸梧子大，每服30—50丸，空心鹽酒下。此方治脾胃虛弱病，茴香得鹽則引入腎經發出邪氣，亦治小腸疝氣有效。

产 地：澤州及隴南等地。

来 源：本品為傘形科植物茴香，干燥成熟果实供药用。

植物形态：本植物為多年生草本，春季自宿根叢生數莖，高达二米余。莖枝有多數縱條紋，根莖白色。葉大，為三至四回羽狀全裂，裂片成綫狀細片，有葉柄，葉鞘度達抱莖生。夏日莖頂抽生花軸，呈复傘形花序，无总苞。花小淡黃色，花瓣五出，向內卷曲。果实為双



小 茴 香

悬果，气味芳香。

生藥性狀：本品为黄棕色已分离之双悬果，果下端有长0.2—0.3厘米果柄，頂端有暗棕色柱头痕迹。果体呈长卵圆形，长约0.4厘米，闊0.2厘米，通常具五条隆起的肋綫，正直，呈淡黄绿色，兩端的两条特別隆起，橫切面呈放射狀半月形，闊度大于厚度1.5倍，于扩大鏡下檢視，肋綫內方，各有一維管束，兩肋綫間各具有一油室，在联合面常具二个油室，內胚乳橫切面成腎形。气味芳香，微甜。

栽培与采制：七、八月采实，晒干。

商品規格：以飽滿质干无梗杂者为佳。系統裝。

成 分：

1、加新制Fehling's液共热，生成紅色沉淀。另取同量，加HCl使呈酸性，煮沸，用碱中和后，再加新制Fehling's液，加热，生成紅色沉淀，其量与未水解前相仿。

2、含揮发油。

据文献記載：本品含揮发油約2—8%，油中主要成分为①茴香腦②茴香酮。

效 用：

1、辛温无毒，祛冷煖胃，治霍乱嘔逆，腹冷疝气等症。

2、本品唐代已用于調味佐膳，李珣海药本草称：“善滋食味，多食无損。”宋代苏頌亦称：“今人多用和五味，不聞入药用。”惟宋代大明本草論小茴云：“健脾胃胃气，温腸，杀魚肉毒，补水臟，治腎气（按指疝气而言），壯筋骨。”

附 方：永类鉉方治閃挫腰痛。小茴香作末，酒服二錢。

用 量：一錢至二錢。

炮制与制剂：篩淨，略炒用之。

小茴香酮：生药处理，选用原药。

制 法：取小茴香投入水蒸气蒸餾器內，通水蒸气蒸餾至无芳香味为止，餾出液放冷，集取油层過濾，用95%醇稀釋至每毫升含揮

发油200毫克即得。含醇73—80%v/v。

用 量：一日量2—4滴，分二次服。

貯 藏：原料用袋包裝，置干燥处。本品虽不生虫，但受潮即霉，須保持于燥，并宜改用箱裝封固，以免損耗香气。

大 戟

俗 名：千层塔。

概 說：神農本草經列为下品。本草綱目称：“得蛋即不損脾。”又称：“本品原植物，直莖高二、三尺，中空，折之有白漿，叶长狭如柳叶而不团，其梢叶密攢而上。杭州紫大戟为上，江南土大戟次之，北方綿大戟色白，其根皮柔韧如綿，其峻利能伤人。”本品江苏俗名龙虎草，用治血吸虫病的腹水，据说有效。商品有南大戟、北大戟二种，宜以李时珍所载的植物形态为正品。

产 地：靖安、安义、新建、高安等县山区，均有少量出产。

来 源：本品系大戟科植物大戟，干燥根供药用。

植物形态：为多年生草本，莖直立，圓柱形，附有細毛，高約半米許。叶互生，呈长橢圓披針形，先端尖，邊緣具細鋸齒，基部稍狭，近于无柄。

頂端五叶輪生而平展，为广卵形。在这五叶之上，歧出五枝，其基部着生四叶，近圓形，对生如十字形。小枝再分枝，其分叉处，着生近圓形叶片一湯，各



新 建 大 戟

小枝頂端，開綠黃色小花，總苞萼狀，頂端四淺裂，成半圓形而向內彎卷，結蒴果，呈三角狀扁球形，有疣狀突起。

生藥性狀：本品為肥大的根，下端多分叉，全長約三十五厘米，肥大處莖粗約三厘米，主根上長有細長支根。頂上叢生莖的綫角，全體呈棕紅色或棕色，表面粗糙，有剝落斑痕（為黃色），具多數橫紋，最長橫紋可達半周。根皮柔韌如綿，不易折斷，橫切面色白，組織疏松，味辛苦。

栽培與采制：九、十月采根，曬干。

商品規格：我省出產的為綿大戟，以肥大質干的新貨為佳。均統裝。

成 分：

1、加新制Fehling's液共熱，有紅色沉淀生成，另取同量，加HCl使呈酸性，煮沸，用鹼中和後，再加新制Fehling's液，加熱，有紅色沉淀生成，其量比未水解前較多。

2、加 α -萘酚酒精液及小心滴加濃 H_2SO_4 ，兩液介面處出現紫色環。

3、加入 $FeCl_3$ 試液微顯藍色（鞣質）。

加入 $Pb(Ac)_2$ 試液生成淡黃色沉淀。

據文獻記載：中國各大戟塊根中含蔗糖、檸檬酸、鞣酸及葡萄糖。

效 用：

1、苦寒有小毒，逐水治腫脹，破惡血癰塊。

2、本經用于蠱毒十二水，腹滿積聚；張仲景亦用于逐水。唐甄權云：下惡血癰塊，通經墮胎。李時珍謂大戟能泄臟腑之水濕，甘遂能行經髓之水濕，要必實熱實脈方可用。

3、近時用于肝硬化腹水、血吸蟲病腹水、腎炎等。

附 方：十棗湯（金匱）。

用 量：五分至一錢半。

炮制与制剂：清水洗净，切一分厚筒片，晒干即成。

貯 藏：用簍包裝，置干燥处。此药易生虫，虫季須放入硫磺炕以預防之。

三 稜

概 說：宋开宝本草始著录，本草綱目所述的三稜有海荆三稜 (*Scirpus maritimus* L.) 及荆三稜 (*Cyperus iris* L.) 二种。亦有以香附子 (*Scirpus maritimus* L.) 称鷄爪三稜者，又有以紅薔根作三稜用，故苏頌对三稜的种类說：“流习既久，用根者不識其苗，采药者莫究其用，因緣差失，不复辨别，古人用药，其杂沓可見一斑。”

产 地：清江、新干、安福三县为主产区。次产区为万載、遂川两县。

来 源：本品系莎草科植物三稜，干燥去皮塊根供药用。

植物形态：莖有三稜，高10—20厘米。叶长綫形，头銳尖。腋出頂生傘形花序，初夏开濃褐色小穗狀花，果实为小倒卵形瘦果。

生藥性狀：本品外皮剥去，呈錘体或橢圓狀，有时也有多角形不規則棒，长3—6厘米，寬2—3.5厘米。外表污黃色粗糙，并有多数除去細根的痕迹，質地堅硬如石，不易折斷，切断面淡黃色。无臭味。



清江三稜及三稜塊根

苦。

栽培与采制：本品多为野产，自生于池沼陵澤等水湿之地，人工培植，方法如下。

一、选 地：

池沼陵澤，溝渠堰塘等水湿地方均可，泥土愈肥愈好，肥地每年可采收塊根，还可与水稻間种。

二、栽培法：

1、留种：將收获的小兜选出，窖在田角边，俟来年春天，挖开泥土，取出栽种。

2、栽种时间：农历二月栽植，行距一尺，成方格形。如在肥田內与水稻間种，行距可作适当安排。每亩田約需种根60—80斤。

三、田間管理：

除掉野草，但須注意勿扯松三稜兜子。

四、收 获：

在冬至前后采收，用手扯出，（不可用鋤头挖），应連根囊下結的根塊全部扯起来。除掉殘莖鬚根，洗淨泥土，以刀剝去外皮，日晒或用炭火炕干，即成商品。

商品規格：本省产品，为削去了外皮的光三稜，个大質結，色灰白，品質佳，可供出口。均系統裝。

成 分：

1、加新制Fehling's液，共热，生成紅色沉淀，另取同量，加HCl使呈酸性，煮沸，用碱中和，再加新制Fehling's液，加热，有紅色沉淀生成，其量与水解前相仿。

2、沉生物鹼沉淀剂的反应：

（1）与Mayer's試剂不起沉淀反应

（2）与Wagner試剂生成棕色沉淀。

（3）与苦味酸試液生成黃色結晶形沉淀。

（4）与鞣酸試液生成白色沉淀。

效 用:

1、苦平无毒，破血消积。凡腹部腫塊、月經閉止或痛經等症之由于瘀血結滯者，皆主治之。

2、唐时用于“瘀癥积聚，产后惡血、血結、通經、墮胎，止痛利气”（开宝本草，聖惠方）；宋时引申用于“治气脹，破积气，消扑損瘀血”（大明本草）；金时則用于“飲食不消”（張元素）；清代黃宮繡云：“若以血药同投，則瘀血可通，以气药同入，則于气可治。”

3、近时用作鎮痙鎮痛药，用于胃痛及痛經等。

附 方：三稜煎（千金方），治癥瘕鼓脹。用三稜根切一石，水五石，煮三石，去滓更煎，取三斗汁，入鍋中无湯煎如稠糖，密器收之。每旦酒服一匙，日二服。

用 量：五分至一錢半。

炮制与制剂：水浸4—8小时，洗淨取出，再潤透，切半分厚橫片，晒或烤干。

貯 藏：原料：整个的不易晒干，須用火烘干后，始可裝簍，堆放于通風干燥之处，使不受潮，以防发霉生虫。发霉的可用水洗淨后，再用水炭火烘干。防虫可打硫磺炕。飲片：須裝箱封固，并注意干燥。

土 茯 苓

概 說：陈藏器《本草拾遺》称本品为草禹余粮，本草綱目称有赤白二种，入药用白者良，与葶藶、菝葜为近緣植物，功用亦頗相类似。有以商陆根伪充者宜慎辨之。

产 地：萍乡、分宜、新余、吉水、波阳等县为主产区。次产区有：瑞昌、武宁、鉛山、兴国、龙南、广丰、定南、广昌、彭澤、于都、南康、崇义、靖安、乐平、东乡、貴溪、永修、修水、万載、瑞金、安远、信丰、新干、遂川、永丰、安福等县。

来源：本品屬百合科植物土茯苓，根供药用。

植物形态：为攀緣植物。叶互生，长卵形，先端尖，基部呈楔形，下有托叶所变化之卷鬚。花生于叶腋，排列成繖形花序，花冠成筒狀。果实为漿果，球狀。



萍乡土茯苓

生藥性狀：本品呈压扁的弯曲圆柱根莖，长5—10厘米，直径1.5—3厘米。外表棕色有光澤；有多数不規則隆起，皺紋和鱗片。根的痕迹較大約0.1厘米。質地堅硬不易折斷，断面顆粒狀；紅棕色和淡棕色，常不調和，用放大鏡察見有許多白色結晶性小点。商品常除去鱗皮或外皮，切成縱的或橫薄片（不到0.1厘米）或厚片（0.2厘米）；类白色

或淡棕色，有时顏色呈显不均，有时在中央部有一圓形或橢圓形内皮层环，占其直径比为 $\frac{1}{5}$ — $\frac{2}{5}$ ，內有不少白色維管束小点，用放大鏡观察，每个維管束可見有2—3个小孔。在縱形切片上可看到。

栽培与采制：三、四月采根，放鍋內加水煮至水沸即取起，切成薄片，晒干。

商品規格：均系統裝。以色白片薄无碎的为佳。

成 分：

1. 加新制的Fehling's 試液，共热，有紅色沉淀生成。另取同量，加HCl使呈酸性，煮沸，用鹼中和，再加新制Fehling's 試液，加热，有紅色沉淀生成，其量較未水解前的稍多。

2. 与生物碱沉淀剂的反应：

(1) 与Wagner's試剂生成棕色沉淀。

(2) 与Mayer's試剂生成渾濁。

(3) 与苦味酸試液生成无色結晶形沉淀。

(4) 与鞣酸試液生成棕黃色沉淀。

据文献記載：土茯苓大概含生物碱。

效 用：

1、甘淡无毒，祛湿熱，辟毒穢。凡梅毒、瘡瘍、癰癤、癰腫等之由于湿熱毒邪所致者，均主治之。

2、唐陈藏器称能代谷耐飢；宋代苏頌始用于敷瘡；明李时珍云：“健脾胃、强筋骨、去風湿、和关节、止泄瀉；治拘攣骨痛、惡瘡癰腫、解汞粉銀朱毒”；清黃宮繡極推賞于楊梅瘡毒，謂楊梅瘡多由淫穢之邪所致，可发于咽喉、經絡筋骨，須用土茯苓湯代茶半月方愈。”

3、近时用作驅梅毒药，用于梅毒、淋濁等症。

附 方：邓笔峰杂兴方，治楊梅瘡毒，用冷飯团（即本品）四兩，皂角子七个，水煎代茶飲，淺者二七，深者四七，見效。

用 量：三錢至五錢。

炮制与制剂：生用。

制 剂：浸膏溶液：生药处理，粉碎成粗粉。

制 法：取土茯苓1,000克，按中国药典1958年版，用25%醇渗漉法，俟滲出液达生药四倍时，即停止渗漉，蒸回醇，過濾，取少許澄明液測定含量，調整至每毫升含120毫克，总抽出物，再加入苯甲酸鈉0.5%，尼泊金0.1%防腐，靜置過濾即得。不含醇。

用 量：一日量4—10毫升，二次分服。

貯 藏：本品不生虫，但須保持干燥，因受潮湿易使白色变紅。潮貨須用日晒，不可用火烘，因烘亦会变紅色。一般用木箱裝封固。

山 雞 椒

俗 名：山姜子、木姜子。

概 說：本品藥市有時當作畢澄茄用，但與生藥學上記載的不同。果實含有精油，近年用作紫羅蘭酮合成原料。本種聞在印度采葉飼蠶，特提供參考。據江蘇臨床應用，治療血吸蟲病有效。

產 地：主產於遂川縣。

來 源：本品系樟科植物山鷄椒，果實供藥用。

植物形態：灌木或小喬木，莖高約三米。樹皮灰褐色，枝條細長，黑褐色。單葉互生，有香氣，披針形，表面綠色，背面帶白色，先端尖，全緣，基部楔形，具有葉柄，長約1厘米。花葉同時開放，為傘形束狀聚繖花序，腋生。果實呈核果狀，球形，生青熟黑，平滑無毛。



遂川山雞椒

生藥性狀：本品為球形的果實，呈黑棕色或亮黑色，直徑為4—5厘米，表面呈網狀皺縮，一端有因果柄脫落之棕黃色小點，偶亦留有果柄，果柄長約0.5厘米。外中果皮為紅棕色物質，油狀，可用手指刮下。內果皮為棕紅色光滑硬殼，剖開見內含圓形暗棕色油質種子一枚。種皮緊貼內果皮，淡棕黃色，有光澤，剖開種子可見半球形子葉二枚，胚小，

位於一端，香氣濃，味辛辣而苦。

栽培與採制：六、七月採集，曬干。

商品規格：以粒勻完整無碎屑者為佳。系統裝。

成 分：

1、加新制Fehling's液，共熱，生成紅色沉淀，另取同量，加HCl使