




畜禽疾病中草药处方选辑



畜禽疾病中草药处方选辑

华光 方文 编

广西人民出版社

畜禽疾病中草药处方选辑

华光 方文 编

☆

广西人民出版社出版

(南宁市河堤路14号)

广西新华书店发行 柳州市印刷厂印刷

•

开本 787×1092 1/32 3 印张 52 千字

1983年4月第1版 1983年4月第1次印刷

印数 1—28,000 册

书号: 16113·110 定价: 0.29 元

编者的话

几千年来，我国劳动人民在生产实践中运用中草药防治牲畜疾病，积累了极其丰富的经验，民间流传着许多有效验方和单方。发掘祖国兽医学宝库，加以整理，验证提高，对于更好地继承祖国兽医学遗产，发展畜牧业，都有着重要意义。

为了普及民间兽医临床治疗技术，我们针对畜禽的某些常见病、多发病，辑录了中兽医处方 434 条，其中选进了 1974 年广西人民出版社出版的《广西兽医中草药处方选编》一书中的部分处方。临床实践证明，这些处方具有一定的疗效，处方简便，药物易找，适合基层兽医员、饲养员、畜牧工作者以及家庭饲养畜禽的广大群众参考使用。书后还附有牲畜疾病的插枝疗法和灌药方法。

本书处方，偏重于农村常见草药。药物剂量，采用市制，1 斤 = 16 两，1 两 = 10 钱。如采用公制（1 斤 = 500 克），为方便计算，可按 1 两 = 30 克，1 钱 = 3 克计；如为液体，则 1 两 = 30 毫升，1 钱 = 3 毫升。

由于我们水平有限，实践经验不足，收集的材料不够全面，错误之处，请批评指正。

编者

1982 年 2 月于广西兽医研究所

目 录

一、传染病	(1)
猪丹毒	(1)
猪肺疫	(3)
猪喘气病	(4)
小猪白痢	(5)
小牛白痢	(7)
牛流行性感冒	(8)
羊烂口病	(10)
二、内科病	(12)
猪腹泻	(12)
牛百叶干	(13)
牛臌胀	(14)
羊臌胀	(16)
牛大便硬结	(17)
牛血痢	(18)
牛腹泻	(20)
马风气疝	(23)

马挫李疳..... (23)

咳嗽..... (24)

牛血尿..... (26)

牛 马尿闭 (28)

猪饱痢症..... (29)

牛吃烂红薯中毒..... (30)

牛吃木薯 高粱苗中毒 (32)

牛“六六六”农药中毒..... (33)

牛饮人尿中毒..... (35)

中暑..... (36)

三、外科病..... (39)

外伤出血..... (39)

马鞍伤..... (40)

烧 烫伤 (41)

痈疮..... (43)

挫伤..... (44)

扭挫伤..... (46)

骨折..... (47)

腐蹄病..... (49)

角膜翳..... (50)

四、寄生虫病..... (52)

猪蛔虫病..... (52)

疥癣..... (53)

五、产科病	(55)
猪难产.....	(55)
牛难产.....	(56)
猪死胎.....	(57)
胎衣不下.....	(58)
牛子宫脱垂.....	(60)
牛乳房炎.....	(62)
缺乳.....	(63)
母猪不发情.....	(64)
母猪产后慢消.....	(65)
六、禽病	(67)
小鸡白痢.....	(67)
胀嗦.....	(68)
鸡蛔虫病.....	(69)
鸭丝虫病.....	(70)
鹅虱.....	(71)
七、其他疾病	(73)
牛下颌肿痛.....	(73)
牛脚软.....	(75)
牛翻胃吐草.....	(76)
牛 马劳役过度	(77)
牛脾肿痛.....	(78)
牛鞭不收.....	(79)

猪 消寒症 (80)

附录:

(一) 顺气孔插枝治疗 (82)

(二) 猪灌药法 (84)

(三) 牛、马灌药法 (84)

一、传 染 病

畜禽传染病是由于某些病原体——细菌、病毒等侵入动物机体，造成组织受损，生理机能紊乱而引起某些特定的疾病。可由一头畜（禽）发病而传染更多的畜（禽）；或在某一地区首先发生疫病而传播引起其他地区的畜（禽）爆发同样的疾病。在畜、禽的各种疾病中，传染病所造成的危害最大，可在很短时间内迅速传播蔓延，常使大批畜、禽死亡。

对于传染病的防治，应该强调，必须贯彻“预防为主，防治结合”的方针，充分利用现有疫苗和菌苗，定期进行预防注射或口服免疫，防制疫病流行。

猪 丹 毒

猪丹毒又称打火印，是由猪丹毒杆菌引起的传染病。通常呈高热的败血症经过，典型病例伴有特征性皮疹。主要侵害3—12月龄的猪，在我国南方，夏、秋多发。

〔病因〕

病猪和带菌猪是本病的主要传染源。病猪的分泌物和排

泄物污染的环境、饲料、饮水和土壤等，都能经消化道感染健康猪，皮肤创伤和吮血昆虫也是传播本病的媒介。

〔病状〕

最急性的败血型猪丹毒病猪常突然死亡。疹块型猪丹毒较为常见，病初食欲减退，精神不振，体温达 41°C 以上，背部、颈及四肢等处皮肤出现红色或紫色的大小不等的方形或菱形（有时不规则）皮疹，故称打火印。疹块初坚硬，呈扁平凸起，与健康皮肤界限分明，用指按压时退色，放手后又现红色，病猪跛行或瘫痪。几天后，疹块形成痂皮，痂皮脱落后，体温恢复正常，病猪可自愈。慢性猪丹毒病程拖延较长（1—2月），常发生心内膜炎，心脏衰弱，最后导致死亡。

〔治疗〕

方1：桃子叶适量，捣溶，冲肥皂水洗刷猪身。初病患猪，很快治愈。

方2：野芋2两、火炭母、鱼腥草、六月雪、过江芦荻、石膏各4两，水煎灌服。

方3：桉树叶4两、虎杖2两、金银花1两、黄栀子1两、白矾4钱，水煎灌服。

方4：打铜草、雷公根、田蟹、露兜筋各适量，水煎，混饲料喂服。结合肥皂水洗刷猪身，连续3—4天。

方5：黄柏4钱、川连4钱、防己6钱、栀子6钱、麦冬5钱、玄参5钱、白芍5钱、牛子5钱、黄芩5钱、花粉

5钱、地骨皮6钱、红花6钱、归尾6钱，水煎灌服。

方6：金银花、野菊花、一枝黄花各5—8钱，水煎灌服，连服3—4天。

猪 肺 疫

猪肺疫又叫猪出血性败血病，简称猪出败，俗称锁喉风。是由巴氏杆菌引起的急性、热性、败血性和继发性传染病。以机体组织、器官发生出血性炎症为其特征。

〔病因〕

引起本病的诱因很多，内源感染是由于健康猪的上呼吸道和消化道常寄有非致病的巴氏杆菌，当这种带菌猪受冷、感冒、饥饿、饲养管理不当，营养不良或患寄生虫病时，身体抵抗力减弱，就会引起发病。外因感染是由于接触病猪的分泌物或排泄物污染的饲料、饮水或其他污染物而经消化道或呼吸道感染。

〔病状〕

猪肺疫病猪体温升高到40—41℃左右。呼吸困难，有时咳嗽，病的后期鼻孔流出泡沫状粘液，并混有血液，有时喉部肿胀，皮肤有出血性紫斑，指压不退色，病初大便秘结，后期下痢带血。急性型猪肺疫常在2—8天内死亡。

〔治疗〕

方1：榄核莲、地耳草、瓜子金、石胡荽各2两，水煎

灌服，每日一剂，分2次服，连服3天。

方2：一枝黄花、土牛膝、万年青、射干各2两，水煎灌服。每日一剂，分2次服，连服3天。

方3：黄芩1两、麻黄4钱、桑叶5钱、紫苑5钱、杏仁4钱、姜仁4钱、金银花4钱、枇杷叶5钱、陈皮5钱，水煎灌服。

方4：金银花5钱、苈麻根6钱、青蒿6钱、两面针3钱、雄黄2钱，水煎灌服。

猪喘气病

猪喘气病是由猪肺炎枝原体引起的以咳嗽和喘气、病变局限于肺部为特征的传染病。

〔病因〕

本病一年四季均可发生，夏季较少。气候条件对本病发生的影响较大，饲养管理不当也是促使发病的因素。病原枝原体存在于病猪的肺组织中，通过咳嗽、喷嚏排出体外，健康猪通过直接接触，飞沫经过呼吸道吸入而感染。凡与病猪同群的健康猪，几乎全部遭到传染。

〔病状〕

病初有咳嗽，呼吸次数增多，病情加深时，呼吸极度困难，腹肋急剧起伏，病重时开口张鼻，嘴鼻变成紫色，呼吸达100次以上，但体温一般少有超过40℃者。病猪常由于

衰竭窒息而死。

〔治疗〕

方1：猪瘟藤4两、不出林4两，水煎灌服。

方2：断肠草、秤星木、酸藤根、六月雪、露菟筋、曼陀罗、扁柏、桑白皮各适量，水煎灌服。

方3：枇杷叶、桑白皮、鱼腥草、苈麻薯、白茅根、百部各适量，水煎灌服。

方4：石仙桃3斤、水蜈蚣8斤、铁包金2斤，晒干碾末，加蜂蜜制成药丸。大猪每日服2次，每次5钱至1两，连服7天为一疗程，小猪用药量酌减。

方5：胆星5钱、桑白皮1两、桔梗1两、麦冬1两、天冬1两、葛根1两、花粉6钱、杏仁1两、知母8钱、枳壳8钱、甘草2钱，水煎灌服。

小 猪 白 痢

小猪白痢是由多种不同血清型的致病性大肠杆菌引起的传染病。10—20天龄的仔猪发病最多。临床上以下痢为其特征。

〔病因〕

大肠杆菌在自然界中分布很广，也存在于健康猪的肠道内，在正常情况下不发病，但仔猪由于饲养管理不善，卫生环境不好，猪栏潮湿，通风不良，气候突变，受冷感冒等因

素，均可使仔猪抵抗力减弱而引起发病。健康猪舔了病猪粪便污染的饲料、饲具或垫草也可引起发病。

〔病状〕

本病多发生于20日龄以内的仔猪。患猪通常体温正常，但被毛松乱，下痢是其主要临症特征，粪便白色、灰白或淡黄色，混有粘液，呈糊状或条状，有时便稀而带气泡，各色粪便都有特异的腥臭气味。病猪迅速消瘦，体质急剧衰弱，3—5天内死亡，幸免者变为慢性，不容易养大。

〔治疗〕

方1：一匹绸、算盘子各1斤，水煎灌服。若腐烂屎则添加枫树叶半斤、金银花半斤。

方2：海蚌含珠2两，捣溶冲蜜糖灌服。

方3：榄核莲适量，水煎灌服。

方4：豆豉捣溶，调水灌服。

方5：凤尾草、黑脚蕨、半边旗、百草霜、番石榴叶各适量，水煎灌服。同时喂母猪。

方6：枫树子（烧炭）、车前草各适量，共碾末调水灌服。

方7：虎杖切片烘干碾末，每次用2钱灌服，每天2次。

方8：薄荷4两、大飞扬2斤，共碾末，每次用1钱，调温开水灌服。

方9：南瓜藤适量（经霜的老藤更好），烧炭，碾末，用时适量拌精料喂母猪，每次3—5钱，直接喂给仔猪亦

可。

方10：用鲜马齿苋全草抛入猪栏内，任由母猪及小猪采食，连用几天。

方11：用鲜荠菜生喂母猪及仔猪，连用几天。本方在冬、春期间尤为适宜。

方12：尖槟8钱、吴萸1钱、石榴皮3钱，水煎灌服。粪呈黄色者加钩藤3钱、防己3钱。粪呈灰色者加砂仁1钱。

方13：地榆1两、石榴皮1两、土茯苓1两、山苍子2两、十大功劳2两、百草霜适量，共碾末喂母猪，每天2次，3天喂完。

方14：金银花、地榆、侧柏炭、十大功劳、蒲葵叶、白茅根、黄荆叶各适量，水煎灌服。

方15：十大功劳6斤、钩藤10斤、爬地牛奶10斤，熬成药膏。专治猪、牛、马的红、白黑痢。小猪每次用1钱，牛、马每次用5钱。

方16：顺气孔插枝治疗。（操作方法见附录，下同）。

小牛白痢

小牛白痢主要发生于初生1—8天龄的犊牛，由大肠杆菌所引起。以粪白色水泻为其特征。

〔病因〕

本病除因细菌性病原致病外，还可由于病畜粪便污染的

饮水、饲料等经消化道感染。缺乳或母乳维生素甲过低，哺乳过饱或误舔不洁草料，气候突变等都是发病的诱因。

〔病状〕

病初小牛出现异常嗜好，如舔食粪水、污物、墙壁灰砂等而引起消化不良，随着病情的演变，出现下痢，粪便污浊后躯，恶臭。患牛被毛粗乱，两耳下垂，眼球凹陷无神，四肢厥冷，迅速消瘦以致死亡。

〔治疗〕

方1：地稔、鬼画符、黄牛木叶、柠檬叶各适量，共捣溶，加蜜糖冲水灌服。

方2：桃金娘叶半斤、海蚌含珠半斤、爆芽郎叶4两、黑脚蕨4两、黄枝子2两、百草霜1两，上药切碎炒黄，混合碾末，每次用2两，冲水灌服。

方3：桃金娘、番石榴叶、扫把枝各适量，水煎灌服。

方4：仙鹤草半斤、茜草4两、侧柏叶半斤（炒）、土茯苓半斤、金银花2两，水煎灌服。

方5：防己1两、黄柏1两、黄芩1两、槐花1两，水煎冲蜜糖灌服。

牛 流 行 性 感 冒

牛流行性感冒一般多发生于黄牛和奶牛，病原是一种病毒。本病传播迅速，发病率高，以发高热、跛行、流鼻涕为

其临症特征。

〔病因〕

牛流感多在秋末春初发病较多。气候骤变，阴雨季节栏舍潮湿，使役不当，饲养失调等均为主要诱因。

〔病状〕

患牛发病突然，传播迅速，病初有咳嗽，体温升高，被毛松立，躯体发抖，呼吸加快，远处可闻其声，有时流鼻液，眼红流泪，四肢或个别肢僵硬，跛行，严重者卧地不起，有时腹胀或发生胃肠炎，大便量少而硬结，小便短少，经几天后体温渐降而病自愈。

〔治疗〕

方1：青蒿、假茶辣叶、樟树叶、黄皮果叶各半斤，薄荷6两、紫苏4两、山芝麻4两，水煎灌服。

方2：青蒿、土荆芥、山芝麻、古羊藤、黄皮果叶、爬地牛奶各半斤，水煎灌服。

方3：香茅1斤、三叉苦半斤，水煎灌服。

方4：桔子叶、柠檬叶、黄皮果叶、救必应、山芝麻、画眉木各2两，水煎灌服。

方5：救必应半斤、薄荷4两、山姜半斤，水煎灌服。

方6：土黄连、榄核莲、樟树叶、十大功劳各1—2两，水煎灌服。

方7：盐腌柠檬2个、辣椒5—6枚、茶辣子1两，共