



百鸟



BAINIAO XIEZHEN TUPU

写真图谱

顾文国 张智斌 许金梁 编著
许金梁 摄影



上海书店出版社

0959.7-64

BAINIAO XIEZHEN TUPU



百鸟

写真图谱

顾文国 张智斌 许金梁 编著
许金梁 摄影

RB662/03

上海书店出版社

图书在版编目(CIP)数据

百鸟写真图谱 / 许金梁编著. — 上海: 上海书店出版社, 2002. 5
ISBN 7-80622-908-6

I. 百 ... II. 许 ... III. 鸟纲—图谱
IV. Q959.7-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2002)第026224号

百鸟写真图谱

编 著 顾文国 张智斌 许金梁

摄 影 许金梁

责任编辑 俞子林 朱安邦

装帧设计 谷夫平面设计工作室

技术编辑 张绍军

出版发行 世纪出版集团上海书店出版社

(200001 福建中路 193 号 www.ewen.cc)

印 刷 上海出版印刷有限公司

开 本 890 × 1240mm 1/32

印 张 4

印 数 4000

出版日期 2002年5月第一版 2002年5月第一次印刷

书 号 ISBN 7-80622-908-6/1 · 316

定 价 30.00 元

概述

目前已知的鸟类有 8600 种，它们有的体大如牛，有的小如珍珠；有的分布在寒冷的北方，有的栖息于炎热的南部；有的为适应气候变换必须每年迁徙。

由于鸟的这些活动，给人们留下了许多动人的故事。“大雁北飞”、“鸳鸯哀情”，都是那样的美，让人浮想联翩；杜甫的“两个黄鹂鸣翠柳，一行白鹭上青天”，本是对大自然的写照；可是随着现代经济的高速发展，鸟类的世界越来越小，濒临灭绝的鸟类越来越多。为了留住鸟类绚丽多姿的身影，人类正在设法保护自然环境，拯救稀有动物，这已经成为人们的共识。

鸟是陆生脊椎动物中分布最广、种类最多的动物。与哺乳动物一样，鸟也是恒温动物。鸟类最大的特征，是它们全身披着羽毛，凭借着这些羽毛，可以自在地在空中飞翔。为了适应自然环境、生态条件的变化，鸟类也形成不同的生活方式，有的翱翔于天空，有的奔跑于陆地，有的栖息于森林。环境不同，又形成了不同的体形结构：善于游泳的游禽，它们脚趾间有蹼；喜在沼泽地的涉禽，嘴长、颈长、脚长。不同食物结构，嘴的形状也不相同，吃昆虫的鸟，嘴细长；吃果实的鸟，嘴粗短。

卵生，是鸟类的又一特征。每到繁殖时期，雄鸟雌鸟都会变得特别漂亮，尤其是雄鸟，如孔雀、锦鸡等会撑开它们的羽毛炫耀自己。鸟的产卵数，根据种类不同从 1 个至 40 多个不等；鸵鸟卵可达 1500 克，蜂鸟卵只有几克重。

本书共收集了一百余种鸟的照片，其中许多是珍稀鸟类，许多具有观赏价值。让我们共同来关爱这些美丽的生灵，使我们的生存环境变得更美好吧！





目 录

鸵形目

- 鸵科
- 非洲鸵鸟 /5
- 美洲鸵鸟 /6

鹤鸵目

- 鹤鸵科
- 鹤鸵(食火鸡) /7
- 鸸鹋科
- 鸸鹋 /8

企鹅目

- 企鹅科
- 斑嘴环企鹅 /9
- 皇帝企鹅 /11

鸬形目

- 鸬鹚科
- 斑嘴鸬鹚 /13
- 粉红鸬鹚 /14
- 鸬鹚科
- 白头鸬鹚 /15
- 鸬鹚 /16

鹤形目

- 鹤科
- 白头鹤 /17
- 丹顶鹤 /18
- 灰鹤 /22
- 白枕鹤 /24
- 黑颈鹤 /26
- 蓑羽鹤 /27
- 西非戴冕鹤 /28
- 东非戴冕鹤 /29
- 鸨科
- 大鸨 /30

鸨形目

- 鹭科
- 小白鹭 /32
- 中白鹭 /32
- 大白鹭 /33
- 夜鹭 /34
- 草鹭 /35
- 牛背鹭 /36
- 鸨科
- 黑鸨 /37
- 白鸨 /38
- 红鸨科
- 智利火烈鸟 /39
- 小火烈鸟 /40

- 鸬科
- 美洲红鸬 /41
- 白琵鹭 /42
- 鸭科
- 小天鹅 /43
- 大天鹅 /44
- 疣鼻天鹅 /45
- 黑天鹅 /48
- 绿头鸭 /50
- 鸳鸯 /51
- 鸿雁 /52
- 灰雁 /52
- 斑头雁 /53

鸥形目

- 灰背鸥 /54
- 红嘴鸥 /54

鸡形目

- 珠鸡科
- 珍珠鸡 /55
- 雉科

- 红腹角雉 /55
- 蓝马鸡 /55
- 石鸡 /55
- 褐马鸡 /57
- 家鸡 /57
- 黑鹇 /58
- 白鹇 /58
- 红腹锦鸡 /59
- 白腹锦鸡 /60
- 白颈长尾雉 /61
- 蓝孔雀 /62
- 白孔雀 /63
- 绿孔雀 /65

鸚形目

- 鸚鵡科
- 绯红鸚鵡 /66
- 蓝黄鸚鵡 /67
- 金黄桃脸情侣鸚鵡 /68
- 绿桃脸情侣鸚鵡 /68
- 灰色鸡尾鸚鵡 /69
- 黄冠亚马逊鸚鵡 /69
- 红额亚马逊鸚鵡 /70
- 伪装情侣鸚鵡 /71
- 虎皮鸚鵡 /72
- 折衷鸚鵡 /73
- 大葵花凤头鸚鵡 /74
- 小葵花凤头鸚鵡 /74
- 小白凤头鸚鵡 /75
- 亚历山大鸚鵡 /76

鸽形目

- 鸠鸽科
- 家鸽 /77
- 扇尾鸽 /78
- 冠鸽 /79





绿背金鸠 / 80

● 翠鸟科

蓝翡翠 / 84

笑翠鸟 / 85

佛法僧目

● 戴胜科

戴胜 / 81

● 犀鸟科

花冠皱盔犀鸟 / 82

双角犀鸟 / 83

冠斑犀鸟 / 83

棕颈犀鸟 / 84

隼形目

● 鹰科

兀鹫 / 86

秃鹫 / 88

红隼 / 89

金雕 / 89

● 鸱鸃科

斑头鸱鸃 / 90

红角鸱 / 90

雕鸮 / 91

雀形目

● 椋鸟科

八哥 / 92

金冠树八哥 / 93

黑领椋鸟 / 94

鹁鸪 / 94

● 鹁鸪科

红嘴相思鸟 / 95

银耳相思鸟 / 96

褐肋雀鹛 / 96

眼纹噪鹛 / 97

黑脸噪鹛 / 97

矛纹草鹛 / 98

红头穗鹛 / 98

丽色噪鹛 / 99

红翅薮鹛 / 99

鹁鸪 / 100

蓝短翅鹛 / 100

画眉 / 101

金胸雀鹛 / 102

红点颏 / 107

虎斑地鹛 / 111

● 雀科

金翅雀 / 103

黑尾蜡嘴雀 / 104

麻雀 / 104

卷翅芙蓉 / 105

芙蓉 / 106

朱雀 / 112

● 鸦科

蓝绿鹊 / 106

喜鹊 / 107

● 文鸟科

剪尾维达鸟(寿带鸟) / 108

白文鸟 / 109

红领寡妇鸟 / 111

● 百灵科

百灵 / 110

● 梅花雀科

七彩文鸟 / 110

● 黄鹌科

黑枕黄鹌 / 112

● 鹌科

白头短脚鹌 / 113

白头鹌 / 116

● 杜鹃科

八声杜鹃 / 113

● 太平鸟科

太平鸟 / 114

● 绣眼鸟科

绣眼 / 115

● 阔嘴鸟科

蓝尾阔嘴鸟 / 116

● 鹌鹑科

白鹌鹑 / 117




说明：①图版内中文鸟名后是英文名和学名。

②书中线描图采自湘麟等编绘《动物装饰图集》(上海书店出版社1993年版)。

非洲鸵鸟 (Ostrich)

struthio camelus

属鸵形目、鸵科。分布于非洲平原荒漠地区，是现存最大的鸟类。雄鸟最高达3米，重150千克左右。翅膀已退化，不会飞翔，但双足强健，善于奔跑，时速达60公里。主食植物，也吃少量昆虫等小动物。直接在地上的土穴中筑巢，每窝产卵约15枚，40余天出雏。目前已作为家禽大量饲养。



5


非洲
鸵鸟



美洲鸵鸟 (Greater Rhea)

Rhea americana

属鸵形目、鸵科。主要生活在南美洲多草的平原上,也去丘陵地带活动,但不去高山和森林地区。平时一雄和数雌同栖,幼鸟出壳后即结集成几十只的较大群体。食性很杂,以各种植物的果实为主,也吃草和昆虫及部分爬虫等动物。每窝产卵通常为20多枚。由雄性单独孵卵。



鹤鸵 (Australian Cassowary)

Casuaris casuaris

鹤鸵又名食火鸡，属鹤鸵目、鹤鸵科。分布于澳洲北部伊里安及附近岛屿的茂盛丛林中。胆小易惊，粗壮的腿是它的主要自卫武器。弹跳力特强，能跳过2米高的障碍物。食物主要是植物汁，尤其是多汁的果实，也吃一部分昆虫、蛙、蜥蜴等动物。窝巢常筑在树丛间的地上。每窝产卵3—8枚。卵色似绿宝石。



7

美洲鸵鸟
鹤鸵



鸕鹚 (Emu)

Dromiceius novaehollandiae

栖息于澳洲南部的开阔平原上,平时3—5只成小群活动。主食各种野菜等植物,吃少量蜥蜴等小动物。在繁殖中多成对活动,筑巢在靠近树根的地上,每窝产卵8—18枚。由雄性单独孵卵和育幼。孵化期40余天。幼鸕鹚身上有显著的纵条纹。现作为家禽开发饲养。(上、左图)




斑嘴环企鹅 (Jackass Penguin)

Spheniscus demersus


属企鹅目、企鹅科。分布于非洲南部的海岸。喜结群活动,善游泳、潜水。主食小型鱼类及其它海洋生物。繁殖期营巢在海岸的缝隙中,铺以干枝、小石子等,每窝产卵1—3枚,孵化期41—43天,雏鸟为晚成鸟。(右图)

1400392



9

企鹅
企鵝



斑嘴环企鹅



小企鹅



皇帝企鹅 (King Penguin)

Aptanodytes farwari



属企鹅目、企鹅科。产地南极。皇帝企鹅是企鹅家属中体形最大的一中，生活在南极，在南极大陆产卵，和其他企鹅不同的是他们在最寒冷的季节产卵，产下的卵乱放在脚下，靠脚下的体温孵化卵。雌企鹅在雄企鹅孵化卵时出去寻食，来回需二个月左右，在此期间，雄企鹅不吃不喝，一直到雌企鹅采食回来。雄企鹅为抵御寒冷的气候，会聚在一起取暖。利用尖锐的嘴捕食鱼类和乌贼。





斑嘴鹈鹕

(Spotted billed Pelican)

Pelecanus philippensis

属鹈鹕形目、鹈鹕科。栖息于河北省以南的东部地区的河川、湖泊等处。善于游泳，飞翔能力很强。目光锐利，在空中即能发现水中的鱼。它们常在水上排成直线或半圆形，用“渔网”似的大嘴捕捞。也吃小型两栖类及鸟类。结群营巢，每窝产卵3-4枚。雏鸟约32天出壳。是国家二级保护动物。

(左、下、右图)





13

斑嘴鵜
鵝



粉红鹈鹕

(Pink backed Pelican)

Pelecanus rufescens

属鹈鹕形目、鹈鹕科。分布于我国新疆、福建等地的开阔的河谷和三角洲地带。粉红鹈鹕行动缓慢而安静，是一种相当谨慎小心的大型水禽，好成大群生活。食物主要是鱼类。它们的视力很发达，捕鱼本领很高。一只粉红鹈鹕，每日约需2公斤食物，但缺食时也可以4—5日不进食。是国家二级保护动物。 (左、下图)

