

$\frac{34}{52}$

新文豐出版公司印行

覆載萬安方(三)

出版說明

醫也仁術，其言五運六氣，所以除疾疫而保性命，醫書之流傳，益可恢宏其仁，是乃利物濟民之寶也。而天地之間，固粗糙易得，精緻難求；自古而今，醫家之書不知凡幾，其精者鮮矣，字句差之毫釐，湯藥小小不達，則後人受弊之深，豈惟千里計哉？故本公司一向殫力於此，不敢稍忽，已精心發行之中醫名著達數百種，並皆少見之珍本，嘉惠杏林，良有以也。

此次由香港陳純仁中醫師大力推薦，提供精選故宮珍藏之古代善本醫書書目，承國立故宮博物院惠借影印刊行，凡三十四種，計精裝五十二冊。搜羅繁富，上自炎昊，下逮里巷，且板本皆爲罕見不傳之秘本、善本，年代蓋不出唐宋元明。要能會其真意，斟酌臨時，期於賢哲着宿有所助益，而醫道可望光大，斯爲天下之大幸焉。

又
本系列珍本醫書之出版流播，特承國立故宮博物院惠助，謹此

致謝

新文豐出版公司 謹啓

中華民國七十六年十月

小兒

一一切泄浮

三傷浮

五熱浮

七水穀浮

九暴浮

十一利渴不止

十二下痢羸瘦

十五滯痢毒白

十七一切痢

二積浮

四冷浮

六洞泄

八暴浮

十痢久不止

十二虫泄

十四痢差後遍身腫

十六小兒八痢

十八冷痢

九熱痢

立白膿痢

立膿血相雜痢

立休息痢

平冷熱痢

立純血痢

立五色痢

立脫肛

續載萬方卷第四十六

性全集

小兒八泄浮痢病

一切泄浮

即新書第二十八卷又作洩

二十八卷有十五種浮痢

養生必用論下利謂古人凡奏圖浮者皆謂之利尋常

小浮謂之利米穀不化謂之米穀痢或言下利清穀利

裏急後重謂之滯下言所下滯滯膿血點滴坐圖遲久

痢有兩種寒熱痔瘡是也白多為寒赤多為熱赤白相雜兼以後重為痔瘡則純下

血隨證用藥不若令人之毒也

茅先生論霍亂吐浮積浮驚浮疳浮渴浮傷浮冷浮熱

浮諸般浮形狀各別下某殊等

私云一切泄浮則一篇也治方可通諸般浮狀

茅先生論又云、小兒浮痢、眼微視、口内生瘡、鼻口乾燥、
浮久不止、鼻下黑血、顴門腫陷、不能進食、大渴不止、死
候不治、

錢一附方云、驚風或泄、浮等諸病、煩渴者、皆津液內耗
也、不问陰陽、單煎錢氏白朮散、使滿意、取足飲之、弥多
弥好、

嬰童寶鑑、洞泄死候、大浮不止、体熱多困、眼緩澹泄、顴
陷不動、是死候也、

香連圖、大醫局方治小兒冷熱不調、泄浮煩渴、未穀不化、腹
痛腸鳴、或下痢膿血、裏急後重、夜起頻併、不思乳食、肌

肉消瘦漸成疳

龍骨

黃連

煨

白石脂

白礬燒

乾薑

各一兩

右細末醋麪糊和丸如麻子大每服一

歲兒十丸米飲或乳汁服空心食前煩渴用人參湯

服日夜四五服二三歲二三十九或黑豆大五六歲

三十九聖惠方另龍骨圓同治洞泄水瀉

養生必用治大人小兒老人惠人不以冷熱河浮神方

秘名器
藥更散

黃連

去毛

白芍藥

吳茱萸

各二兩

右同煨令赤色放冷杆羅每服三錢匙水一盞煎至

六分去滓取清汁空腹食前溫服日三五服若不喜

茶人及大段嫌苦即以小麪糊丸如梧子大或煮豆

大以溫米飲或十二十九或三十五十九隨兒大小
與服之日夜五六服

同方治老人及諸虛人下痢滑泄百方治之不效者方

赤石脂別乾畫末各三兩右以麴糊和丸如梧子大每

服二十三十五十九空心食前用溫米飲服小兒小

丸自河東陝西出者真赤石脂也今自齊州所出乃

桃花石不入斷下菜馬

三聖圖生黃連南木香 吳茱萸

各等右到用銅器先炒黃連令黃色便入茱萸同

炒煙起入木香三味同炒一時間取出放冷入枯礬

石三錢都同為末，用醋麵糊丸，如棗豆大，每服十九，或二三十九，以葱米粥飲吞下。

乳香散

生先

治小兒一切浮痢

乳香

二兩半，用荷葉於炭火上炙令

銕、後、地、上、以、厚、豆、蔻、

兩、後、列、研、

乾薑

甘草

炙草

草藥子

去皮

各一

兩

各一

火內煨，令赤色，取出去麴為末，入乳香末拌和，每服半錢，或一二三錢，用陳米飯飲調服，空心食前，日夜

五七服

香蓮圓

生先

治小兒一切浮痢

木香

濕紙

甘草

炙

掾斗子

去

五味子

蓮房

呵子

皮

各等

右細末

トシクリ

皮

ハチミツ

ハチミツ

ハチミツ

ハチミツ

ハチミツ

ハチミツ

ハチミツ

ハチミツ

ハチミツ

每服半錢，或一二錢，用陳米飲調服。空心食前。

黃連圓 嬰孺方 治小兒泄痢 黃連 茯苓 黃芩

赤石脂 各一兩 枳殼 各一分 人參 一分 甘草 二分

右末，蠶九麻子大，或棗豆大，用乳汁或米飲量兒大小加減與之。二歲十九丸。

香連圓 張濟公傳 治小兒冷熱不調，作泄浮，腰痛，作痢。

木香 黃連 呵子皮 阿膠 炒焦各等分

右細末，飯為丸，如麻子大，每服二三十圓，陳米飲吞服。空心食前，忌生冷油膩麵。

茯苓圓 沈氏治小兒久新浮利，不問冷熱，分利水道。

恒靈三此散方名子
散字

白茯苓一分 黃連二兩 阿膠二兩 炒焦一分 右末以粟米
飯和丸如棗豆大粟米飲服二三十丸日三五服

洞泄下痢穀食不化冷

熱相搏腹痛下痢五色脫肛後重煩渴癰瘦全不思食

黑附子炮 甘草炙 黃連各三分 白石脂 白朮 陳皮

乾薑各二分 赤石脂 龍骨各一兩 木賊煨 荊朮各三分

右細末每服一二錢或半錢米飲調服

固腸圓王氏 溫胃進食止泄瀉 肉豆蔻炮 縮砂仁

丁香 龍骨 呵子皮炙 赤石脂等分 右細末用白麴

糊丸如棗豆大每服一二十丸飯飲服日夜三五服

比聖圓

王氏集

治小兒藏冷滑泄不止腸鳴腹痛

棗

三十五个去核

黃丹勻

訶子皮

草豆蔻

勢炮各二分

肉豆蔻

木香

分三

石末

醋麵為丸

加大麻子

每服

二三十丸米飲服日夜五服三服空心食前

二色圓

胡氏象傳

治泄瀉兼治氣癖積塊

黑圓子

巴豆

七粒

杏仁

十四粒

和皮二物

燒存性

紅圓子

巴豆

去心皮七粒

辰砂

一錢

研二物同研勻

燈上鎔蠟為膏

右二色圓各令蠟與等分用旋圓如粟豆大每服紅

黑各一圓泄瀉以新汲水服赤痢以甘草湯服白痢

以乾薑湯服赤白痢則各合煎服

和謂黑圓紅圓謂之二色巴豆杏人燒存性與蠟燭燃之火下之鎔蠟加巴豆杏人灰等分合為膏又巴豆七粒辰砂一錢與燭火鎔蠟等分合為膏共黑圓三物等分合和之紅圓三物等分合和而後黑紅二色等分和圓與服之黑圓子者在可用方第_六卷浮腫中黑牽牛子半生半炒細末以醋米糊丸如桐梧子大各黑圓子

銀白散

吉氏家傳

治小兒脾胃氣弱泄瀉不思飲食

人參

茯苓

甘草炙藿香葉

白扁豆

炒白朮

右等分末每服半錢或一二錢紫葳湯或飯湯服

炮

錢氏白朮散方

治小兒脾胃虛弱

吐瀉頻傳不止

液枯渴多

但欲飲水飲食不進

麻園之方因初失治

變成風痼不同傷陽

虛寒宜服之

人多自製此散

向來各書皆無

此散方

為麻園方服一匙

小兒服半匙

溫服不時見效

大小同服

初起者服八分

凡或吐瀉或渴

渴者皆服此散

不同傷陽而服錢

氏白朮散金匱最

足飲之不渴也

食生必用此散

參或調湯飲米

桑葉湯長沙醫者相傳治小兒泄浮虛滑頻數不止

人參 白茯苓 藿香 乾薑各等分焙

右細末每服半錢或一錢濃煎桑葉湯調服甚者不

三服大人亦可服

豈菟散長沙醫者治小兒大人泄浮右用肉豆蔻一

二箇去心入硫黃一塊在肉豆蔻內却時豆蔻心末

頭上蓋硫黃再用麴餅子裏豆蔻更用濕紙慢火內

燒熟去麴豆蔻硫黃同細末每服半錢或一二錢末

飲調服不拘時候

豈菟散長沙醫者治小兒之人濕毒冷熱不調泄浮乳

鄭愈傳

食不化、肉豆蔻仁、草果仁、艾葉五錢、藿香葉三錢、
右細末、每服一二錢、米飲調服、已上通治一切泄瀉

積熱

茅先生曰、面帶青黃、眼微黃、口渴肚膨、嘔逆、遍身潮熱、
通下臭穢、此候多因食物過度、著脾胃、

當歸散吉氏家傳治積痢、當歸、龍骨、甘草、炙、石榴皮、

黃蘗皮各一兩、子皮八錢、右細末、每服半錢、一錢、

二三錢、米飲服、或以飯丸服尤良、

翠獭方治小兒實不盡、下黃或青、大黃二錢、細辛一分、

甘草二分、黃芩三分、右細末、每服一二錢、水一小盞、煎、

半盞服日二三服夜一二服

驚瀉

第先生曰小兒有中驚瀉候面青色眼微青身微熱下
浮青紅水或如草汁

四色圖

吉氏
衆傳治小兒驚浮青囊

硫黃

赤石脂

藍葉

乾焙各
一兩

右研勻水煮黏糊

為圓如棗豆大每服五圓或七八圓十圓十五圓米
飲服空心食前

傷浮

茅先生曰肚脹腹硬身微熱嘔逆為食物所傷或噎不

消也。乳食所傷，故曰傷食。

大黃湯

千金方

治少小下痢，苦熱不食，傷飽不乳。

大黃

甘草 芍藥 麥門冬

各二兩

右以咀，每服二三錢。

水一小盞，煎至半盞，去滓溫服。

開胃圓

局方

治小兒疳積，怯弱，內受風冷，腹脇脹滿，腸鳴。

泄利，或青或白，乳食不化，又治藏冷，夜啼，胎寒腹痛，幼

新書

木香

蓬莪朮

白朮

人參

當歸

劉燾各二

分

麝香

研白芍藥

各一分

右細末，以麴糊為丸，如黍

米大，每服十五丸，或二十丸，溫米飲服，新生兒腹

痛，夜啼，乳前可與服，三五丸，或二十丸。