



新世纪高级应用型人才培养系列教材
A Practical Textbook Series for the New Century

工程数学

概率论与数理统计

主编 孟晗

副主编 马军 王健 张玉坤



同济大学出版社
Tongji University Press

新世纪高级应用型人才培养系列教
A Practical Textbook Series for the New Century

工程数学

概率论与数理统计

主编 孟 喆
副主编 马 军 王 健 张玉坤

同济大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

工程数学·概率论与数理统计/孟晗主编. —上海：
同济大学出版社, 2005. 3
(新世纪高级应用型人才培养系列教材)
ISBN 7-5608-2634-2

I. 工… II. 孟… III. ①工程数学—高等学校—
教材②概率论—高等学校—教材③数理统计—高等学校
—教材 IV. TB11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 135671 号

概率论与数理统计

主编 孟 咸 副主编 马 军 王 健 张玉坤
责任编辑 卞玉清 责任校对 郁 峰 封面设计 陈益平

出版 同济大学出版社
发行

(上海市四平路 1239 号 邮编 200092 电话 021-65985622)

经 销 全国各地新华书店
印 刷 同济大学印刷厂印刷
开 本 787mm×960mm 1/16
印 张 13.75
字 数 275000
印 数 1—10100
版 次 2005 年 3 月第 1 版 2005 年 3 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 7-5608-2634-2/TB·46
定 价 18.00 元

本书若有印装质量问题, 请向本社发行部调换

《新世纪高级应用型人才培养系列教材》编委会

名誉主任 吴启迪
主任 李国强
副主任 李进 杨焱林 董大奎
编委 (以下按姓氏笔画排列)
王国强 王文 陈波
郑朝科
总策划 郭超

前　　言

概率论与数理统计是研究随机现象中数量规律的数学学科。随着知识经济、信息时代的来临，研究随机现象的数学理论、方法及其应用愈来愈广泛，概率统计的思想方法已经渗透到了自然科学与社会科学的各个领域，并且还在继续拓广。

为了适应新世纪我国高等教育迅速发展的形势，满足新时期高等教育人才培养拓宽口径，增强适应性对数学教育的要求，我们按照教育部《高等教育面向21世纪数学内容和课程体系改革计划》和《工科类本科数学基础课程教学要求》（修订稿）的精神和要求，结合多年的研究与实践，博采众家之长，编写了本书。在编写过程中，我们在遵循本学科系统性与科学性的前提下，尽量做到内容少而精，充分体现素质教育，突出教学思想。贯彻由浅入深、循序渐进、融会贯通的教学原则与直观形象的教学方法。既注重概率统计的基础概念、基本理论和方法的阐述，又注重学生基本运算能力的训练和分析问题、解决问题能力的培养。

本书包括随机事件及其概率、随机变量及其分布，随机变量的数字特征、大数定律定律与中心极限定理等概率论基本内容和参数估计、假设检验，线性回归分析等数理统计的基本内容。每节后配有习题，既有基本练习题，也有部分综合练习题，以提高读者分析问题、解决问题的能力。书末附有习题答案。

本书可作为高等理工类院校“概率论与数理统计”课程的教材或教学参考书。

本书第一章由孟晗编写，第二章至第五章由王健编写，第六章到第九章由张玉坤编写。全书由孟晗、马军制定编写计划并负责最后统稿定稿。

由于编者水平有限，加之时间仓促，书中难免有不妥之处，错误亦在所难免，希望专家、同行和广大读者批评指正。

编者

2005年1月

目 录

第一章 随机事件及其概率	(1)	四、超几何分布	(34)
第一节 随机事件及其运算 ……	(1)	习题 2-2	(34)
一、随机试验与样本空间	(1)	第三节 随机变量的分布函数	
二、随机事件	(2)	(35)
三、事件的关系与运算	(2)	习题 2-3	(39)
习题 1-1	(5)	第四节 连续型随机变量及其	
第二节 随机事件的概率	(6)	概率密度	(40)
一、概率的统计定义	(6)	一、均匀分布	(42)
二、古典概型	(7)	二、指数分布	(43)
三、几何概率	(9)	三、正态分布	(44)
四、概率的公理化定义	(10)	习题 2-4	(48)
习题 1-2	(12)	第五节 随机变量函数的分布	
第三节 条件概率与全概率		(49)
公式	(13)	习题 2-5	(52)
一、条件概率与乘法公式	(13)	第三章 多维随机变量及其分布	
二、全概率公式与贝叶斯(Bayes)		(54)
公式	(16)	第一节 多维随机变量	(54)
习题 1-3	(19)	习题 3-1	(60)
第四节 随机事件的独立性		第二节 边缘分布	(61)
.....	(19)	习题 3-2	(65)
习题 1-4	(23)	第三节 条件分布	(66)
第五节 伯努利概型	(23)	习题 3-3	(72)
习题 1-5	(25)	第四节 随机变量的独立性	
第二章 随机变量及其分布	(27)	(73)
第一节 随机变量	(27)	习题 3-4	(77)
第二节 离散型随机变量及其		第五节 多维随机变量函数的	
概率分布	(28)	分布	(77)
一、两点分布(或称 0-1 分布) ……	(29)	一、和的分布	(77)
二、二项分布	(30)	二、最大值与最小值的分布	(82)
三、泊松分布	(32)	三、来自正态总体的三个分布 ……	(84)

习题 3-5	(87)	第二节 正态总体参数的区间 估计	(145)
第四章 随机变量的数字特征		一、正态总体期望 μ 的区间估计	(145)
	(90)	二、正态总体方差的区间估计	(148)
第一节 数学期望	(90)	三、两个正态总体期望差的 区间估计	(150)
习题 4-1	(97)	四、两个正态总体方差比的 区间估计	(152)
第二节 方差	(98)	五、单侧置信区间	(154)
习题 4-2	(103)	习题 7-2	(156)
第三节 协方差及相关系数	(104)	第八章 假设检验	(158)
习题 4-3	(108)	第一节 假设检验的基本概念	
第四节 随机变量的其他数字 特征	(109)		(158)
习题 4-4	(114)	第二节 单个正态总体参数的 假设检验	
第五章 大数定律与中心极限 定理	(115)	一、关于正态总体期望的假设 检验	(161)
第一节 大数定律	(115)	二、关于正态总体方差 σ^2 的 假设检验	(162)
习题 5-1	(118)	习题 8-2	(164)
第二节 中心极限定理	(118)	第三节 两个正态总体参数 的假设检验	
习题 5-2	(125)	一、关于两个正态总体期望值 相等的假设检验	(164)
第六章 数理统计的基本思想	(126)	二、关于两个正态总体方差相等 的假设检验	(165)
第一节 总体与样本	(126)	习题 8-3	(167)
一、总体与样本	(126)	第四节 单边假设检验	
二、经验分布函数和直方图	(127)	一、单个正态总体期望的单边 检验	(169)
习题 6-1	(129)	二、单个正态总体方差的单边 检验	(170)
第二节 统计量及其分布	(130)	习题 8-4	(173)
一、常用统计量	(130)	第九章 一元线性回归分析和 方差分析	
二、统计量的分布	(131)		(174)
三、次序统计量	(134)		
习题 6-2	(135)		
第七章 参数估计	(136)		
第一节 参数的点估计	(136)		
一、矩法估计	(136)		
二、极大似然估计	(137)		
三、评价估计量好坏的标准	(142)		
习题 7-1	(144)		

第一节 一元线性回归分析	习题 9-1	(185)
.....	习题答案	(187)
一、一元线性回归	附表一 泊松分布表	(198)
二、回归方程的显著性检验	附表二 正态分布表	(201)
三、一元线性回归方程的预测	附表三 χ^2 分布表	(203)
.....	附表四 t 分布表	(205)
第二节 可线性化的回归方程	附表五 p 值表	(207)
.....		
第三节 单因素方差分析	...	(181)

第一章 随机事件及其概率

在自然界和人类社会中,人们所能观察到的现象是多种多样的.但归纳起来,它们大体上可以分为两类:一类是确定性现象,另一类是随机现象.

确定性现象是在一定条件下必然发生的.例如在标准大气压下把水加热到 100°C 时必然会沸腾;向上抛一石子必然下落,等等.随机现象是在一定的条件下可能发生也可能不发生,或者说,可能出现这样的结果也可能出现那样的结果.例如,在相同条件下抛掷同一枚硬币,其结果可能是正面朝上,也可能是反面朝上,并且在每次抛掷之前无法肯定抛掷的结果;从含有不合格品的一批产品中任意抽取一件检验,检验结果可能是合格品,也可能是不合格品,事先无法准确地预言.通过大量试验,我们知道,大量重复抛掷同一枚硬币时,正面朝上的次数约占抛掷总数的一半.这类在个别试验中呈现出不确定的结果,而在相同条件下进行大量重复的试验,试验结果呈现出的规律性称为统计规律性.概率论与数理统计就是研究随机现象统计规律性的一门数学学科,它在自然科学、工程技术和社会科学的许多领域有着重要的应用.

第一节 随机事件及其运算

一、随机试验与样本空间

为了确定随机现象的规律性,需要进行多次的试验、调查或观察,我们把这些工作统称为试验.一个试验如果满足下述条件:

- 1) 试验可以在相同条件下重复进行;
- 2) 试验的所有可能结果是明确可知道的,并且不止一个;
- 3) 每次试验之前,不能判定哪一个结果将会出现,就称这样的试验是一个随机试验.为简单起见,也简称为试验.

例如,掷一粒骰子,观察出现的点数;记录某电话总机在一小时内收到的呼喚次数;观测电视机的使用寿命;等等,都是随机试验.随机试验一般用 E 表示.

随机试验 E 的每一个可能结果,称为基本事件,或称为样本点.因为随机试验的所有结果是明确的,从而所有基本事件也是明确的.所有基本事件组成的集合称为试验 E 的样本空间,记为 Ω .样本点用 ω 表示.

例 1 掷一粒骰子,观察出现的点数,基本事件有 6 个:出现 1 点,出现 2

点,……,出现 6 点,则样本空间 $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}$.

例 2 掷两枚硬币,观察正面与反面出现的情况. 其样本空间 $\Omega = \{(正, 正), (正, 反), (反, 正), (反, 反)\}$. 这里, 比如样本点 $\omega = (正, 反)$ 表示第一枚硬币抛出正面而第二枚抛出反面.

例 3 记录某电话总机在一小时内收到的呼唤次数,其样本点是非负整数. 当然,我们可以根据实际情况为电话呼唤次数确定一个上界 N . 但是今后会看到,人们宁愿不确定这个 N ,而假设呼唤次数可以是任何非负整数,即认为 $\Omega = \{0, 1, 2, \dots\}$.

例 4 在一批电视机中任意抽取一台,测试其寿命,用 t 表示电视机的使用寿命,则 $\Omega = \{t: t \geq 0\}$.

我们指出,样本空间是研究随机现象的数学模型. 正确地确定不同随机试验的样本点与样本空间是极为重要的. 比如例 2 已给出抛掷两枚硬币观察其正、反面出现情况的样本空间,如果我们只关心两枚硬币出现正面的个数,则样本空间应改为 $\Omega = \{0, 1, 2\}$.

二、随机事件

我们时常会关心试验的某一部分可能结果是否出现,从而引出随机事件的概念. 我们称随机试验 E 的样本空间 Ω 中的子集为 E 的随机事件,简称为事件,常用大写英文字母 A, B, C, \dots 表示. 例如,在例 1 中, $A = \{\text{点数为偶数}\} = \{2, 4, 6\}$, $B = \{\text{点数} \geq 3\} = \{3, 4, 5, 6\}$ 都是随机事件; 在例 3 中, $A = \{\text{至多 4 次呼唤}\} = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{\text{至少两次呼唤}\} = \{2, 4, \dots\}$ 也都是随机事件. 基本事件是最简单的随机事件. 而一般的随机事件是由若干个基本事件组成的,称为复合事件.

由于样本空间 Ω 包含了全部可能结果,因此在每次试验中, Ω 都会发生,故称 Ω 为必然事件. 相反,空集 \emptyset 不含任何样本点,每次试验必定不发生,故称 \emptyset 为不可能事件. 这是随机事件中的两个极端情况. 严格来说,这两种事件不是随机事件,但为了讨论方便,我们还是把它们作为随机事件的特殊情形来统一处理.

三、事件的关系与运算

在同一随机试验中,一般含有多个随机事件. 由于它们共处于同一试验之




图 1-1

中,因而是相互联系着的. 我们有必要弄清它们之间的关系,并引进事件间的运算,以便化复杂事件为简单事件,更好地解决相应的概率问题.

(1) 包含与相等 若事件 A 发生必然导致事件 B 发生,则称事件 B 包含事件 A ,或称事件 A

包含于事件 B 中, 记为 $B \supset A$ 或 $A \subset B$. 如图 1-1 所示.

显然, 对任何事件 A , 有 $\Omega \supset A \supset \emptyset$.

如果 $A \subset B$, 且 $B \subset A$, 则称事件 A 与事件 B 相等, 记为 $A=B$.

例如, 在例 1 中, 若 $A=\{\text{出现 } 2 \text{ 点}\}$, $B=\{\text{出现偶数点}\}$, $C=\{\text{出现 } 2 \text{ 或 } 4 \text{ 或 } 6 \text{ 点}\}$, 则 $A \subset B$, $B=C$.

(2) 事件的并 事件 A 与事件 B 至少有一个发生这样一个事件称为事件 A 与事件 B 的并事件(或和事件), 记为 $A \cup B$, 如图 1-2 所示. 例如, 在例 1 中, $A=\{\text{出现偶数点}\}$, $B=\{\text{点数} \geq 4\}$, 则

$$A \cup B = \{2, 4, 5, 6\}.$$

类似地, n 个事件 A_1, \dots, A_n 的并事件 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ 表示“ A_1, A_2, \dots, A_n 中至少有一个发生.”

(3) 事件的交 事件 A 与事件 B 同时发生这一事件称为事件 A 与事件 B 的交事件(或积事件), 记为 AB (或 $A \cap B$). 如图 1-3 所示. 如在例 1 中, 若 A, B 同上, 则

$$AB = \{4, 6\},$$

类似地, n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n 的交事件 $A_1 A_2 \dots A_n$ 表示“ A_1, A_2, \dots, A_n 同时发生”.

(4) 事件的差 事件 A 发生而事件 B 不发生这一事件称为事件 A 与事件 B 的差事件, 记为 $A - B$. 如图 1-4 中阴影部分所示. 如在例 1 中, 若 A, B 同上, 则

$$A - B = \{2\}$$

(5) 互不相容事件 若事件 A 与事件 B 不能同时发生, 即 $AB = \emptyset$, 则称事件 A 与 B 为互不相容事件(或称为互斥事件). 如图 1-5 所示. 例如, 在例 1 中, 若 $A=\{\text{点数为偶数}\}$, $B=\{\text{点数为 } 3\}$, 则 A 与 B 为互不相容事件.

一般地, 对于 n 个事件 A_1, A_2, \dots, A_n , 若它们之间两两互不相容, 则称这 n 个事件是互不相容的. 这时, $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ 通常记为 $A_1 + A_2 + \dots + A_n$.

(6) 对立事件 若 A 是一事件, 令 $\bar{A} = \Omega - A$, 称 \bar{A} 是 A 的对立事件(或逆事件). 易知, 在一次试验中, A 与 \bar{A} 二者只能发生其中之一, 并且也必然发生其中之一. 因而有




图 1-2




图 1-3




图 1-4




图 1-5




图 1-6

$$A \bar{A} = \emptyset, \quad A \cup \bar{A} = \Omega$$

=

此外, 显然有 $A = A$. 如图 1-6 所示.

值得注意的是, 若事件 A 与 B 对立, 则事件 A 与 B 互不相容, 反之不然.

如在例 1 中, 若 $A = \{\text{点数为偶数}\}$, 则 $\bar{A} = \{\text{点数为奇数}\}$.

容易看出, 事件间的关系和运算与集合论中集合同间的关系和运算之间是完全可以互相类比的. 集合论中常用的运算规律同样适用于事件的运算.

$$(1) \text{ 交换律} \quad A \cup B = B \cup A,$$

$$A \cap B = B \cap A;$$

$$(2) \text{ 结合律} \quad (A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C),$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C);$$

$$(3) \text{ 分配律} \quad A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C),$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C);$$

$$(4) \text{ De Morgan 定理(对偶原则)}$$

$$\overline{A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n} = \bar{A}_1 \cap \bar{A}_2 \cap \dots \cap \bar{A}_n,$$

$$\overline{A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n} = \bar{A}_1 \cup \bar{A}_2 \cup \dots \cup \bar{A}_n.$$

例 5 设 A, B, C 为三个事件, 用 A, B, C 及其运算表示下列事件:

(1) A 发生, B 与 C 不发生;

(2) A 与 B 都发生, 而 C 不发生;

(3) A, B, C 中至少有一个发生;

(4) A, B, C 都发生;

(5) A, B, C 都不发生;

(6) A, B, C 中不多于一个发生;

(7) A, B, C 中不多于两个发生;

(8) A, B, C 中至少有两个发生.

解 (1) A 发生, B 与 C 不发生, 表示 A, \bar{B}, \bar{C} 同时发生, 故该事件可表示为 $A\bar{B}\bar{C}$ 或 $A - B - C$.

(2) A 与 B 都发生而 C 不发生, 表示 A, B, \bar{C} 同时发生, 故该事件可表示为 $AB\bar{C}$ 或 $AB - C$.

(3) 该事件为 $A \cup B \cup C$.

(4) 该事件为 ABC .

(5) 该事件为 $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$.

(6) 该事件为 $\bar{A}\bar{B}\bar{C} \cup A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C \cup \bar{A}B\bar{C}$ 或 $\bar{A}\bar{B} \cup \bar{B}\bar{C} \cup \bar{C}\bar{A}$ 或

$$\overline{AB} \cup BC \cup CA = \overline{AB} \cap \overline{BC} \cap \overline{CA}.$$

(7) 该事件为 $\overline{ABC} \cup A\overline{B}\overline{C} \cup \overline{A}\overline{B}C \cup \overline{A}\overline{B}\overline{C} \cup A\overline{B}C \cup A\overline{B}\overline{C} \cup \overline{ABC}$ 或 $\overline{A} \cup \overline{B} \cup \overline{C}$ 或 \overline{ABC} .

(8) 该事件为 $AB \cup BC \cup CA$ 或 $ABC \cup \overline{ABC} \cup A\overline{B}C \cup A\overline{B}\overline{C}$.

习 题 1-1

1. 写出下列随机试验的样本空间 Ω :

(1) 袋中有 3 个红球和 2 个白球, 现从袋中任取一个球, 观察其颜色;

(2) 掷一次硬币, 设 H 表示“出现正面”, T 表示“出现反面”. 现将一枚硬币连掷两次, 观察出现正、反面的情况, 并用样本点表示事件 $A=\{\text{恰有一次出现正面}\}$;

(3) 对某一目标进行射击, 直到击中目标为止, 观察其射击次数, 并用样本点表示事件 $A=\{\text{射击次数不超过 5 次}\}$;

(4) 生产某产品直到 5 件正品为止, 观察记录生产该产品的总件数;

(5) 由编号为 a, b, c, d 四人中, 选出正式和列席代表各一人去参加会议, 观察选举结果, 并用样本点表示事件 $A=\{\text{编号为 } a \text{ 的人当选}\}$.

2. 设某试验的样本空间 $\Omega=\{1, 2, \dots, 10\}$, 事件 $A=\{3, 4, 5\}$, $B=\{4, 5, 6\}$, $C=\{6, 7, 8\}$, 试用相应的样本点表示下列事件:

(1) $A\bar{B}$; (2) $\bar{A} \cup B$; (3) \overline{ABC} ; (4) $\overline{A(B \cup C)}$.

3. 某人向一目标连续射击 3 枪, 设 $A_i=\{\text{第 } i \text{ 枪击中目标}\}$, $i=1, 2, 3$. 试用事件 A_1, A_2, A_3 及事件的运算表示下列各事件:

(1) $A=\{\text{只有第一枪击中目标}\}$; (2) $B=\{\text{只有一枪击中目标}\}$;

(3) $C=\{\text{至少有一枪击中目标}\}$; (4) $D=\{\text{最多有一枪击中目标}\}$;

(5) $F=\{\text{第一枪、第三枪中至少有一枪击中目标}\}$.

4. 设 $\Omega=\{x | 0 \leq x < 2\}$, $A=\{x | \frac{1}{2} < x < 1\}$, $B=\{x | \frac{1}{4} \leq x < \frac{3}{2}\}$, 求 $\overline{A \cup B}, AB, \bar{A} \cup B$.

5. 写出下列试验的样本空间 Ω :

(1) 同时掷三颗骰子, 观察并记录三颗骰子点数之和;

(2) 设有 A, B, C 三个盒子, a, b, c 三个球. 试将这三个球随机装入三个盒子, 使每个盒子各有一个球, 观察装球情况;

(3) 测量一汽车通过给定点的速度.

6. 用排列或组合方法, 计算下列随机试验的样本空间的样本点的总数:

(1) 观察三粒种子发芽情况;

(2) 从 30 名学生中任选 2 人参加某项活动, 观察选举情况;

(3) 将 a, b 两个球放入三个不同的盒子中(每个盒子容纳的球数不限), 观察装球情况.

7. 证明

(1) $AB \cup (A-B) \cup \bar{A} = \Omega$

(2) $(A \cup B)(A \cup \bar{B})(\bar{A} \cup B) = AB$

第二节 随机事件的概率

在实际问题中,常常需要对随机事件发生的可能性大小进行定量描述,而“概率”的概念正是源于这种需要而产生的.

一、概率的统计定义

定义 1 设在相同条件下,进行了 n 次试验,在这 n 次试验中,事件 A 出现了 m 次,则称

$$f_n(A) = \frac{m}{n} = \frac{\text{事件 } A \text{ 出现的次数}}{\text{试验的总次数}}$$

为随机事件 A 在 n 次试验中出现的频率, m 称为频数.

由频率的定义,易知频率有下述性质:

性质 1 $0 \leq f_n(A) \leq 1$;

性质 2 $f_n(\Omega) = 1$ ($f_n(\emptyset) = 0$);

性质 3 若 A_1, A_2 是互不相容的事件,则

$$f_n(A_1 \cup A_2) = f_n(A_1) + f_n(A_2).$$

事件的频率刻画了事件发生的频繁程度,由定义看出,频率越大,事件 A 发生越频繁,因而在一次试验中发生的可能性越大.因此自然想到用事件 A 的频率表示 A 在一次试验中发生的可能性的大小.但频率是随试验的具体结果而定的,一般不是确定的值.

实践中,人们发现当试验次数 n 较大时,频率 $f_n(A)$ 总在某一个常数 p 附近波动.这一性质称为频率的稳定性.下面的例子说明了这一点.

例 1 掷一枚质地均匀的硬币,出现正面与反面的机会是相等的,即在大量重复试验中,出现正面的频率应接近 0.5.历史上曾有几位数学家做过该试验,结果见表 1-1.

表 1-1

试验者	掷硬币次数	正面朝上次数	频率
蒲 丰	4040	2048	0.5069
费 勒	10000	4979	0.4979
皮尔逊	12000	6019	0.5016
皮尔逊	24000	12012	0.5005

上述事实表明：尽管在某一次试验中可能出现这种结果，也可能出现那种结查，但在大量试验中，只要试验条件相同，观察到的频率就基本上一致。这说明随机事件在大量试验中存在着一种客观规律性，而频率稳定性正是这种规律性的表现。

定义 2 (概率的统计定义) 在大量重复试验中，若事件 A 发生的频率稳定地在某一常数 p 附近摆动，则称该常数 p 为事件 A 发生的概率，记为 $P(A)$ ，即 $P(A)=p$ 。

应该指出，频率是变动的，而概率则为常数。当试验次数足够多时，频率相对稳定，可把频率作为概率的近似值，即 $f_n(A) \approx P(A)$ 。我们平常说的产品的合格率，彩票的中奖率，药物治疗某疾病的有效率都是指频率。

二、古典概型

具有以下特征的随机试验模型，称为古典概型：

- (1) 试验的样本空间只有有限个样本点；
- (2) 试验中每个样本点出现的可能性相同。

古典概型也叫做等可能概型。在概率论的产生和发展过程中，它最早且最常用到的一种概率模型。

定义 3(概率的古典定义) 设随机试验 E 为古典概型，它的样本空间 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ ，事件 A 由 m 个样本点组成，则事件 A 的概率为

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{A \text{ 中的样本点数}}{\Omega \text{ 中样本点数}}$$

例 2 将一枚硬币抛掷三次。

- (1) 设事件 A 为“恰有一次出现正面”，求 $P(A)$ 。
- (2) 设事件 B 为“至少有一次出现正面”，求 $P(B)$ 。

解 用 H 表示出现正面， T 表示出现反面。那么，样本空间 $\Omega = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH, TTT\}$ 。

$$(1) A = \{HTT, THT, TTH\}, \text{故 } P(A) = \frac{3}{8}.$$

$$(2) B = \{HHH, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH\}, \text{故 } P(B) = \frac{7}{8}.$$

例 3 设袋中有外型相同的 10 个球(其中包括 6 个红球，4 个白球)。现从中随机地抽取 3 个，求

- (1) 取出的 3 个球都是红球的概率；
- (2) 取出的 3 个球恰有一个是白球的概率。

解 所谓“随机地抽取”是指待抽取的对象中的每一个被抽到的可能性相

同,故是古典概型.

本例中样本点总数为 $n = C_{10}^3$.

(1) 设 $A = \{\text{取出的 3 个球都是红球}\}$. 事件 A 包含的样本点数 $m = C_6^3$, 故

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{C_6^3}{C_{10}^3} = \frac{1}{6}.$$

(2) 设 $B = \{\text{取出的 3 个球中恰有一个是白球}\}$, 事件 B 包含的样本点数 $m = C_4^1 C_6^2$, 故

$$P(B) = \frac{m}{n} = \frac{C_4^1 C_6^2}{C_{10}^3} = \frac{1}{2}.$$

例 4 设袋中有 a 个红球与 b 个黑球, 现任意不放回地一一摸出, 求事件 $A_k = \{\text{第 } k \text{ 次摸出红球}\}$ 的概率.

解法 1 视同色球是可辨的, 可理解球不仅着了色, 还编上不同的号码. 于是, 样本点是这 $(a+b)$ 个球的全排列. 样本点总数为 $(a+b)!$ 摸球的任意性保证各样本点等可能, 故是古典概型. 为计算 A_k 中所含样本点数, 我们分解它为两个串行的过程: 先从 a 个红球中选一个放在第 k 个位置上, 共有 a 种选法. 再将其余 $a+b-1$ 个球在其余位置上任意排列, 有 $(a+b-1)!$ 种方式. 由乘法原理, A_k 所含样本点数为 $a(a+b-1)!$, 故

$$P(A_k) = \frac{a}{a+b}.$$

解法 2 视同色球不可辨. 此时, 样本点取决于这 $(a+b)$ 个位置中哪 a 个放红球, 共有 C_{a+b}^a 个样本点, 而 A_k 要求第 k 个位置必须是红球, 于是只需从 $(a+b-1)$ 个位置中选 $(a-1)$ 个放其余的红球, 即 A_k 中含样本点数为 C_{a+b-1}^{a-1} , 故

$$P(A_k) = \frac{a}{a+b}.$$

两种解法所得结果相同, 都与 k 无关. 这证明抽签是公平的: 如果 $a+b$ 个人将有 a 个人中签, 那么, 无论是先抽还是后抽, 即无论 $k=1, 2, \dots, a+b$, 每个人中签的概率均为 $\frac{a}{a+b}$, 与抽签次序无关.

例 5 一批产品有 N 件, 其中有 M 件次品, 现从中随机地抽取 n 件产品 ($n \leq N, M < N$). 求恰好取到 k 件次品的概率 ($k=0, 1, 2, \dots, l, l=\min\{n, M\}$)

解 试验是从 N 件产品中随机地抽取 n 件, 共有 C_N^n 种不同的取法, 即样本点总数为 C_N^n . 设 $A = \{\text{恰好取到 } k \text{ 件次品}\}$. 则 A 所含样本点数为 $C_M^k C_{N-M}^{n-k}$. 故

$$P(A) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}.$$

上述公式是产品计件抽样检查常用的公式之一.

三、几何概率

我们继续考察样本点的出现有等可能性的随机试验,但不是如古典概型那样局限于有限多个样本点的情形.有时,虽然试验的可能结果是无限多的,但由试验的任意性或对称性,各样本点出现的机会仍然相等,只是这时不能简单地通过样本点的计数来计算概率.

假定在盛有 1 升水的容器中有一个任意游动的细菌.现从容器中任取出 10 毫升的水样,由于细菌运动与取水的任意性,10 毫升水样中含有这个细菌的概率应为百分之一,即等于水样的体积与水的总体积之比.

有如这样的例子还有很多,它们的共同特点是通过空间集合的几何度量(体积、面积、长度等)来计算概率.

定义 4 如果试验的可能结果可以几何地表示为某区域 Ω 中的一个点(Ω 可以是一维的,二维的,三维的,……),并且点落在 Ω 中某区域 A 的概率与 A 的测度(长度、面积、体积等)成正比,而与 A 的位置和形状无关,则点落在区域 A 的概率为

$$P(A) = \frac{A \text{ 的测度}}{\Omega \text{ 的测度}} = \frac{mA}{m\Omega}$$

称上述定义中的概率为几何概率.

例 6 在线段 $[0,3]$ 上任投一点,求此点坐标小于 1 的概率.

解 当且仅当点落在区间 $[0,1)$ 内时,此点的坐标小于 1. 故由几何概率的定义立即可得所求概率:

$$p = \frac{m[0,1)}{m[0,3]} = \frac{1}{3}.$$

例 7 两人相约于早晨 8 时至 9 时之间在某地会面,并约定先到者等候另一人 30 分钟后就可离开.求两人能见面的概率.

解 设 x, y 分别表示两人到达某地的时刻(单位:分),由于两人在 8 时到 9 时之间到达是随机的,故 x, y 都等可能地在 $[0,60]$ 上取值,点 (x, y) 就是平面区域 $\Omega = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 60, 0 \leq y \leq 60\}$ 上等可能的随机点. 设 $A = \{\text{两人能够会面}\}$, 依题意,事件 A 发生的充要条件是 $|x - y| \leq 30$, 即随机点落在区域

$$A = \{(x, y) | |x - y| \leq 30\}$$

上,如图 1-7 所示. 故