

QUANGUO WEISHENG ZHUANYE JISHU ZIGE KAOSHI CONGSU

全国卫生专业技术资格考试丛书

执业护士 考试宝典

ZHIYE HUSHI
KAOSHI BAODIAN

主编 兰 涛

最新



本书附带光盘
是专门为参加执
业考试的朋友量身
定做的自我测试系统

■ 上海交通大学出版社

中国医学出版社

执业护士 考试宝典

2008年11月 第1版
16开 320页 320千字 32.00元

中国医学出版社



ISBN 7-5066-5777-7

全国卫生专业技术资格考试丛书

执业护士考试宝典

主编：兰 涛

编者：兰金明 陈瑞珍 宋杏枝 童凤姣
韦燕波 黄兰兰 韦 理 苏 兰

上海交通大学出版社

内 容 提 要

本书是参加执业护士资格考试的复习参考书。全书由“精选习题”和“历年真题选编”两部分组成。“精选习题”严格按照考试大纲要求的知识点编写,内容包括基础护理学,内科护理学,外科护理学,妇产科护理学,儿科护理学,心理学基础、法律法规、伦理原则等。“历年真题选编”包括近年来的考试试题选编及参考答案。

本书附带的光盘是医药考试网 <http://www.ksbao.com> 专门为参加执业考试的朋友量身定做的自我测试系统,含有模拟考场、智能评分、错题重做、精华试题、智能查询、解题思路等功能,人机互动,可以迅速提高考生的解题能力,掌握解题技巧,从而达到事半功倍的效果。医药考试网对购买本书的考生提供全套免费的后续支持服务,并向考生提供最新的考试信息。

图书在版编目(CIP)数据

执业护士考试宝典/兰涛主编. —上海:上海交通大学出版社,2005
(全国卫生专业技术资格考试丛书)
ISBN 7-313-04043-1

I. 执… II. 兰… III. 护理学—资格考核—自学参考资料 IV. R47

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2005)第 056697 号

执业护士考试宝典

兰 涛 主 编

上海交通大学出版社出版发行

(上海市番禺路 877 号 邮政编码 200030)

电话:64071208 出版人:张天蔚

常熟市华通印刷有限公司印刷 全国新华书店经销

开本:787mm×1092mm 1/16 印张:13.75 字数:315 千字

2005 年 7 月第 1 版 2005 年 7 月第 1 次印刷

印数:1~4050

ISBN 7-313-04043-1/R·039 定价(含光盘):30.00 元

版权所有 侵权必究

前 言

本书以最新国家执业护士资格考试《考试大纲》为依据,以国家医学考试中心编写的《应试指南》为基础,组织数十名熟悉国家执业护士资格考试的资深专家编写而成,适用于申请执业护士资格考试的考生复习应试,亦适用于各大医院对护士的考核等。

本书附带的光盘是医药考试网 <http://www.ksbao.com> 专门为参加执业考试的朋友量身定做的自我测试系统,含有模拟考场、智能评分、错题重做、精华试题、智能查询、解题思路等功能。人机互动,可以迅速提高考生的解题能力,掌握解题技巧,从而达到事半功倍的效果。医药考试网对购买本书的考生提供全套免费的后续支持服务,并向考生提供最新的考试信息。

本书章节根据考试各科目内容,分为“精选习题”、“历年真题选编”两部分。题型根据考试要求,采用 A1、A2、A3 三种题型,其中 A1 型题:每一道考题下面有 A、B、C、D 或 E 等备选答案,从中选择一个最佳答案。A2 型题:每一道考题以一个小案例出现,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案,从中选择一个最佳答案。A3 型题:每个案例下设若干道考题,每一道考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案,从中选择一个最佳答案。。

广大考生可根据本书习题进行练习,熟悉题型,了解考试的范围及深度。试题内容严格按考试大纲的范围和深度编写,顺序按大纲考试科目内容的顺序编排,并附有参考答案,保持了复习的系统性和完整性。本书针对性强,重点突出,使应试者在一定的复习基础上,有的放矢地进行考前自测训练,熟悉考试的全部知识及题型,在有限的时间内,帮助考生顺利通过执业护士资格考试。

本书的编写,参考了近年来出版的有关图书,在此表示衷心感谢。

我们真诚欢迎广大读者对于我们的工作提出自己的意见和要求。祝阅读本书的读者通过努力取得优异成绩,成为合格的执业护士!

本书编写组

2005 年 5 月



目 录

第一篇 精选习题

第1章 基础护理学	3
A1型题	3
A2型题	15
A3型题	18
第2章 内科护理学	21
A1型题	21
A2型题	32
A3型题	37
第3章 外科护理学	39
A1型题	39
A2型题	50
A3型题	54
第4章 妇产科护理学	56
A1型题	56
A2型题	64
A3型题	67
第5章 儿科护理学	68
A1型题	68
A2型题	74
A3型题	77
第6章 心理学基础、法律法规、伦理原则	79
A1型题	79
A2型题	83
A3型题	85

第二篇 历年真题选编

第1章 基础护理学	89
A1型题	89
A2型题	112
A3型题	118
第2章 内科护理学	121
A1型题	121
A2型题	138
A3型题	145
第3章 外科护理学	149
A1型题	149
A2型题	165
A3型题	171
第4章 妇产科护理学	175
A1型题	175
A2型题	186
A3型题	189
第5章 儿科护理学	192
A1型题	192
A2型题	203
A3型题	207
第6章 心理学基础、法律法规、伦理原则	210
A1型题	210
A2型题	211
参考文献	212

第一篇

精选习题





第1章 基础护理学



A1 型题

每一道考试题下面有 A、B、C、D 或 E 等备选答案,请从中选择一个最佳答案。

1. 输液发生空气栓塞时是因为空气栓子堵塞于
 - A. 主动脉
 - B. 肺动脉入口
 - C. 左心室
 - D. 右心室
2. 濒死期病人心理反应的第二阶段为
 - A. 接受期
 - B. 协议期
 - C. 抑郁期
 - D. 愤怒期
3. 胃切除术后患者取半坐卧位的目的是
 - A. 减少局部出血
 - B. 使静脉回流减少
 - C. 减轻肺部淤血
 - D. 减少炎症的扩散和毒素吸收
 - E. 减轻伤口缝合处的张力
4. 缺氧时,突出的临床表现是
 - A. 皮肤湿冷、尿量减少
 - B. 面色苍白、脉搏洪大
 - C. 辗转反侧、呻吟不止
 - D. 烦躁不安、发绀明显
 - E. 头晕眼花、血压下降
5. 沐浴的目的不包括
 - A. 去除皮肤污垢
 - B. 消除皮肤炎症
 - C. 促进血液循环
 - D. 预防褥疮发生
6. 褥疮淤血红润期的表现是
 - A. 局部红肿、触痛
 - B. 受压皮肤呈紫红色
 - C. 有水泡形成
 - D. 浅层组织感染
7. 下列哪项不符合要素饮食的特点
 - A. 由各种营养素天然合成
 - B. 勿需消化液也能被吸收
 - C. 有利于纠正负氮平衡
 - D. 适用于胃肠道痿、急性胰腺炎等患者
 - E. 符合正常生理营养需要
8. 无菌盘铺好后,有效期为
 - A. 4h
 - B. 8h
 - C. 24h
 - D. 7d
9. 使用氧气,正确的是
 - A. 氧气筒距火炉 1m
 - B. 调节流量后再插管
 - C. 停用时先关闭氧气开关
 - D. 吸氧导管每周更换 1~2 次
 - E. 氧气筒氧气用尽后挂“空”标志
10. 所谓患者的一般情况,不包括
 - A. 发育、营养

- B. 表情、面容
- C. 姿势、体位
- D. 饮食、睡眠
- E. 药物反应

11. 下列不属一级护理的是

- A. 高热患者
- B. 瘫痪患者
- C. 昏迷患者
- D. 休克患者
- E. 病情较重,生活不能完全自理者

12. 用2%碘酊消毒皮肤,擦拭后多少时间再脱碘

- A. 5s
- B. 10s
- C. 15s
- D. 20s

13. 正常成人 24h 排尿量一般为

- A. 800mL
- B. 1500mL
- C. 2500mL
- D. 2800mL
- E. 3500mL

14. 超声雾化吸入后,不需消毒的物品是

- A. 雾化罐
- B. 水槽
- C. 面罩
- D. 螺纹管

15. 不属于医嘱内容的是

- A. 给药途径
- B. 护理级别
- C. 隔离种类
- D. 药物剂量
- E. 测生命体征的方法

16. 不符合铺床时的节力原理是

- A. 将用物备齐
- B. 按使用顺序放置
- C. 铺床时身体保持一定的弯度
- D. 身体靠近床边
- E. 两腿前后或左右分开,稍屈膝

17. 使用约束带时应重点观察

- A. 衬垫是否垫好
- B. 局部皮肤颜色及皮肤温度有无变化
- C. 约束带是否扎紧
- D. 神志是否清楚
- E. 卧位是否舒适

18. 执行保护性隔离,下述不正确的是

- A. 医护人员必须清洗双手,戴好口罩,帽子
- B. 穿隔离衣时,注意衣服内面是清洁面,外面为污染面
- C. 病室每日用紫外线消毒 2 次,每次 30min
- D. 保护性隔离适合脏器移植患者
- E. 每日用 0.1% 新洁尔灭液擦桌子、椅子和地面

19. 使用人工呼吸器,吸呼时比应为

- A. 1 : 0.5~1
- B. 1 : 0.5~2
- C. 1 : 1.0~3
- D. 1 : 1.5~2
- E. 1 : 1.5~3

20. 颅脑损伤病人用冷疗的主要目的是

- A. 预防脑水肿
- B. 低温麻醉
- C. 减轻疼痛
- D. 控制脑损伤的发展

21. 下列护理操作,嘱患者不必漱口的是

- A. 氧气雾化吸入前
- B. 服酸类药物后
- C. 洗胃后
- D. 采咽拭子标本前
- E. 采痰常规标本前

22. 下列注射法进针角度哪项是错误的

- A. 皮内(ID)→呈 5°
- B. 皮下(H)→呈 30°~40°
- C. 肌肉(IM)→呈 90°
- D. 静脉(IV)→呈 30°
- E. 股静脉→呈 90°



23. 插胃管时,病人出现呛咳、发绀,护士应
- 立即拔出胃管
 - 嘱患者做深呼吸
 - 嘱患者做吞咽动作
 - 稍停片刻再插
24. 整体护理的核心思想是
- 以患者为中心
 - 以护士为中心
 - 以疾病为中心
 - 以护理为中心
 - 以病室管理为中心
25. 紫外线消毒空气的有效距离和时间为
- 25~60cm 5~10min
 - 45~70cm 15~20min
 - 25~60cm 25~30min
 - 1~2m 30~60min
 - 3m 30~60min
26. 对无菌注射器及针头,下列哪个可用手触及
- 针头、空筒
 - 针梗、活塞
 - 针梗、活塞轴
 - 针栓、乳头
 - 针栓、活塞柄
27. 氧气雾化吸入,氧气流量宜用
- 1~2L/min
 - 6~10L/min
 - 3~4L/min
 - 4~5L/min
28. 为保持病区安静,声音不宜超过
- 10dB
 - 20dB
 - 30dB
 - 40dB
 - 50~60dB
29. 对浸泡消毒的物品,不正确的做法是
- 对浸泡前物品应洗净擦干
 - 有轴节的必须打开,全浸于液面下
 - 取出浸泡消毒的物品,立即使用
 - 挥发性浸泡液应加盖
 - 有空腔的物品,先将消毒液注入腔内
30. 护士与患者交谈前应作准备,但以下哪项是不需要的
- 了解患者一般情况
 - 确定交谈目的
 - 选择交谈环境
 - 选择交谈时间
 - 记录患者的治疗护理要点
31. 为昏迷患者插鼻饲管至15cm时要将头部托起,其目的是
- 以免损伤食管
 - 减轻患者的痛苦
 - 加大咽喉部通道的弧度
 - 立即拔出胃管重插
 - 稍停片刻继续插
32. 人类最常用和最重要的交流工具是
- 语言
 - 类语言
 - 体态语
 - 面部表情
 - 触摸
33. 电动吸引器吸痰的原理是利用
- 正压作用
 - 负压作用
 - 空吸作用
 - 虹吸作用
 - 静压作用
34. 脱戴手套的方法,以下哪项是错误的
- 戴手套前应检查手套的号码
 - 未戴手套的手不可触及手套的外面
 - 戴好手套的手不可触及另一只手套翻折部分的内面
 - 戴好手套后两手应置腰部水平以上
 - 脱手套时,须将手套口翻转脱下
35. 病员大量输入库血后可能出现
- 低血钾
 - 低血钙
 - 低血磷

D. 高血钠

E. 高血钙

36. 根据医疗文件书写要求,下列哪项不妥

A. 记录必须及时、准确、真实、完善

B. 内容简明扼要,医学术语应用确切

C. 文笔通顺

D. 眉栏项目必须填写完整

E. 日夜班均用蓝钢笔书写

37. 接触传染病患者后要刷洗双手,正确的顺序是

A. 前臂,腕部,手背,手掌,手指,指缝,指甲

B. 手指,手背,手掌,腕部,前臂,指甲

C. 前臂,手腕,指甲,手背,手掌

D. 手掌,腕部,手指,前臂,指甲

E. 腕部,前臂,手掌,手背,手指,指甲

38. 低钠饮食需控制摄入食物中自然存在的含钠量应为

A. 0.5g/d 以下

B. 0.8g/d

C. 1g/d

D. 1.5g/d

E. 1.2g/d

39. 体温突然升高,见于

A. 休克

B. 极度衰竭

C. 肝癌

D. 急性感染

E. 肺结核

40. 医院分级护理的依据是病人的

A. 年龄

B. 病种

C. 病情

D. 自理能力

41. 下列皮内试验药液,每毫升的含量哪项是正确的

A. 青霉素 50U

B. 链霉素 2500U

C. 破伤风抗毒素 1500IU

D. 细胞色素 C 7.5mg

E. 普鲁卡因 25mg

42. 描述炎性浸润期褥疮,下述哪项不正确

A. 皮肤呈紫色

B. 皮下硬结

C. 有大、小水疱

D. 水疱表皮剥脱露出湿润的创面

E. 创面上有脓性分泌物

43. 超声雾化吸入后,下列哪项物品不需消毒

A. 雾化罐

B. 水槽

C. 螺纹管

D. 口含嘴

E. 面罩

44. 破伤风抗毒素脱敏注射法是

A. 所注剂量分四等分,分次注射

B. 所注剂量分五等分注射

C. 所注剂量分四次注射,剂量逐渐递减

D. 所注剂量分五次注射,剂量逐渐递减

E. 所注剂量分四次注射,剂量逐渐递增

45. 服后应多饮水的药物是

A. 铁剂

B. 健胃片

C. 止咳糖浆

D. 阿司匹林片

46. 绘制体温符号,不符合要求的是

A. 口温用蓝“●”

B. 腋温用蓝“○”

C. 肛温用蓝“⊙”

D. 降温后体温用红“○”

E. 体温、脉搏符号相遇,体温符号外画红“○”

47. 现有95%乙醇 250mL,要配制70%乙醇,需加入蒸馏水

A. 79.5mL

B. 84.5mL

C. 89.5mL

D. 94.5mL



- E. 99.5mL
48. 对破伤风抗毒素过敏试验阳性病员的处理是
- A. 不能注射
 - B. 将破伤风抗毒素分四等分,分次注射
 - C. 将破伤风抗毒素剂量逐渐递增,分次注射
 - D. 将破伤风抗毒素剂量逐渐递减,分次注射
 - E. 将破伤风抗毒素分五等分,分次注射
49. 敌敌畏中毒时,应使用的洗胃液是
- A. 1%盐水
 - B. 镁乳
 - C. 硫酸镁
 - D. 牛奶
50. 成人安静时,正常血压肱动脉为
- A. 收缩压为 12~21.3kPa (90~160mmHg),舒张压为 8~12.6kPa (60~95mmHg)
 - B. 收缩压为 12~16kPa (90~120mmHg),舒张压为 5.3~8kPa (40~60mmHg)
 - C. 收缩压为 12~18.6kPa (90~140mmHg),舒张压为 8~12kPa (60~90mmHg)
 - D. 收缩压为 18.6~21.3kPa (140~160mmHg),舒张压为 12~12.6kPa (90~95mmHg)
 - E. 收缩压为 12kPa (90mmHg) 以下,舒张压为 8kPa (60mmHg) 以下
51. 禁用静脉推注的药物是
- A. 氯化钾
 - B. 地塞米松
 - C. 氯化钙
 - D. 泛影葡胺
52. 依靠强大的氧化作用杀灭细菌芽胞和病毒的消毒剂是
- A. 碘酊
 - B. 福尔马林
 - C. 漂白粉
 - D. 过氧乙酸
53. 长期医嘱是
- A. 胸部透视 St
 - B. 异烟肼 0.1tid
 - C. 安眠酮 0.2g SOS
 - D. 血沉测定
54. 大量不保留灌肠,溶液流入受阻时,可如下处理
- A. 抬高灌肠筒
 - B. 降低灌肠筒
 - C. 移动肛管
 - D. 嘱患者深呼吸
 - E. 嘱患者快速呼吸
55. 高热持续期的特点
- A. 产热多于散热
 - B. 散热大于产热
 - C. 散热增加而产热趋于正常
 - D. 产热和散热趋于平衡
 - E. 产热和散热在较高水平上平衡
56. 护理理论的四个基本概念,以下哪个不是
- A. 人
 - B. 健康
 - C. 环境
 - D. 疾病
 - E. 护理
57. 麻醉护理盘内不需准备的物品是
- A. 输氧导管
 - B. 通气导管
 - C. 导尿管
 - D. 吸痰导管
58. 为2岁以下婴幼儿肌内注射,最佳注射部位是
- A. 股外侧肌
 - B. 臀大肌
 - C. 臀中、小肌
 - D. 上臂三角肌
 - E. 股内侧肌

59. 最严重的输血反应是

- A. 发热反应
- B. 过敏反应
- C. 溶血反应
- D. 循环负荷过重
- E. 细菌污染反应

60. 节律异常的脉搏是

- A. 洪脉
- B. 交替脉
- C. 间歇脉
- D. 水冲脉
- E. 缓脉

61. 尿标本中加防腐剂浓盐酸,用于

- A. 尿蛋白定量
- B. 尿糖定性
- C. 尿浓缩查结核杆菌
- D. 尿 17 羟类固醇检查
- E. 尿细胞计数

62. 对无菌注射器及针头,手可接触的部位是

- A. 针梗、活塞
- B. 针栓、活塞
- C. 针栓、空筒
- D. 针尖、活塞轴

63. 需用保护具的患者是

- A. 休克患者
- B. 咯血患者
- C. 高热患者
- D. 腹痛患者
- E. 谵妄患者

64. 用平车运送病人中,不正确的做法是

- A. 患者躺在平车中间,车速不可太快
- B. 上下坡时病人头部在前,病人感到安全
- C. 对骨折病人,车上需垫木板,并固定好骨折部位
- D. 病人如有输液而无输液架,须一人高举输液瓶
- E. 进出门时应先将门打开,不可用车撞

开门

65. 国际红十字会首次颁发南丁格尔奖是在

- A. 1907 年
- B. 1910 年
- C. 1920 年
- D. 1953 年

66. 腰穿后患者去枕平卧的主要目的是

- A. 有利于脑血液循环
- B. 防止脑缺血
- C. 防止昏迷
- D. 减轻脑膜刺激症状
- E. 预防颅内压减低

67. 穿隔离衣时避免污染

- A. 领子
- B. 袖子
- C. 背部
- D. 腰以下部分

68. 下列不属于生命体征的是

- A. 体温
- B. 脉搏
- C. 血压
- D. 呼吸
- E. 神态

69. 下列正确的热疗应用目的是

- A. 促进炎症消退和局限
- B. 提高痛觉神经的兴奋性
- C. 抑制炎症扩散
- D. 传导发散体内的热
- E. 减轻局部充血或出血

70. 一慢性气管炎、肺气肿病人,近几天咳嗽加剧,痰液粘稠,不易咳出,做雾化吸入药液首选

- A. 氨茶碱
- B. 舒喘灵
- C. α -糜蛋白酶
- D. 地塞米松

71. 面部三角区感染时,忌用热敷的理由是

- A. 加重出血
- B. 疼痛加剧



- C. 易致颅内感染
D. 掩盖病情
E. 可使面部皮肤损伤
72. 判断病人昏迷深浅程度的最具价值的指标是
A. 生命体征
B. 瞳孔反应
C. 肌张力
D. 对疼痛刺激的反应
73. 胎膜早破的产妇,应采用的卧位是
A. 头高脚低位
B. 去枕平卧位
C. 头低脚高位
D. 膝胸位
E. 屈膝仰卧位
74. 谵妄患者的表现是
A. 语无伦次
B. 语言增多
C. 易激怒
D. 感觉迟钝
E. 朦胧状态
75. 以下哪一项不属心理健康的涵意
A. 情绪稳定,积极情绪多于消极情绪
B. 有理想,对事业有偏执的追求
C. 在与别人交往中受到欢迎和信任
D. 有较好的自控能力,并能正确评价自己
E. 能切合实际地不断进取,对未来充满信心
76. 热坐浴的禁忌证是
A. 痔疮手术后
B. 肛门部充血
C. 外阴部炎症
D. 肛门周围炎症
E. 妊娠末期痔疮疼痛
77. 溶血反应时出现头胀、四肢麻木、腰背部剧痛、血压下降等症状,是由于
A. 红细胞凝集成团,阻塞部分小血管
B. 红细胞溶解,大量血红蛋白释放到血
- 浆中
C. 血红蛋白变成结晶体,阻塞肾小管
D. 肾小管内皮细胞缺血、缺氧而坏死脱落
E. 红细胞破坏,释放凝血物质
78. 死亡的3个阶段是
A. 心跳停止,呼吸停止,对光反射消失
B. 昏迷,呼吸停止,心跳停止
C. 濒死,临床死亡,生物学死亡
D. 肌力消退,肌张力减退,反射消失
E. 尸斑、尸冷、尸僵
79. 1955年美国莉迪亚·海尔首次提出
A. 个案护理
B. 功能制护理
C. 整体护理
D. 责任制护理
80. 把25cm长的无菌镊子浸泡在消毒液中,液面应浸没镊子的长度约
A. 5cm
B. 7.5cm
C. 10cm
D. 12.5cm
E. 20cm
81. 下列哪项不是热的应用目的
A. 促进炎症消散或局限
B. 制止炎症扩散或化脓
C. 减轻深部组织充血
D. 保暖
E. 缓解疼痛
82. 低位性肠梗阻患者的呕吐物呈
A. 酸臭味
B. 腐臭味
C. 腥臭味
D. 粪臭味
E. 苦味
83. 护士专业素质有
A. 热爱祖国、热爱人民、热爱护理事业
B. 对病人有高度的责任心
C. 具有健康的心理,乐观、开朗、稳定的

情绪

- D. 具有诚实的品格
84. 测血压时袖带缠得过松可使
- 收缩压偏低
 - 无影响
 - 收缩压偏高
 - 舒张压偏高
 - 舒张压偏低
85. 一人扶助患者移向床头的操作中,下述哪项不妥
- 视病情放平靠背架
 - 取下枕头置床尾
 - 患者仰卧屈膝
 - 请患者双手握住床头栏杆,双脚蹬床面
 - 护士患者协作配合,同时上移
86. 下述何组休养环境是合理的
- 中暑者,室温应保持在 40°C 左右
 - 产休室,应保暖不能开窗
 - 破伤风患者,室内光线应明亮
 - 儿科病室,室内温度宜 22°C 左右
 - 气管切开者,室内相对湿度为30%左右
87. 输液过程中,患者突然出现呼吸困难、气促、咳血性泡沫痰的原因是
- 输入致热物质
 - 输入速度过快
 - 输入空气栓子
 - 输入变质药液
 - 输入药液浓度过高
88. 对前来门诊的患者,护士应首先进行
- 卫生指导
 - 预检分诊
 - 心理安慰
 - 查阅病案
89. 丁红,女,在全麻下行甲状腺全切手术,术后采取半坐卧位的主要目的是
- 改善呼吸
 - 利于伤口愈合
 - 减轻局部出血
 - 减轻疼痛
90. 做甲状腺吸 ^{131}I 测定,检查前一月应禁食
- 淡水鱼
 - 白菜
 - 土豆
 - 紫菜
 - 鸡蛋
91. 当一个人受到压力后大量吸烟、喝酒是属哪一种消极的心理反应
- 认识机能障碍
 - 无效的应付行为
 - 思维紊乱
 - 情绪失控
 - 自我估价能力降低
92. 以下哪一项不属治疗性沟通的概念
- 信息发出者与接受者是护士与患者
 - 护患关系是一种治疗性关系
 - 沟通的事物应属于护理专业性事物
 - 治疗性沟通是以患者为中心
 - 患者在沟通中处于主导地位
93. 测量脉搏的首选部位是
- 颈动脉
 - 颞动脉
 - 肱动脉
 - 桡动脉
94. 下列哪类药物服用后须多饮水
- 铁剂
 - 止咳糖浆
 - 助消化药
 - 健胃药
 - 磺胺类药
95. 注射定位,正确的是
- 皮内注射:前臂掌侧上段
 - 皮下注射:肩峰下3指
 - 臀中肌注射:髂前上棘外侧3横指处
 - 臀大肌注射:过臀裂中点画水平线,再过髂嵴最高点作其垂线,取外上