

明·方賢撰

太醫院經驗奇效良方

(四)

新文豐出版公司印行

## 出版說明

醫也仁術，其言五運六氣，所以除疾疢而保性命，醫書之流傳，益可恢宏其仁，是乃利物濟民之寶也。而天地之間，固粗糙易得，精緻難求；自古而今，醫家之書不知凡幾，其精者鮮矣，字句差之毫釐，湯藥小小不達，則後人受弊之深，豈惟千里計哉？故本公司一向懍力於此，不敢稍忽，已精心發行之中醫名著達數百種，並皆少見之珍本，嘉惠杏林，良有以也。

此次由香港陳純仁中醫師大力推薦，提供精選故宮珍藏之古代善本醫書書目，承國立故宮博物院惠借影印刊行，凡三十四種，計精裝五十二冊。搜羅繁富，上自炎昊，下逮里巷，且板本皆爲罕見不傳之秘本、善本，年代蓋不出唐宋元明。要能會其真意，斟酌臨時，期於賢哲着宿有所助益，而醫道可望光大，斯爲天下之大幸焉。

又本系列珍本醫書之出版流播，特承國立故宮博物院惠助，謹此

致謝

新文豐出版公司 謹啓

中華民國七十六年十月



內醫院經驗奇效良方卷之五十二  
與任學屋

脫肛門 附論

閉閉

軀於建又怒服

之證難經云虛實出焉出者為虛入者為實脫肛門之脫非  
 故然哉蓋實則溫溫則內氣充有所蓄虛則竅亡則內氣  
 而不能收况大腸有厚薄與肺為表裏肺或蘊熱則閉虛則  
 脫并因之論且婦人有此疾者產育用力過多小兒此疾皆因  
 久利大腸虛冷所為也肝門為大腸之候大腸傷於寒利而用  
 力努軀其氣下衝肛門脫出也用香附子荆芥等分煎湯洗之  
 或以五倍子穢為細末放於紙上托入肛緩緩揉入若或長久  
 男子變成腸疝痔漏腸出不收至於出數寸者以五倍子朴硝  
 等分煎湯洗之亦用不賊燒灰不令烟盡入麝香少許大便了  
 貼少許効又有久痢臟虛皆能令人肛門突出有腸頭作痔即  
 腹中有虫丈夫由此酒色過度大腸者傳道之官腎者作強之

官蓋腎虛而洩母氣因肺虛是以大腸氣無所主故自肛脫治  
法實原氣去蘊熱之劑外用煎藥洗之醫治无不愈矣

脫肛通治方

蝟皮散 治肛門脫出不收

蝟皮 一箇確丙燒  
令焦黃存性

磁石 半兩火煨於醋  
內鹽滓七次

辣桂 三錢 鼈頭 一枚慢火  
炙令焦黃

右為細末每服三錢食前米飲調下用鞋底炙熱熨按肛

上托入

文蛤散 治大腸虛寒肛門脫出不收或用力太過及小兒斗

呼久痢后皆脫肛

文蛤 即五倍子  
不拘多少

右為細末水煎汁浸洗更入白礬蛇末尤佳洗後用赤石  
脂為末少許搽在芭蕉葉上頻用托入或脫出有長尺許

者以兩櫟相並中空一尺以磁瓶盛藥水滿與櫟相平令病人仰卧所脫浸在瓶中逐日換藥水如此浸縮為度

槐花散

槐角各等分 炒香黃

右為細末用羊血蘸藥炙熟食之以酒送下

縮砂湯

黃連各等分 水賊各等分

右為細末每服二錢空心用米飲調下

乳香另研

白丁香各三 枳殼去穢 煨炒

完青去頭足 糯米炒

大黃蒸焙

鶴虱草炒 藜蘆炒

牡蠣煨各 半兩

右為細末粟米糊為丸如梧桐子大每服三十九丸腸風臘茶清送下諸痔煎薤白湯送下諸漏鐵屑煎湯下空心服

磁石散

治脫肛

磁石半兩火煨  
醋淬七次

右為細末每服一錢空心米湯調下

香荊散

治脫肛

香附子

荊芥穗略半縮砂半錢

右為細末每服三錢食前用白湯調下

治腸頭挺出

右用蝦蟆皮一片燒付患處一方瓶內燒熏

治脫肛歷年不愈

右用生鐵五斤水一斗煮取五升出鐵以汁洗日再無不

瘥并燒礬石粉之則亦良

木賊散

治脫肛不熱

右用木賊燒有性為末搽肛門上按之

蟻蛭丸 治肛門癢或出膿血有虫傍生孔竅內

蟻蛭

七枚五月五日收去窠底灸為末

新牛糞半兩 肥羊肉

一兩凡令香

右共如膏丸如蓮子大灸令熟以新綿薄裹內下部中半日少喫飯則大便中虫出三五度永瘥

治穀道蠶赤腫又痒方

右用杏仁搗作膏傅之一方熬令黃搗以綿蘸塗穀道中

治肛門腫痛

右用木弊子去殼取肉四五枚研如泥安新瓦器或木盆以沸湯衝動洗了另用少許塗患處

太醫院經驗奇效良方卷之五十二



太醫院經驗奇效良方卷之五十三

癘風門 附論

內經云風氣與天陽行諸脉俞散於分肉之間與衛氣相干其道不利故使肌肉臃腫而有癘衛氣有外凝而不行故其肉有不仁也癘者有榮衛熱附其氣不清故使鼻柱壞而色敗皮膚蕩潰風寒客於脉而不去名曰癘風以其酷熱暴悍可畏耳夫人患此病者先分在上在下所感之處古方治以在上者以醉仙散取其臭涎惡血於鬻縫中出在下者以通天再造散取惡物陳虫於穀道中出然此邪毒聚雖攻出其源尚在經絡受病於陽明一經凡治此病先觀患人身上疣瘡與瘡若先見於上者或下體多者或上下同得者或下而復在上者乃陽明胃經也是以無物不受此其濕熱浸漬經絡久則虛使風入於人也氣受之則在上多血受之則在下多氣血俱受甚重非醫之神

手能起此病者鮮矣。有或從上或從下以漸而來者皆是可治之病。人見其病勢緩多忽之。若能攝養保和得宜鮮有不愈者也。若不能絕滋味、色、慾皆不免。再發則終於不能救矣。前人曾治五人。中間惟一婦人得免而疾安。以其貧甚無物可喫。欲啖無從。所食餘四人不能禁忌。按作者三二年後皆再發而危。孫真人云：吾常治四五百人。終無一人免於死。非孫真人不能治也。蓋無一人能守禁忌耳。此一婦人本病外因。又服三五百貼。加減四物湯。半年之上。方得月經行。十分安愈。若人患此。鼻柱壞爛。肌肉瘍潰者。是知陽明經分受風木之邪也。明矣。不可泥於風寒而已。內有臭涎惡血陳虫惡物之類者。又何為而致然也。蓋謂厥陰主生五虫。其相火熱甚。而制金。金衰故木乘侮。肺受熱而氣不清矣。况血隨氣運。涎隨氣降。氣既不能施化。則血聚而涎積矣。血聚久則成惡涎。積久則臭濁濕涎熱血相為

薰蒸久則肌肉潰爛而生，更治之使邪出於齒縫大腸之間者，  
 乃是陽明經之道路也。蓋真土敗木賊之證宜乎，况又不能守  
 戒忌者，欵此丹溪先年所以痛言之深也。木風病是受天地間  
 殺物之風，右為厲風，可不畏哉。再因考之所載，此其惡疾者是  
 也。雖名曰風，未必因風所得，尤抵多嗜色慾勞動，氣血熱癸汗  
 泄不避邪風，冷濕使淫氣與衛氣相干，致肌肉皮膚腐潰，鼻梁  
 塌壞。丹溪云：所謂自作不仁，極穢之業，雖有悔言而無悔心，  
 良可嘆也。然亦有傳染者，原其所因，皆夫婦不知禁忌，因而不  
 避風寒暑濕之氣，因虛邪入經絡，久則漸成斯疾。又有勞役飲  
 食澁結於胃，流入經絡，風涎相搏，致使風痺不可一例。作厲風  
 治之則誤矣。內經云：脈風成為厲，俗云癩病也。先禪皮散從坐  
 至多服三五七日，或承漿穴尤壯灸，瘡乾再灸，瘡愈三灸之後  
 服子聖散泄熱祛血中之風邪，戒房室三年，病愈藥灸同止。述

類石形此治肺風之法也靈樞云厲風數刺其腫上已刺以銳  
針其處按出其惡氣腫盡乃止常食方食勿食他食以犯其  
病且癩病古今以為難治之證前人救生民之病苦置諸方論  
詳備于象後之學者誠心鑒諸

厲風通治方

通天再造散 治大風惡疾

鬱金半兩 大黃炮一兩 白牽牛取頭末六分

皂角刺經年者

右為細末每服五錢日末出而東以無灰酒調下盡量為  
度晚利黑頭小虫病稍輕者止利如魚腸臭穢物忌食發  
毒之物半年但食稠粥軟飯漸已調理自然頭尾皮膚如  
常甚者不過三兩次須將理不可妄有勞動及終身不得  
食牛馬驢騾等肉犯者死不可救矣

神効追命散 治大風

北大黃七斤 川鬱金半兩 大皂莢刺一兩

右為細末每服二錢用真大楓子油入好酒温調臨睡服  
隔兩日再服直候瀉下無虫方瘥

皂辣湯 治大風

皂莢刺元半生半 北大黃一斤 輕粉半斤

右為細末每服二錢空心酒調服取下惡物服藥數日齒  
出毒血甚臭

皂角丸 治大風諸癩

肥長皂角二十條先炙透後去皮弦其核自落

右以皂角肉多用酒慢火煎得稠粘瀝去清者候冷入雪  
糕杵為丸如梧桐子大每服五十丸不問飢飽酒送下

硫黃酒 殺癩風虫

明硫黃不約多

右酒調空心飲清汁明日添硫黃再研入酒如前服或添

大襖子油更好

黑虎丹 治大風諸癩惡虫內蝕形骸變壞

天靈蓋 三兩 蝦蟆 二箇去頭足

桃仁去皮

人中白 二兩 麝香 一朶 雄黃

硫黃各二

穿山甲 炮焦灰 老皂莢刺燒存性

輕粉二朶

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十九月初五更米飲湯送下連日取虫盡則愈殺瘵虫通用

烏蛇丸 治風癩殺虫

烏蛇肉酒浸 蜂房各一兩半 桃仁浸去皮 白蒺藜炒

皂角刺炒 貫仲 獨活 攢柳

苦參炒 蕪荑 雷丸 雄黃

硫黃各半

硃砂二錢

胡麻子四兩

蝦蟆二箇去頭足炙焦

右為細末以長皂角十條水三升煎成膏和藥末丸如梧  
桐子大每服三十九空心溫酒送下

治大風

右用烏蛇三條事治令淨蒸煮熟去骨取肉焙乾為細末  
用宿蒸餅丸如米粒犬以喂烏鷄其鷄食盡烏蛇三條後  
却烹鷄取肉為末或為丸或作散酒服之丸時仍用宿蒸  
餅每服三五丸甚者不過三五鷄即愈

雷丸散 風癩取虫

雷丸

阿魏

貫衆末

麝香半升

水銀

硫黃

雄黃

各二升半用乳鉢入  
瓶同碾令盡為度

右為極細末每服一錢天明溫酒調下明日再服

蝦蟆丸 治大風殺五虫

乾蝦蟆一兩肥長皂角一條先炙透後去反放浸酒再炙

右為細末以竹管引入羊腸內繫兩頭用麩二升鋪篋內

置麩上蒸熟去麩入麝香半錢同搗丸如梧梧子大每服

二十一丸空必溫酒送下

蔓荆丸 治大風

蔓荆子 蒼耳子 枸杞子 牛蒡子炒

黑牽牛炒 胡麻子 香白芷 何首烏

威靈仙 荆芥穗 白蒺藜炒去刺 直僵蠶炒去絲

細辛 皂角刺 苦參 大草烏生皮去

獨活各一兩

右為細末大風油和丸如梧桐子大每服二十四丸食前

用茶清送下

胡麻散 解風熱毒氣癰疹瘰癧

方見風門

得効第一方

治瀉風即大風惡疾癩是也雖名曰風未必皆

因風大率多嗜慾勞動氣血熱發汗出不避邪風使淫氣相干則肌肉不仁勞氣泣濁則肘熱不利故色敗皮膚癢潰鼻梁塌壞或自作不仁極微之業所致久則或遍身白皮脫落如蛇蛻狀

右用桑枝灰一斗熱湯淋取汁洗頭面次用大豆及菘豆漿添熱水三日一浴一日一洗面却用側柏葉蒸曝乾白膠香各等分為細末滴水為丸不拘時溫水下三七粒日三服

仙方

治大風惡疾雙眼昏咫尺不辨人物髮眉自落鼻梁塌

倒肌膏瘡如苔蘚勢若不可救此方特効

右用皂角剝三斤炭火熬久曬乾為末濃煎大黃湯下一